



DIOSCOR


RUELLII

615.
3
D 62 p
R

VENTER PLUMA VENVS LAVDEM FUGIENDA SEQUENTI

CVM PRIVILEGIO AD
QVADRIENNIVM

EXPVLSA VT AIVNT CORNICE.
ADHVC.



Habetur venale in officina Henrici Stephani
E regione Scholæ Decretorum. *G. Vansinbault*



J. B. L. Chouet & Co. P.

IOANNES RVELLIVS SVESSIONENSIS
ANTONIO DISOMO REGIO CONSILI
ARIO VTRIVSQUE LINGVAE PERITIS
SIMO .S.P.D.

C

Vm sæpe mecum reputarem humanissime fi
mul ac eruditissime Antoni Disome omniū
ferme disciplinarum conditionem, illud impri
mis cum admiratione michi, tum miseratione
dignū occurrebat, q̄ saluberrimæ humano ge
neri artes vel diuinitus nobis datæ, vel mortu
lium studio adiuuentæ, ita affectæ iaceant, vt ad

interitum spectare videantur. Quibus olim excolendis veteres vsq̄
eo diligentiam omnem, & operam impenderunt, vt intentatum
nihil indiscussumq̄ reliquerint. Etenim per aliquot iam sæcula, &
qui discunt & qui docent, neglecta vera liberalium scientiarum ma
iestate, ad echinatas captionum cauillationumq̄ argutias diuertentes,
dici docti haberiq̄, q̄ esse malunt. Quod vt in cæteris ferri dissimulari
q̄ fas sit, in ea tamē arte nefarium est, quæ ad tuendam salutem
hominum nata, incorrupta semper augustaq̄ esse debet. Quæ ramen
fere iam inde ab auorum nostrorū memoria, tam turpi ac desidio
so consensu deserta exoleuit, vt verear ne flagitiosa fortasse suis profes
soribus aut inhonesta videatur, qui principem eius partem quæ co
gnitione delectuq̄ medicamentorum conitat, vel rei difficultate de
territi, vel ingenio diffisi, vel iudicio lapsi, a se abdicarūt, rudiq̄ me
dicamentariorū ministerio delegarunt, existimantes fortasse dignita
ti amplitudiniquæ suæ non parum detractum iri, suamq̄ auctoritatem
eleuari, si ea ipsi tractent, quorum officinæ sibi iam cognitionem ven
dicarunt. Cum cæteri artifices ignominiosum sibi esse putent, si im
prudentes sui negocij conspiciantur, aut vniuersam instrumento
rum suppellectilem non plane ac memoriter teneant. Proinde ars illa
præstantissima, sine qua natura manca meritō ac mutila esse cense
tur, prisca temporibus clara & percelebris, literarumq̄ monumen
tis diligentissime tradita, posterioribus sæculis adeo a se ipsa dege
nerauit, vt simulacrum eius tantum, vel potius vmbra nomenq̄ re
manferit. Quippe cum olim hærbārij iidem atq̄ medici essent, sci
dit inde se studium, hominumq̄ inertia simul & incuria factum est,
vt ab ijs destituta quorum erat propria, circulatorum ne dicā im
postorum præda facta fuerit. Cum igitur pluribus scriptorum mo
numentis admonerer, apud antiquos gloriæ fuisse simplicium cu
ram, ac memorabiles illos Græcorū duces hoc illustri studio sem

per floruisse, huic parti ruinosa, nutari, breuique casura adhibendam esse manum duxi. Nec aliud occurrebat praesentius auxilium, ut a medijs ignorantiae tenebris assereretur, ac errores expiari innumeraque monstra domari possent, quae ut ea quae graecis literis hac de re tradita erant, latinis illustrarentur, ac quae sine graui perniciie dissociari non poterant, a ceteris medicinae partibus auulsa, suo corpori restituerentur. Pedacium igitur Dioscoridem praestantissimum huiusce partis auctorem, tot saeculorum suffragijs comprobatum, pro mediocritate nostra latinitate donauimus, tuoque nomini dicamus. Quae acerrimi iudicij virum, omnium bonarum literarum ac vtriusque linguae studiosissimum cognouimus, nec parum laudis tibi ex ea re peperisti. Simul ut extaret pignus mutuae inter nos beniuolentiae, simul ut mortales officio cumulatione demereremur. Quod quidem opus non paruo sane negotio a nobis elucubratum, veluti primitias industriae nostrae & maioris laboris praeludium laeta fronte suscipias. De quo id constantissime ausim polliceri, esse quasi quoddam naturae promptuarium ex quo res omnes, haerbae, fruges, frutices, arbores, fructus quibus arua, campi, pascua, montes, conualles, plana confragosaque vestiantur, & visceribus terrae abdita, in humani generis praesidium depro-mi facile possunt, ac denique veluti a quodam rei medicamentariae seminario, in humanum usum transferri, e quo vita omnis ea haurire queat, quibus humanae saluti prospiciatur, & morbis omnibus consulatur. Quae vero meae partes fuerunt, quoniam in propria harena, ut dicitur, versari videbar, cum sim professione medicus, dedi operam utinam & praestiterim, uti omnia ex fide responderent, & ut latina oratio graeci auctoris sensum fideliter redderet, ne absurda peregrinitas medicinam quoquomodo pollueret, etiam si res ipsa elegantiam ac nitorem non facile admittat. Curaui praeterea ut idem utrobique sensus seruarietur, nulla vocum nouitas, nec triuialia verba aut exposita, quibus quaerendis Latinos fere omnes euoluimus. Cum vero latina me defecerunt, graecis quidem & fere iam receptis uti malui, quae uoua aut barbara licenter admittere. Sed nihil aequae me torfit quam veterum manuque exaratorum exemplarium inopia (illud enim tantum natum sum quod bibliopolae typis excusum circumferunt) in quo permulta manifestissime deprauata ex varia auctorum lectione, & praesertim in libris venenorum ex vetustissimo Pauli Aeginetae codice, ad pristinam sinceritatem restituimus. In quibus studiosos omnes rogatos velim ut boni consulant. Vale Parisijs. Calendis Maij. Anno Domini. M.D.XVI.

TABVLA

Index omnium quæ in hoc Dioscoridis volumi-
ne continentur literarum ordine digestus.

	Fol.	Cap.		Fol.	Cap.
Abrotonum	64	xxvii	agrostis	91	xxxiii
abſinthium	64	xxv	aiuga	86	clxxvii
abſinthiũ ſantonicũ	64	xxvi	aizoon maius	100	xcii
abſinthiũ marinum	64	xxvi	aizoon minus	101	xcii
Acacalis	20	cxx	alabaſtrites lapis	138	cxliiii
acacia	22	cxxxv	albecum	55	clxxxvii
acacia altera	23	cxxxvi	alcea	85	clxv
achantha	63	xviii	alcyonium	136	cxxvii
acanthium	63	xvii	aliſma	85	clxx
acetum	120	xliiii	allium	51	clxix
acetum muſum	120	xv	allium ſylueſtre	51	clxix
acetum ſcylinum	120	xviii	allium anguinum	51	clxix
acetume ſtichade	123	xliv	aloe	63	xxiii
achillea	91	xxxix	aliſne	100	lxxxix
achras	27	clxx	althæa	85	clxiii
acida muria	120	xvi	alumen	134	cxliiii
acinos	68	xlvi	alumen ſciſſile	134	cxlii
acorum	2	ii	alus	88	xi
aconitum	99	lxxx	alyſſon	77	cliii
aconitum alterum	99	lxxxi	alypon	114	cxc
aconitũ venenũ	144	vii	amaracum	67	xlvi
acuta ſpina	21	cxxiii	ambroſia	80	cxxvii
Adarche	136	cxxviii	amiantus lapis	138	clxvii
adianton	105	cxxxvii	ammiũ alexandrinũ	71	lxviii
adeps	37	lxxxvi	ammoniacon	76	xcvii
Aegilops	106	cxi	amomum	5	xvi
aris ſquamma	128	lxxx	amomis	5	xvi
aris flos	127	lxxix	ampeliũ terra	140	clxxii
ærugo rafa	128	lxxxii	ampelopraſſon	51	clxvi
ærugo ſcolecia	128	lxxxiii	amphiſbæna	152	vii
æs uſum	127	lxxviii	amurca	23	cxxxvii
æthiopis	102	cxv	amygdala amara	27	clxxviii
ætites lapis	139	clii	amylum	43	cxii
Agalochon	7	xxv	anagallis	57	cxcviii
agaricum	59	i	anagyris	85	clxviii
ageraton	94	lxii	anchuſa	90	xxvi
agnus	23	cxxxviii	anchuſa altera	90	xxvii

	Fol.	Cap.		FOL.	CAP.
anchusa alia	90	xxviii	argenti scoria	130	xcii
androsaces	83	cli	argenti spuma	147	xxvii
androsæmon	86	clxxiii	argenti spuma	130	xciii
anemone	56	cxcv	arilaria	94	lix
anethum	70	lxv	arifarum	54	clxxxvi
anguium senectus	31	xix	aristolochia rotunda	60	iiii
anifum	70	lxxii	aristolochia longa	60	v
anonis	63	xx	armeniaca mala	26	clxvii
anthemis	83	clv	armenius lapis	131	xcvi
anthericum	55	clxxxvii	armoracia	45	cxxiii
anthyllis	81	cliiii	arnoglosson	48	cxl
antiparthes	137	cxxxix	aron	54	clxxxv
antirrhinon	105	cxxxiii	arrhenogonon	82	cxli
antisfoda	127	lxxvii	arthemisia	80	cxxvi
Aparine	77	ciii	arthemisia tenuior	80	xxvii
aphaca. i. lenticula	51	clxv	Afarum	4	ix
apiastron	78	cxvii	asclepiades	77	cv
apios	114	clxxxvii	ascyros	86	clxxiii
apium satiuū	71	lxxii	asininum iecur	33	xlii
apium rusticū	71	lxxiii	asini vngula	33	xliiii
apium sylvestre	56	exciii	asus lapis	137	cxxxiii
apocynon	99	lxxxiii	asparathus	6	xxiii
apollinaris	96	lxxii	asparagus	47	cxxxix
apri iecur	33	xlvi	asphodelus	55	clxxxvii
Aqua mulsa	119	x	asplenion	83	clii
aqua	119	xi	aspis	152	xiiii
aqua mariua	120	xii	aspis	156	xiiii
aqua frigida	148	xxxiii	aster	104	cxxi
Arabis	52	clxxiii	astragalus	95	lxv
arabus lapis	138	cxl	Athamanticū	3	iii
araneus	35	lxviii	athera	42	cii
arbutus	27	clxxvii	atratylis	77	cvi
arcion	103	cviii	atramentū sutoriū	132	cv
ardion	103	cvii	atramentū librariū	141	clxxiii
arduron	103	cvii	atraxaxis	46	cxxxii
argemone	57	cxcvi	atriplex	46	cxxxii
argemone altera	57	cxcvii	Auellana nux	28	clxxxi
argenti recrementū	130	xcii	auena	106	cxl
argentum viuum	132	ci	auricula muris	58	ccii
argentum viuum	147	xxviii	auripigmentum	133	cxii

	Fol.	Cap.		Fol.	Cap.
auripigmentum	147	xxix	calamus odoratus	6	xix
axos	148	xxxiii	calamintha	66	xli
Bacchar	4	ix	calcifraga	114	cxc
baccharis	68	xlix	calx	136	cxxiii
balauftium	25	clvi	calx	147	xxix
ballote	78	cxvi	cancamum	7	xxvii
balsamum	6	xx	cancris fluuiatiles	31	xii
bafiliscus	156	xv	canchrys	73	lxxxv
batos	92	xl	canchrys	73	lxxxvi
bdelium	14	lxxx	canis rubus	21	cxxv
bechion	80	cxxv	canis iecur	33	xlix
bera	47	cxxxvi	canis rabiosi signa	151	i
beronica	87	i	canis lingua	105	cxxx
bitumen	18	xcvii	cannabis syluestris	85	clxvi
blatta pistrinaria	33	xxxviii	cannabis satiuā	85	clxvii
bluton	46	cxxx	cantharis	34	lxv
botrys	80	cxxviii	cantharidū venena	143	i
brassica	46	cxxxiii	capitulum martis	63	xxiii
brassica syluestris	47	cxxxiii	capnos	103	cxi
brassica marina	47	cxxxv	capparis	56	cxcii
brathy	18	ciii	capræ vngula	33	xlvi
bretanica	87	ii	caprinum iecur	33	xlvi
bromus	42	ciii	cardamomum	3	v
bromus	106	cxli	cardamon	52	clxxii
bryon	7	xxiii	cardamina	48	cxliii
bryon marinū	102	c	carduus	62	xv
bryonia	114	cxci	carpassi succus	145	xiii
buccina	30	v	carum	70	lxiii
buglossum	105	cxxix	caryotæ	25	cl
bulbus vomitorius	55	clxxxviii	caseus	36	lxxix
bulbus cibarius	55	clxxxix	casia	4	xii
bulbus vomitorius	110	clxii	castanea	24	cxlvii
bunias	45	xxii	castorium	32	xxvi
bunion	46	cxxix	catanance	105	cxxxv
bunion	104	cxxv	caucalia	104	cxxiii
buprestis	35	lxvi	caucalis	50	clvi
buprestis	144	iii	cedria	18	cv
buphthalmos	83	clvii	cedrides	19	cvi
butyrum	36	lxxxi	cedromela mala	26	clxviii
Cadmia	126	lxxv	cedrus	18	ciii

	Fol	Cap		Fol	Cap
celticum nardum	3	vii	chryfogonon	94	lix
cenchridij venena	156	xii	cicadae	34	lvi
centaurium magnū	61	vii	cicer fatium	43	cxiii
centaurium minus	61	viii	cicer arietinum	44	cxiii
centum capita	63	xxiii	cicer sylueftre	44	cxiii
centumculus	80	cxxxi	cicerbita	48	cxlvi
capa	51	clxviii	cici	110	clxvii
capēa	85	clxix	cicuta venenum	145	xi
cæra cādida feu puni	41	xciii	cicuta	99	lxxxii
cerafia	(ca 26	clix	cimices	33	xxxvi
ceruus pifcis	32	xxx	cimolia	140	clxvii
cerui genitale	33	xlui	cinnabaris	131	c
ceruinum cornu	34	lxiii	cinnamomum	5	xliii
cæruleum	131	xcvii	circæa	81	cxviii
cerufa	131	xciii	ciftus	21	cxviii
cerufa	146	xxii	citrago	78	cxvii
ceftion	87	i	citria mala	26	clxviii
chalcitis	132	cvi	clematitis	114	cxci
chameacte	113	clxxxv	clematis	88	viii
chamæ	30	ix	clematis altera	88	ix
chamacyffos	105	cxvii	clinopodion	77	cviii
camedaphne	107	cl	clymenos	89	xv
chamædrys	78	cx	Cnicus	115	cc
chamælæa	113	clxxxii	Coagulum	37	lxxxv
chamælæo albus	61	ix	coccum	93	li
chamælæo niger	62	x	coccum gnidion	113	clxxxiii
chamæleuce	105	cxviii	cochleæ terrestres	30	xi
chamæmelon	83	clv	colchicon	100	lxxxvii
chamæpytis	86	clxxvi	colligendorum ratio	1	
chamælyce	112	clxxxi	collocafia	44	cxvi
characias rithymalus	111	clxix	colocynthis	114	clxxxviii
charta	20	cxvii	colus rustica	77	cvi
chelidonia	57	cc	colymbades	24	cxli
chelidonia minor	58	cci	condrila	49	cxlviii
chia terra	140	clxv	cōmunis curatio in omnes iſtus		
chiliophyllos ſtrat	112	ciii	virulentos	152	xxi
chryſathemon (otes	83	clv	conyza	81	cxv
chryſanthemon	94	lxi	conyza parua	81	cxvvi
chryſocolla	131	xcv	conyza altera	81	cxvvi
chryſocome	94	lviii	Corallium	137	cxv

	Fol.	Cap.		Fol.	Cap.
coriandrum	145	ix	daphnoides	107	cxlix
coriarius frutex	24	cxlix	daucus	73	lxxxix
coris	86	clxxv	delphinium	73	lxxxii
corona veneris	48	cxlii	delphinium alterum	73	lxxxiii
coronopus	48	cxlv	dictamum	66	xxxv
cornus	27	clxxiii	dictamum cretense	66	xxxvii
cos	139	clix	diphryges	133	cxix
costus	5	xvii	dipsacus	62	xii
coryledon	101	xciii	dipsas	152	x
courmi	42	xcviii	dorychnion	98	lxxviii
crambe	46	cxxxiii	dorychniō venenū	144	vi
crataegonum	81	cxl	draco marinus	31	xv
crimnon	42	c	draco marinus	155	v
crission <i>Supellex</i>	104	cxx	dracunculus	54	clxxxiii
crithmum seu potius			dracūculus parvus	54	clxxxiiii
crithamon	48	cxliiii	draguntion	54	clxxxiii
crocodillion	62	xi	druinus	156	ix
crocomagma	7	xxx	dryopteris	115	cxcix
crocum	7	xxix	dulcis radix	61	vi
crommyon	51	clxviii	ebulū	113	clxxxv
croton	110	clxvii	ebur	34	lxi
cucurbita	49	cxlix	echinus aquatilis	30	i
cucumis sativus	109	clvii	echion	91	xxx
cucumis sylvestris	108	clv	elaphoboscon	72	lxxviii
cuminum	71	lxvi	elaterion	108	clv
cuminum sylvestre	71	lxvii	elateriōn	108	clvi
cupressus	18	c	elatine	52	xlvi
cupressus	18	cii	electrum	20	cxv
cyclaminus	53	clxxxi	elclisphacos	66	xxxviii
cyclaminus altera	54	clxxxii	elaomeli	8	xxxvii
cynocrambe	116	ccii	eleoselinum	71	lxxiii
cynoglosson	105	cxxx	elichryfos	94	lx
cynomorion	50	clix	empetron	114	cxc
cynosorchis	82	cxlii	ephemeron	100	lxxxvii
cyparissastithymal ^o	111	clxxiii	ephemeron	144	v
cyphi thymia	7	xxviii	epimedion	90	xxii
cypirus	5	iiii	epimelis	27	clxxii
cytinus	25	cliii	epirotica mala	26	clxiii
cytissus	103	cxiiii	epistaxis	103	cx

	Fol.	Cap.		Fol.	Cap.
epithymum	114	clxxxix	flos syluestris punici	25	clvi
equisetum	93	xlix	fœmina	111	clxx
equisetum alterum	93	l	fœniculum	72	lxxix
equorum lichenes	33	xlv	fœniculum erraticū	72	lxxx
erethria terra	140	clxii	fœnigræci farina	43	clxi
erica	20	cxix	fœnūgræcū	43	clxi
erigeron	101	xcviii	fraxinus	19	cx
erinon	91	xxxii	fremium	56	cxcv
eruca	34	lxiii	fucus marinus	102	ci
eruca olerum	50	clvii	fuligo liquidæ picis	17	xciii
ærugo	128	lxxxii	fuligo pictoria	141	clxxxiii
ærugo scolecia	128	lxxxiii	fuliginis cōpositio	15	lxxxv
eruina farina	44	cxix	fumaria	103	cxii
eruum	44	cxix	fungi	100	lxxxvi
erysimon	52	clxxv	fungi	146	xxiii
eryngium	63	xxiii	Gagates lapis	138	cxli
erythrodanon	84	clxi	galaetites lapis	138	cxli
eupatorium	92	xliviii	galaxias	138	cxliii
euphorbium	75	xcv	galbanum	76	xcvi
euzomon	50	clvii	galerita	34	lix
Faba	44	cxv	galiopsis	101	xcvi
fabæ ægyptia	44	cxvi	galla	24	cxlviii
fagus	24	cxlvi	gallina	33	lii
farina crassior	42	c	gallinæ cerebellum	33	liii
fæx	135	cxxiii	gallion	101	xcvii
febrifuga	61	viii	garum	32	xxxiii
ferri rubigo	129	lxxxiii	genitale cerui maris	33	xlvi
felis	32	xxix	gentiana	60	iii
fel	39	lxxxviii	geranion	80	cxxix
fel terræ	61	vii	geranion alterum	80	cxxx
ferula	74	lxxxix	geodes lapis	139	clx
ferulago	109	clix	gingiberis	53	clxxvii
Fibrini testes	32	xxvi	gingidion	50	cliiii
figus	28	clxxxiii	gith	74	xcii
fidicula	106	cxxxviii	Gladiola	90	xxiii
filicula	115	cxcviii	glans	24	cxlv
filix fœmina	115	cxcvii	glans sardiana	24	cxlv
filix	115	cxcvi	glans iouis	24	cxlvii
finum	40	xc	glans vnguentaria	110	clxiii
flos punicæ	25	cliiii	glastum satium	58	cxcv

Handwritten signature or note at the bottom of the page.

	Fol.	Cap.		Fol.	Cap.
glaſtum fatium	58	xxv	helxine	92	xlvi
glaſtum ſylueſtre	58	xxvi	hematites lapis	137	cxxxv
glaucium	76	xcix	hemerocalle	81	cxxxviii
glaux	106	cxlii	hemionitis	83	cliii
glicon	66	xxxiii	herinaceus terreſtris	30	ii
gluten piſcium	76	ci	hieracia	71	lxx
glutinium	76	ci	hieracia parua	71	lxxi
Glycyrrhiza	61	vi	Hippace	36	lxxx
gnaphalion	80	cxxxi	hippocampus	30	iii
gnidiū grauum	113	clxxxiii	hippogloſſon	105	cxxxiii
gobius	32	xxxii	hippophaes	110	clxv
gramen	91	xxxiii	hippophæſton	110	clxvi
gramen pernaſi	91	xxxv	hippopotami teſtes	32	xxv
gramē harundinaceū	91	xxxiii	hippoſelinon	72	lxxvi
groſſi	29	clxxxv	hippuris	93	xl ix
gruina	80	cxxx	hirci barbula	50	clx
gutta	76	xcvii	hirculus	3	vii
gummi ceraſi	26	cl ix	hirundinum pulli	34	lx
gummi amygdalæ	27	clxxviii	hirudo	147	xxxii
gypſum	65	xxx	hordeum	42	xcvi
gypſum	146	xxiii	hoſoſteum	88	xiii
Hæmorrhous	152	x	horminum	82	cxlvi
halica	42	cvi	hyacinthus	95	lxvi
halicacabon	29	clxxxviii	hydromeli	119	x
halicacabon	97	lxxv	hydromelon	121	xxiii
halimus	20	cxxii	hydropiper	53	clxxxviii
harena	139	clviii	hydrus	152	xi
harundo	20	cxvi	hyoſciamus	96	lxxii
harundo cypria	20	cxvi	hyoſciamus	145	xv
harundo vallatoria	20	cxvi	hypocoon	96	lxxi
haſtula regia	55	clxxxvii	hypericon	85	clxxii
hebenus	21	cxxxi	hypociftis	21	cxxix
hedera	57	cxcix	hyſſopum	65	xxviii
hedyſaron	82	cxlvii	Iaſpis	139	clv
helenium <i>campane</i>	8	xxxi	iberis	29	clxxxvii
helenium alterum	8	xxxiii	ibiſcum	85	clxiii
helioſcopus	111	clxxii	idea radix	93	xlvi
heliotropiū magnū	116	ccii	iecur aſininum	33	xlvi
heliotropiū paruum	116	cciii	iecur caprinum	33	xlvi
helleborum album	107	cli	illecebra	47	cxxxvii
helleborum nigrum	107	clii	ilex	24	clvii

	Fol.	Cap.		Fol.	Cap.
ilex	24	cxlvi	lauacrum veneris	62	xii
Indicus lapis	131	xcviii	lauer	84	cxli
inguinalis	104	cxxi	laureola	107	cl
intubus	49	cxlvii	laurus	19	cvii
inturis	56	xcii	laurus alexandrina	107	cxlviii
ionia	30	vi	lauri baccæ	19	cviii
ious glans	24	cxlvii	Lemnia terra	132	ciiii
irion	52	clxxv	lens	44	cxvii
iris	2	i	lens palustris	100	xc
iris sylvestris	90	xxv	lentiscus	16	lxxxviii
isatis	58	ccv	lentiscina refina	16	lxxxix
isopyron	104	cxxii	lenticula	51	clxv
iudaicus lapis	138	cxlvi	leontopetalon	77	cix
iuncus odoratus	6	xviii	leonto podion	105	cxxxii
iuncus marinus	94	lv	lepidium	56	cxcii
iuniperus parua	18	ci	lepus terrestris	31	xxi
iuniperus magna	18	cii	lepus marinus	147	xxx
ixia	61	ix	leucacantha	63	xxi
ixia	146	xxi	leucanthemon	83	clv
Labrum veneris	62	xii	leucas	78	cxii
labrusca	104	xciii	leucoion	81	cxxxix
lac	35	lxxv	lichenes equorum	33	xlv
laccoagulatum	147	xxvi	lichen	94	lvi
lac humanum	36	lxxviii	ligusticon	69	lvi
lactis vsus	35	lxxv	ligustrum	21	cxxvi
laccra	35	lxix	lilium	78	cxv
lactuca sativa	49	clii	lilium sylvestre	81	cxxxviii
lactuca sylvestris	49	cliii	limonion	89	xix
ladanum	21	cxxx	lingua canis	105	cxxx
lagopus	89	xx	lingua bubula	105	cxxxix
lampfana	46	cxxvii	linozostis	116	cci
lana	36	lxxxii	linum	43	cxiii
lana vsta	36	lxxxiii	lithocolla	139	clv
lanaria herba	53	clxxx	lithospermon	84	clix
lanceola	84	clxii	locustæ	34	lvii
lappa	106	cxxxix	lolium	43	cx
lappago	110	clxv	lonchitis	84	clxii
lapathum	46	cxxvi	lonchitis altera	84	clxiii
laser	75	xciii	lora	119	vii
laserpitium	75	xciii	lotus	27	clxxiii
lathyrus	112	clxxvii	lotus vrbana	103	cxii

	Fol.	Cap.		Fol.	Cap.
lotus sylvestris	103	cxiii	menta	66	xxxix
lotus ægyptia	103	cxv	mentastrum	66	xl
lupinus	45	cxx	meon	3	iii
lychnis coronaria	78	cxiii	mercurialis	116	cci
lychnis sylvestris	78	cxiiii	mergi iecur	33	li
licium	22	cxviii	mespilus	27	clxxi
lycopis	90	xxix	metopion vnguentū	13	lxx
lysimachia	87	iiii	milium	43	cvi
Macer	19	cxii	millefolium	103	cxvi
magnes lapis	138	cxviii	millepedæ	33	xxxvii
magudaris	75	xciii	minium sinopicum	132	cii
maiorana	67	xl	misy	133	cvi
mala dulcia	26	clxiii	molibdana	130	xc
mala medica <i>ægypto</i>	26	clxviii	molibdoides lapis	129	lxxxix
malabathrum	4	xi	moly	69	lii
malicorium	25	clv	montanum nardū	4	viii
malua	46	cxv	morochthus	138	clxii
malum punicum	25	cliii	morus	28	clxxxii
malum cotoneum	26	clxii	mulsum	219	ix
malum sylvestre	26	clxv	mulus	32	xxiii
malum	26	clxi	muralis herba	92	xlii
mandragoras	98	lxxix	muria	135	cxix
mandragoras	145	xvi	mures	35	lxxiii
marcor lignorum	19	cxiiii	muris auricula	58	cciii
maron	68	xlvi	muris auricula	58	cciii
marrubium nigrum	78	cxvi	mus araneus	35	lxxiii
marrubium	79	cxviii	mus araneus	155	vi
meconium	145	xvii	mus araneus	152	v
medica	50	clxiiii	muscus	7	xxiii
medion	89	xxi	mustella	32	xxvii
medularum ratio	39	lxxviii	Myaces	30	vii
mel	41	xcii	myagron	104	cxviii
mel heraclion	145	viii	myosota	58	cciii
melantheria	133	cix	myrica	20	cxviii
melanthium	74	xcii	myrrha	14	lxxvii
melia terra	140	clxxi	myrrha	14	lxxviii
melimela	26	clxiii	myrrhis	104	cxvii
melitites lapis	138	clxii	myrtidanum	26	clvii
memphites	139	cxlix	myrtus sativa	25	clvii
menæ	32	xxxi	myrtus sylvestris	106	clvii

	Fol.	Cap.		Fol.	Cap.
Naphtha	18	xcix	oleum gleucinum	12	lxvi
narcaphthon	7	xxvi	oleum Hedycroon	13	lxix
narcissus	110	clxiii	oleum Hyofciaminū	9	xli
nardi genera	3	vi	oleum iasminum	13	lxxvi
nardū celticum	3	vii	oleum irinum	12	lxv
nardinum vnguentū	13	lxxiii	oleum laurinum	9	xlvi
nasturtium	52	clxxii	oleum lentiscinū	10	xl9
Nepeta	66	xli	oleum mastichinum	10	l
nerion	100	lxxxv	oleum Megalinum	13	lxviii
nitrum	135	cxxi	oleum Melāthinū	9	xl9
nitri spuma	135	cxxii	oleum melinnū	10	liiii
nux iuglans	27	clxxx	oleum melinum	26	clxii
nux auellana	28	clxxxi	oleum mendesium	13	lxxi
nymphæa	82	cxlix	oleum myrteum	9	xlvi
nymphæa altera	83	cl	oleum narcissinum	11	lxii
Ochra	131	xcix	oleum ociminum	11	lviii
ocimastrum	68	xlvi	oleum oenanthinū	10	lv
ocimastrum	91	xxxi	oleū oliuæ sylvestris	8	xxxiii
ocimum	50	clviii	oleū oliuæ sylvestris	24	cxli
oenanthe	81	cxliiii	oleū omphacinū	8	xxxiii
oenanthe	117	v	oleum picinū	17	xcii
oesypum	37	lxxxiii	oleum raphaninū	9	xlvi
olea sylvestris	23	clx	oleum rosaceum	10	lii
oleaster	23	clx	oleū sampsuchinū	11	lvii
olea æthiopicæ lachrya			oleū ficyoniū	8	xxxv
(ma	24	cxliii	oleū sinapinum	9	xlvi
oleum abrotoninū	12	lxvii	oleū styracinum	12	lxiii
oleum abrotoniū	11	lix	oleum styracinum	14	lxxix
oleum amaracinum	12	lxvii	oleum subinum	11	lxi
oleum amygdalinū	9	xxxix	oleū sylvestris oliuæ	8	xxxiii
oleum anethinum	11	lx	oleū sylvestris oliuæ	24	cxli
oleum Balaninū	9	xl	oleum telinum	10	lv
oleum Butyrinum	12	lxiii	oleum terebenthinū	10	xlxi
oleum Cicinum	9	xxxviii	oliuæ colymbades	24	cxli
oleū cinamonimū	13	lxxiii	oliuæ sylvestris oleū	8	xxxiii
oleū e grano gnidio	9	xl	olofchinos	94	lv
oleum crocinum	12	lxiii	olufatrum	72	lxxvi
oleum cyprinum	12	lxiii	omphacium	117	vi
oleum cyprinum	21	cxxvi	omphacomelites	121	xxiii
oleum Elatinum	10	liii	onagra	104	cxix

	Fol.	Cap.		Fol.	Cap.
onitis	65	xxxii	parthenium	83	clvi
onobrychis	85	clxxi	passum ^{ex lina y aff}	112	vii
onosma	82	cxlviii	pastinaca marina	155	v
onyx	30	x	pastinaca	31	xxii
ophites lapis	139	cliii	pastinaca	70	lvii
opobalsamum	6	xxi	pastinaca venenū	152	liii
oreoselinon	72	lxxiii	pederota	63	xviii
origanum	65	xxx	pedicularia hærba	109	clviii
origanum syluestre	65	xxxii	peleciton	82	cxlvii
ornithogalum	50	clxi	pentaphyllon	92	xl
orobanche	50	clix	peplion	112	clxxx
oryza	42	cv	peplos	112	clxxxix
ossifragus	34	lviii	peplis	112	clxxx
ostracites	139	clvi	pepo	49	cli
Osyris	106	cxliiii	peristereon ^{Y. aff}	94	lxiii
othonna	58	ccii	persea	29	clxxxvi
oui candidum	34	liiii	persica mala	26	clxvi
ouorum natura	34	lv	personata	103	cviii
oxalme	120	xvi	periclymenon	89	xvi
oxylapathum	46	cxxvi	Pes gallinaceus	50	clvi
oxyschinos	94	lv	petasites	103	cix
oxymyr sine	106	cxlvii	petroselinum	72	lxxv
Pæonia	84	clviii	peucedanon	74	xc
paliurus	20	cxxiii	phalangium	79	cxxi
palma	25	cl	phalangium	152	i
palma elate	25	clii	phalaris	84	clx
palma thebaicæ	25	cli	pharicon	146	xix
panax	69	liii	phasolus	44	cxviii
panax	69	liiii	phlomis	102	cl
panax chironion	69	lv	phœnix	93	xlvi
pancratîon	55	cxci	phrygius lapis	137	cxxxii
panicum	43	cviii	Phu	4	x
papauer erraticum	95	lxvii	phyllitis	79	cxx
papauer satium	95	lxvii	phyllon	81	cxli
papauer corniculatū	96	lxi	phyteuma	105	cxxxii
papauer corniculatū	46	xviii	picea	15	lxxxvi
papauer spumeū	96	lxx	piceis liquide fuligo	17	xciii
papyrus	20	cxvii	pinæ nucs	16	lxxxvii
paralion	111	clxxi	pinorum eruca	144	ii
paronychia	94	lvii	pinus	15	lxxxvi

	Eol.	Cap.		Fol.	Cap.
piper	52	clxxvi	psyllion	145	x
piscium ius	33	xxxv	ptarmica	53	clxxix
pissasphaltos	18	xcviii	pterix	115	cxcvi
pisselæon	17	xciii	pulegium	66	xxxiii
pistacia	27	clxxix	pulicaria	97	lxxiii
pityusa	112	clxxvi	pultrícula	42	cii
pix liquida	17	xcii	pulmo marinus	33	xxxix
pix sicca	17	xc	pumex	134	cxvi
pnigitis terra	140	clxviii	purpura	30	iiii
plantago	48	cxl	pygnochomon	113	clxxxvi
platanus	19	cix	pyrafter	27	clxx
plumbago	130	xcxi	pyrethrum	73	lxxxiii
plumbum elotum	129	lxxxvi	pyrites lapis	137	cxxxiii
plumbum vstum	129	lxxxvii	pyrorum genera	26	clxix
plumbi recrementū	129	lxxxviii	Quercus	24	cxliiii
polemonia	88	x	quinquefolium	92	xlvi
polion montanū	79	cxxii	Radicula	53	clxxx
polycnemon	77	cvii	radix	45	cxxiii
polygala	106	cxliii	radix dulcis	61	vi
polygonaton	88	vii	radix sylvestris	45	cxxiii
polygonon	87	v	radix sylvestris	114	clxxxvii
polypodium	115	cxcviii	ramnus	20	cxxi
pompholix	126	lxxvi	rana	32	xxviii
populus alba	19	cxii	ranunculum	56	cxciii
populus nigra	20	cxv	rhapbanus	45	cxxiii
porrum capitatum	51	clxvi	rhapban ⁹ sylvestris	46	cxxiii
portulaca	47	cxxxvii	rhaponticum	60	ii
portulaca	47	cxxxv	rapum sylvestre	45	cxxi
potamogeton	102	cii	rapum terræ	53	clxxxii
poterion	62	xvi	ratio victus in morfu rabiosi		
præcocia mala	26	clxvii	canis	152	iiii
prassion	79	cxviii	ratio recondendorū	2	
propolis	41	xciii	recrementū argēti	103	xcii
prunus	27	clxxvi	remedia demorforum a cane ra-		
pseudobunion	104	cxxvi	biofo	151	ii
pseudocasia	4	xiii	refina lentiscina	16	lxxxix
pseudocinnamomū	5	xv	refina liquida e pimu	116	xcii
pseudodistamum	66	xxxvi	rheon (et picea	60	ii
pforicon	133	cvii	rhodia radix	93	xlvi
psyllion	97	lxxiii	rhododendrum	100	lxxxv

	Eol.	Cap.		Fol.	Cap.
rhus	24	cxlix	sapa <i>myrica</i>	118	vii
ricinus	110	clxvii	saphyrus	139	cxlviii
rosa	22	cxxxii	sarcocolla	76	xcviii
rosei pastilli	22	cxxxiii	sardianæ glandes	24	cxlvii
rosmarini genera	73	lxxxv	sardonias	145	xiii
rosmarinū coronariū	74	lxxxvii	sarmenticius cinis	136	cxxvi
rubeta	147	xxxi	saxiphagon	89	xviii
rubia	84	clxi	satureia	67	xliii
rubigo ferri	129	lxxxiii	satyrion	82	cxliiii
rubrica	132	cii	satyrion erythroniō	82	cxlv
rubrica fabrilis	132	ciii	saxifragia	89	xviii
rubus canis	21	cxxv	scammonia	112	clxxxii
rubus	92	xl	scammonium	112	clxxxii
rubus idæus	92	xli	scandix	50	clv
rumex	46	cxxvi	schistum lac	36	lxxvii
ruscum	106	cxlvii	schistos lapis	138	cxxxvi
ruta	68	l	scilla	55	cxc
ruta sylvestris	68	li	scincus	35	lxxi
Sabina	18	ciii	scolopendra	31	xvi
fabucus	113	clxxxiii	scolopendra	155	iii
saccharum	41	xcii	scolopendra	152	ii
sagapenion	75	xciii	scolymos <i>in hys</i>	62	xv
sal	134	cxvii	scopa regia	104	cxxv
salis flos	135	cxx	scordium	79	cxxiii
salamandra	35	lxvii	scordoprasson	51	clxx
salamandra	144	iiii	scoria plumbi	129	lxxxviii
saliuaria	37	xlvi	scorodon	51	clxix
saliunca	3	vii	scorpioides	116	ccv
salix	23	cxxxix	scorpionis morsus	152	iii
salvia	66	xxxviii	scorpius terrestris	31	xiii
samia terra	140	clxiii	scorpius marinus	31	xiiii
samius lapis	140	clxiii	scorpij venena	155	iiii
sampfucum	67	xl	securidaca	82	cxlvii
sandaraca	134	cxiii	sedum magnum	100	xc
sandaraca	147	xxix	selenites lapis	139	cl
sandyx	131	xciii	selinusia terra	140	clxvi
sanguinaria	87	v	semperuium	100	xc
sanguinaria foemina	88	vi	semperuium minus	101	cxii
sanguis	40	lxxxix	senecio	101	xcviii
sanguis tauri	147	xxv	sepiā	31	xxiii

	Fol.	Cap.		Fol.	Cap.
seps	35	lxx	sory	133	cx
seris	49	cxlvii	sparganion	90	xxiii
serpyllum	67	xlvi	spartion <i>genista</i>	109	clx
serum lactis	35	lxxvi	spatha	25	clii
sertula campana	67	xlvi	spondylion	74	lxxxviii
sesama	43	cix	sphragis	132	ciii
sesamoides	108	cliii	spina alba	62	xiii
sesamoides paruum	108	cliii	spina acuta	21	cxxiii
sefeli	70	lviii	spina arabica	62	xiii
sefeli ethiopicum	70	lix	spina sylvestris	63	xix
sefeli peloponense	70	lx	spongiorum lapides	139	cliii
sefeli creticum	70	lxi	spongiae	136	cxxix
setanium	27	clxxii	spuma nitri	135	cxxii
sicyonium	8	xxxv	spuma salis	135	cxviii
sideritis	91	xxxvi	spuma argenti	130	93
sideritis alia	91	xxxvii	Squamma æris	128	lxxx
sideritis alia	91	xxxviii	squamma ex acie de-		
fidion	25	clv	(cussa	128	lxxxii
filigo	42	ci	stachys	79	cxix
filiquæ	26	clx	staete	13	lxxii
fillybum	110	clxi	staphis agria	109	clviii
finapis	51	clxxi	stercus ferri	129	lxxxv
fion	48	cxli	stibium	129	xc
fisarum	46	cxxv	sticas	65	xxix
fison	70	lxii	stoebe	39	xiii
fisymbria	48	cxlii	straciotes chyliophyl-		
fisymbria altera	48	cxliii	los	102	ciii
fitania	41	xcv	straciotes	102	cii
fmilax	50	clxiii	strichnon	97	lxxvii
fmilax	145	xii	strigmenta bainearu	8	xxxvi
fmilax aspera	106	cxlv	struthia cotonea	26	clxii
fmilax laevis	100	cxlvi	struthion	53	clxxx
fmyris	139	clvii	Styrax	14	lxxix
fmyrnion	72	lxxvii	fuccinum	20	cxv
folanum somniferu	97	lxxvi	fuillus pulmo	33	xl
folanum hortense	97	lxxvii	fuillus talus	34	lxii
folanum manicu	98	lxxvii	fulphur	134	cxv
foleæ veteramētariæ	33	l	superciliu veneris	91	xxxix
fouchus	48	cxlvi	sycomorus	28	lxxxiii
forba	27	clxxv	sylvestria mala	26	clxv

	Fol.	Cap.		Fol.	Cap.
symphyton alterū	88	xii	toxicon	146	xx
Tamarix	20	cxviii	Tragacantha	63	xxii
taxus	99	lxxxiii	tragium	93	lii
taxus.	145	xii	tragiū alterū	93	liii
tauri sanguis	147	xxv	tragoriganum	65	xxxiii
telephion	59	ccvii	tragos	42	ciii
telis	43	cxii	tragos	93	liiii
tellinæ	30	viii	tribulus	89	xvii
terebinthus	16	xc	trichomanes	106	cxxxviii
terebinthina	16	xc	trifolium	79	cxxi
terra	140	clxi	trifolium odoratū	89	xxi
terra fornacum	140	clxx	trimestria	41	xcv
testæ	140	clxix	triphyllon	79	cxxi
testiculus canis	82	cxlii	tripolion	105	cxxxvi
testiculus alter	82	cxliii	trifago <i>canis</i>	78	cxii
teucrion	77	cx	tritium	41	xcv
thalassomelites	120	xiii	Tuber	50	clxii
thaliæ tron	102	xcix	tussilago	80	cxxv
thapsia	109	clix	typha	81	cxxxii
thelypteris	115	cxcvii	Vaccinium	95	lxvi
thelygonon	81	cxli	venerea	48	cxlii
thlaspi.	52	clxxiii	veneris corona	48	cxlii
thracius lapis	138	cxxxviii	veneris vmbilicus	101	xciii
thumus	32	xxxiii	veneris vmbilicus al.		
thus.	15	lxxxii	(ter	101	xciii
thuris fuligo	15	lxxxiii	veratrum album	107	cli
thuris manna	15	lxxxiii	veratrum nigrum	107	clii
thuris cortex	15	lxxxii	verbascum	102	cv
thyites lapis	138	cxlv	verbenaca	94	lxiii
thymelæa	113	clxxxxiii	verbenaca supina	95	lxiii
thymoxalme	120	xvii	vermes terreni	35	lxiii
thymus	67	xlii	vernilago	62	x
Tilia	21	cxxvii	vesparū apum q̄ idus		
tithymali genera	111	clxviii		155	i
tithymalus platy.			vesicaria	97	lxxv
(phyllos	111	clxxv	vettonica	87	ii
tithymalus petræus	111	clxxiii	vettonica	87	iii
Tordilion	70	lxi	Vidus ratio in mor.		
torpedo piscis	31	xvii	su rabioficantis	152	iiii
topiaria	63	xviii	vimen <i>hybicus</i>	23	cxxxviii

	Cap.	Fol.		Fol.	Cap.
vina marina	121	xx	vinum e Nardo sylue		
vina picata	118	vii	(stri	124	lxi
vina refinata	118	vii	vinum nectarites	124	lviii
vini natura	118	vii	vinū Oenanthinū	121	xxvi
vinum abrotonites	124	liiii	vinum origanites	124	liii
vinum absinthires	123	xli	vinum omphacites	119	vii
vinum acorites	125	lxv	vinum Palmeum	122	xxxii
vinum adynamon	119	vii	vinum panacites	125	lxiii
vinum apijtes	121	xxv	vinum picatum	123	xl
vinum aromatites	124	lvi	vinum epipere myrrha		
vinum alarites	124	lx	(et iride	124	lvii
vinum Bunites	123	xlvi	vinum prafijtes	124	l
vinū calaminthites	124	liiii	vinum Refinatū	122	xxxv
vinum catorchites	122	xxxiii	vinum rhodites	122	xxviii
vinum cedrinum	122	xxxvii	vinum rhoites	121	xxii
vinum cedrites	123	xxxix	vinum saluiatum	124	lxiii
vinum cestrites	123	xlvi	vinum scammonites	125	lxxiii
vinū chamædryites	123	xlili	vinum scyllinum	121	xix
vinum e chamalea	125	lxx	vinum selenites	125	lxvi
vinū chamæpithyinū	(125	lxxi	vinum stichadites	123	xliv
vinum e coniza	124	lv	vinum strobilites	122	xxxv
vinum cupressinum	122	xxxvii	vinum e sycomoris	122	xxxiii
vinum cydonites	121	xxi	vinum e syriaca nardo		
vinum Daucites	124	lxii	(celtica malabathro	124	lix
vinum dictamnites	124	xl ix	vinū therebinthinū	122	xxx
vinum e flore salis	125	lxviii	vinum thymbrites	124	li
vinum Heleborites	125	lxxiii	vinum thymites	124	li
vinum hyssopites	123	xl ii	vinum e thymelea	125	lxix
vinum iuniperinum	122	xxxvii	vinū tragoriganites	123	xlvi
vinum iuniperinum	123	xxxviii	viola alba	81	xxxix
vinum Laurinum	122	xxxvii	viola purpurea	104	cxxiii
vinum lentiscinum	122	xxx	vipera	152	vi
vinū Mādragorites	125	lxxii	vipera	155	vii
vinum marathrites	125	lxvii	viperinæ carnes	31	xviii
vinum melites	121	xxi	viscus	76	cii
vinum melitites	119	viii	vitis alba	104	cxciii
vinum melomeli	121	xxii	vitis nigra	115	cxcv
vinum myrsinites	122	xxx	vitis vinifera	117	i
vinum myrtites	122	xxix	vitis sylvestris	117	ii
			virex	23	cxviii

	Fol.	Cap.		Fol.	Cap.
vlmus	19	cxiii	i&us	151	iii
vnedo	27	clxvii	vua	117	iii
vnguentorum ratio	10	li	vua passa	117	iiii
vnguentum nardinū	13	lxxiii	vulpinus plumo	33	xli
vngula afini	33	xliviii	Xanthion	106	cxxxix
vngula capræ	33	xlvi	xylobalsamon	6	xxii
Volucrum	39	xv	xylocinnamomum	5	xv
volucrum maius	39	xvi	xyphion	90	xxiii
vrina	40	xc	xyris	90	xxv
vrtica	101	xcv	Zea	42	xcix
vrtica labeo	101	xcvi	zithon	42	xcvii
vstio contra venenatos			zopissa	17	xcvi

F I N I S .

Io. Oliuerius Abbas. S. Medardi sueffionensis Dio
scoridem a Io. Ruellio Latinū factum Alloquitur.
Carmen phaleucium Endecasyllabum

I se cure liber, nec extimescas

Vulgi vaniloqui licentio rem
Nasum, Rhinocerote longiorem
Qui tātū soleat queatq; Rōchos
Spurcis æderenaribus tumentis,
Nec quicq; olfaciat bonū, vel altū,
Cum vires habeat nequaq; odoras
Ad florentia prata literarum,
Et gratas superis rosas olentis,
Atq; ad pegasidōn amāna tempe,
Linguas nauciputa procaciorum,
Queis sublime nihil sapit, quibusq;
Infirnum solidis cibis palatum,
Cœlestē Ambrosiā, deūq; Nectar
Ne gustare quidem parūper ausing.

I se cure liber domos per omneis

Quæ musas redolent politiores,
Totus te chorus obuius sophorū
Plaudens excipiet, leget, fouebit,
Ornabit, venerabitur, coletq;
Ad cœlum efferet, et fauore multo
Consensuq; pari omniū probabit
Quin tu (crede mihi) licet pelaspōn
Pridem palliolo decorus esses
Vestitu latio magis placebis
Tectus Romulea toga quirritum,
Quam contextuit inclytus Ruellus
Artis pæoniæ deus Ruellus
Aequè rhetoricans vtrāq; lingua,
O Dioscorida, parens medelæ
Tu quantum vide debeas Ruello,
Qui te ex Helladico facit Latinū,
Quod debere sibi fatetur orbis
Totus, Nos quoq; gratulamur oēs
Testis Endecasyllabis ouantes.

F I N I S .

LIBER PRIMVS
 PEDACII DIOSCORIDIS ANAZARBEI
 DE MEDICINALI MATERIA LL
 BER PRIMVS, IOANNE
 RVELLIO SVESLI
 ONENSI IN-
 TERPRE-
 TE.



2
 Vamquam amicissime Ari, cōplures non veterum
 modo, sed recentiorum quoq̃, de medicamentorum
 compositione, viribus atq̃ probatione commētati
 sunt, nobis tamen nec vanum, nec a ratione abhor-
 rentem impetum animi ad hoc opus incessisse, tibi
 ostēdere tentabimus. Cum eorum nonnulli abso-
 lutum nihil ædiderant, alij q̃ plurima quæ auditu
 percunſtando didicere, scriptis tradiderant. Siquidem Bithynus Io-
 las & Heraclides Tarētinus omiſſa prorsus hærbarum tractatione,
 rem sanēq̃ paucis perstrinxerunt. Neq̃ vero oēs illi de metallicis quic-
 q̃ rebus aut odoramētis memoriæ prodiderunt. Crateuas autem hær-
 barius & Andreas medicus, qui cæteris diligentius hac in parte ver-
 sati videntur, radices multas apprime vtileis, hærbaſq̃, haudquaq̃ ad-
 notatas reliquerūt. Nec sic quoq̃ prisci laude ſua fraudādi ſunt, quos
 & ſi pauca iſtis referantur accepta, magnam tamen impendiſſe diligē-
 tiam conſtat. Iuniorib⁹ minus aſſentiendum, e quibus Iulius Baſſus,
 & Niceratus, & Petronius niger, & Diodorus, Aſclepiadæ omnes,
 medicinalem materiā vernaculam cognitamq̃ vulgo dignam cēſue-
 runt, quæ ab eis litteris exacte mandaretur. vt medicamentorum vires
 probationeſq̃ curſim complexi, ſic nullo experimento eorum eſſe-
 ctus colligentes, inani vero reddendarum cauſarum ſtudio verba fun-
 dentes, alia pro alijs ſcriptitando, rē in aceruū congeriemq̃ extulerūt.
 Siquidem qui inter eos egregius habetur Niger, Ephorbium naſcē-
 tis in Italia Chamelææ ſuccum eſſe contendit. Androſæmonq̃ eam-
 dem hærbam cū Hyperico eſſe. Quinetiam Aloen in Iudæa foſſilem
 naſci. et pleraq̃ his ſimilia citra eſſectuū explicationem exponit, quæ
 prorsus veritati refragantur. Quibus cōiectura colligi poteſt, ea nō oc-
 culata fide, ſed narratione potius ab alijs accepiſſe. In ordine iſdem
 ipſi aberrarunt, partim eorum diſcrepāteis nullaq̃ cognatione cōiun-
 ctas vireis collidentes, alij per elementa litterarum ſcripta in ordinem
 digerētes, quo facilius memoriæ mandarētur, genera & eorū eſſectus a
 ſua cognatiōe diſiūgētes. Nos vero ab iēute, vt ita dicā, iūuētute, iugū

DE MEDICINALI MATERIA

desiderio cognoscendæ materiæ allesti, permultos mundi tractus per-
 grauimus, nec enim nescis nos militarem vitam exegisse, tuq; hortari
 commentationē in sex libros contulimus, quod opus tibi dicam? Ari-
 grato nostro animo obsequētes, ob eum quo nos prosequeris affectum.
 Etenim natura cū in omneis eruditione excultos, tum vero in eos quis
 cum tibi eiusdem artis necessitudo intercedit, pronus ad amicitiam esse
 soles. in nos etiam aliquanto peculiarius. Enimvero non paruum præ-
 bet tuæ probitatis argumentum, optimi viri Licinij Bassi singularis er-
 ga te charitas, quam vna degentes nouimus, cum mutuam inter vos be-
 neuolentiam æmulatione dignam intueremur. Admonitum autem te
 velim, eosq; qui in commentarios nostros incident, vt ne in verbis fa-
 cultatem nostram æstimetis, sed potius adhibitam rebus cum peritia
 curam. Etenim partim res oculis subiectas exactissime cognouimus,
 partim narratione omnibus consona, indagationeq; rerū apud singu-
 los vernacularum diligenter accepimus. Dabimus igitur operā vt dis-
 ferenti ab alijs ordine vtentes, genera medicinarum viresq; describa-
 mus. Quod autē necessaria sit medicamentorum ratio, nemo est ferme
 qui ignoret. q̄ ea & toti arti coniuncta sit, et ab ea expugnandis mem-
 bratim vitij remedia petantur. Quare per medicamentorum composi-
 tiones atq; misturas & facta in morbis pericula extendi, & incremen-
 tum capessere potest, q̄ plurimum opitulante singulorum medicaminū
 cognitione. Quinetiam vernaculam familiaremq; materiam comple-
 æmur, vt perfectæ sint quæ scriptis relinquemus. Verum imprimis cu-
 ram impendere oportet, vt suis temporibus singula & demetatur et re-
 condantur. Intempestiue enim decerpta conditave, aut nullo aut eua-
 nido munere funguntur. Serena etenim cœli constitutione demetenda
 sunt. Magni siquidem refert inter colligendum, si vel squallorēs vel ima-
 bres infesti sint, quemadmodum si loca in quibus prodeunt cliuosa, &
 ventis exposita sint & perflata, frigidaq; & aquis carentia. in his enim
 locis vires eorum longe validiores intelliguntur. Cōtra, quæ i campe-
 stribus, riguis & opacis, cæterisq; locis a vëto silentibus enascuntur, ple-
 rumq; degenerant, & minus viribus valent. multoq; magis si non suis
 horis peropportune colligantur, aut si per imbecillitatem intabuerint.
 Neq; ignorandum q̄ sepe præcoci aut serotina loci natura, aut anni cle-
 mentia, maturius aut celerius adolefcunt. Nōnulla propria vi hyeme
 florent & folia pariunt, quædam bis anno florifera. Quare cui in ani-
 mo est horum peritiam assequi, necesse est ijs prima germinatione solo
 emergentibus, adultis, et senescentibus adesse. Nam qui pullulāti hæ-
 bæ dūtaxat assiterit, adultā cognoscere nō potest, neq; q̄ adultā tātū is-
 spexerit, nup̄ erūpētē noscet. Quo fit vt ppter mutatā foliorū faciē, cauli

LIBER PRIMVS

2

um proceritates, florum seminisq; magnitudinem, nonnulli qui olim has ætatum varietates non perspexerunt, magno in errore versentur. Quæ causa etiam nonnullis scriptoribus imposuit, qui hæbas quasdam, verbi gratia gramen, quinquefolium, & tussilaginem, emittere florem, fructum et caulem, negant. Ergo qui sapius ad visendas hæbas & earum loca se contulerit, earum cognitionem maxime consequetur. Scire etiamnum conuenit, sola ex hæbaceis medicaminibus veratri genera, nigrum inquam & candidum, multis edurare annis. reliqua a trimatu inutilia. Quæ vero ramis scatent sicut stichas, trixago, polium, abrotonum, seriphum, absinthium, hyssopum, & alia id genus semine prægnantia demetantur. Flores quoque antea quam sponte sua decidant. Fructus autem vt maturi excutiantur necesse est. & semina vbi ficcari cœperint, priusquam defluant. Hæbarum succus, & foliorum elici debet, germinantibus adhuc cauliculis. Lac et lachrymæ excipiantur, inciso per adolescentiam caule. Radices, & liquamenta, corticesve vt recondantur eximere conuenit, cum hæbæ suis folijs exuuntur. Siccantur etiam expurgatæ inibi, locis asperginem non redolentibus. sed quæ luto aut puluere sunt oblitæ aqua elui debent. Flores & omnia quæ iucundum odorem efflant, articulis tiliaceis nullo situ obductis reponantur. Nonnunquam charta aut folijs semina vt perennent, apte inuoluuntur. Liquidis medicaminibus densior materia argentea, vitrea, aut cornea, conuenit.

Fidilis etiam si modo rara non sit, accommodatur. & li-
gnea præsertim e buxo. sed ænea vasa liquidis
oculorū medicamentis, quæ aceto, pice
liquida, aut cedria, componuntur.

Adipem autem & medul-
las stagnæis vasis
recondi con-
uenit.

a.ij.

DE MEDICINALI MATERIA

De Iri

CAP. I.

Ris ab aliquibus illyrica, ab alijs thelpide, ab alijs vrania, a nonnullis catharon aut thaumastos, a romanis marica radix, a quibusdā gladiola, ab alijs cōsecratix, ab ægyptijs nar appellat. A cœlestis arc⁹ similitudine nomē accepit. Folia fert gladiolæ, sed maiora, latiora, et piguora. Flores sūmo caule, alterno situ icurui euariāt. Siq̄dē cādidi, pallētes, lutei, purpurei, aut cerulei cōspiciunt. q̄ diuersi coloris specie, quādā cœlestis arcus imago representari videt. Radices subiacēt geniculatæ, duræ, odoratæ. quæ frustatim dissectæ, in vmbra siccantur, & traictæ liño recōduntur. Melior est illyrica, & macedonica. et inter has laudatissima, quæ pumili fere & densa cōstat radice, frāgenti cōtumax, subruffa colore, gustu amaro, odore perq̄ suauī, ac syncæro, ita vt nullū pr̄sus sitū redoleat. quæ dū tundit, sternutamentum mouet. Secundū locū habet africana, candicās, gustuq̄ amara. Teredines in vetustate sentiūt, tūc tñ odoratiores reddi solent. Vis oībus excafactoria, extenuās, cōtra tussim efficac, humorū qui ægre reijciunt crassitiē digerūt. Bilē, crassamq̄ pituitā ex hydromelite drachmis septē potæ purgāt. Sōnū cōciliāt. Lachrymas ciūt. Torminib⁹ medentur. Eadē potæ ex aceto auxiliant serpentiū idib⁹, lienosis, conuulsis, a vento refrigeratis aut rigentibus, & quib⁹ genitura effluit. Menses, ex vino potæ pellūt. Decoctū earū, scēminarū totib⁹ vtiliter imponitur, ad emolliēdos locos, laxandaq̄ in eis venarū spiracula. Ischiadicis ifunditur. Fistulas ac sinus carne explet. Radices ex melle glandis modo subditæ partus extrahūt. Quæ etiā coctæ & illitæ, strumas, veteresq̄ duriciās emolliunt. Siccæ quoq̄ vlcera replent, & cum melle purgant. Nudata ossa corpore operiūt. Doloribus capitis, cum aceto & rosaceo magna vtilitate illinuntur. Admotæ cū albo veratro, & duabus mellis partibus, lentigines & vitia cutis in facie emaculāt. Pessis, malagmatis, & acopis irācerunt. In vniuersum magni ad oīa vsus.

De Acoro

CAP. II.

Corū aliqui chorō aphrodisias, romani venerēā aut radicem nauticā, galli piper aqueū vocāt. Folia iridis habet, angustiora tamē. Radices nō dissimiles, cōplicas, non in rectū sed obliquū tendentes, & summo cespite sparsas, geniculis interceptas. albicantes, gustu acres, odore nō ingratas. Optimū est dēsum, candidū, plenū, nō exesum, odoratū, cuiusmodi colchidicū & galaticū quod asperitō dicūt. Radici vis cafactoria. Decoctū potū vrinā cit. Prodest lateris dolorib⁹, & iocineris, atq̄ pectoris. Item torminibus, vullis, ruptis. Lienem absumit. Vrinæ stillicidio & serpentum idibus auxiliatur.

LIBER PRIMVS

Ad muliebres infessus iridis modo vtiliter imponitur. Oculorum caligines succo discutit. Antidotis radix magno vsu commiscetur.

De Meo

CAP. III.

m Eon quod athamanticum vocant, in macedonia & hispania plurimū gignit, anetho folijs & caule simile, sed eo crassius. binum ferme cubitorum altitudine attollitur, sparsis in obliquum rectumq; radicibus, longis, tenuibus, odoratis, linguam excalfacientibus. Quæ feruefacta ex aqua, vel trita citra coctionem, præclusorū renū vesicæq; farctæ vitia potu leniūt. Vring difficultati medetur. Stomachi inflationes discutiūt. Torminib⁹, cōmotæ vuluæ, articulorū dolorib⁹, atq; fluxiōib⁹ pectoris, trita cū melle in elegmate auxiliant. Sanguinē per mēstua pellūt, defessiōib⁹ feruefacta. Infantib⁹ autē illita imo vētri, vrinas mouent. q; si plus q̄ deceat ex his bibatur, caput dolore afficiunt.

De Cypiro

CAP. IIII.

c ypirus quē aliqui erysiceptrū, vt aspalathū appellant, romanici iunci radicē aut iuncū, folia fert porraceis pxima, sed longiora & exiliora. Caulē odorati iunci, cubitalē aut maiore, angulosum. In cui⁹ cacumine minuta folia cū semine exoriunt. Radices quarū i medicina est vsus, cōtiguīs inter se oleis oblōgis rotūdisve similes, nigro colore, suauī odore, amaro gustu. In lacunosis et palustribus enascit. Optima est grauissima, densa, fractū cōtumax, plena & aspera, odoris cū quadā acrimonia iucundī, qualis est ciliciā, syriaca, & quæ a cicladib⁹ isulis petiit. Huic calida vis inest. Venarū spiracula laxat. Vrinā ciet. Ad calculos, aquāq; subtercutē vrilissime bibiit. Aduersus scorpionū id⁹ remedio est. Perfrictionib⁹ vuluæ, & præclusionibus, sōtu pdest. Pellit mēses. Cōtra vlcera oris etiā si depalscāt vorētq;, farina ei⁹ efficax est. Malagmatis calfacientib⁹, & vnguētōz spissamentis adijci solet. Aliud cypiri gen⁹ tradūt in india nasci gingiberis effigie, qd māducatū croci vi reddit. & illitū præsentē p̄silotri vi exhibet.

De Cardamomo

CAP. V.

c Ardamomum optimū est, quod ex comagene, armenia, bosphoroq; deuehit. In idia quoq; et arabia puenit. Eligi debet plenū, frangēti cōtumax, cōtractū, quod enī h̄mōi nō est, intē pestiuū iudicat. et gustu acre, subamarū, & odore caput tentās. Excalfactoriā vi habet. Potūq; ex aq̄ facit ad comitiales, ischiadicōs, ruffes, neruorū resolutionē. Itē ad rupta, vulsa, tormina. Latas vētris tineas excutit. Ex vino aut potū renib⁹, difficultati vrinæ, a scorpione id̄is, neq; nō oībus venenū vibrantib⁹, auxilio est. Cū cortice radicis lauri epotā drachma calculos comminuit. Partus suffitu enecat. Scabiem ex aceto illitū adimit. Et ad vnguētorū spissamenta additur.

DE MEDICINALI MATERIA

De Nardo

CAP. VI.

No. Nardi
 Vo nardi genera. vnū indicum, alterum Syriacum appellatur. Nō quod iſyria proueniat, ſed quod mōris in quo oriſ, pars vna ad ſyrios, pars altera ad indos ſeſtit. Ex hoc ſyriaci genere præcipuū eſt recēs & leue, largā gerens comā, flauū colore, perq̃ odoratū, ac cyperū redolēs, breui ſpica, amaro ſapore linguā ſiccāte, quod diu in ſua odoris gratia permaneat. Ex indicis autē nardū quoddā Gangitis vocat a fluuio Gange apud quē enaſciſ, montē præterfluēte. quod gen^o ob multā loci in quo prodiſt vlginē, virib^o infirmius eſt, atq; pceri^o adoleſcit, oppletas ferēs ſpicas, ab radice comatas, vnaq; cōuolutas, ac grauiter olētes. Montanū autē odorati^o, ſpica breui, odore cypero vicino, cēteras habēs ſyriaci dotes. Eſt & gen^o quoddā, cui ſampharitico nomen locus indidit, frutice breui, in magnas ſe ſpargens ſpicas, cādidiore caule, hircorū virus ſupra modū redolēte, quod improbat. Madefactū vēdi ſolet, quod vitii ex eo deprehendiſ, q̃ candida ſit ſpica & ſqualida, nulloq; puluere obſita. Adulteratur ſibi cū aqua aut palmēo vino, inſpiſſationis pōderiſq; cauſa iſpirato. Intueri autē oportet ſi lutū radicibus infideat, et incerniculo puluerem excutere, eluendis manib^o vtilē. Vinū habēt excaſfactoriā & exiccantē. Vrinā mouēt. Aluū potu ſiſtūt. Vulgē profluuiā, ſaniēq; appoſita ſupprimūt. Nauſeę ex aqua frigida auxiliāntur. & cardiacis, inflationi, iocineri, regio morbo, renū vitijs. Aquę autē incoctę ſotu ad inſeſſum, vulgē inflammationib^o medētur. Ad glabras oculorū genas valēt, ſiqui dē eas ad denſiorē pilū reducūt. Perfuſis humore corporib^o inſparguntur. Miſcent ſatidotiſ, & i ſiſtili nō picato ad ocularia medicamēta reconduntur, trita in farinam, & cum vino in paſtillos coacta.

De Nardo Celtico

CAP. VII.

Caute de on laſpir
repum
 Elticū nardū naſcitur in ligurię alpiſ, ſaliūca patrio nomine appellatū. Prouenitq; in iſtria. Exigue fruticat, & cū radice vellit. Aliq̃at manualib^o faſciculis, manipulatimq; cōponitur. Folia habet oblonga, colore in flauum languido. Florē luteū. Foliorū ac cauliculorū dumtaxat vſus eſt, & odoris ſuauiſ. Vnde pridie faſciculos aqua ablueri expedit, & exēpta terra pauito ſolo atq; humēti ſubiecta charta reponere, poſt die repurgare. ſiquidē vtile ab acroſo, alienoq; ppter humoris vi, nō excutitur. Adulteraſ i poſita herba ſimili, quę hircul^o vocat ab odoris grauitate, ſed facilis cognitio. Nāq; herba cādidiore eſt, ſine cauliculo, minorib^o folijs. Radice neq; amara neq; odorata, vti verū nardum eſt. Itaq; radices atq; cauliculi, abiectis folijs triti, vino excipiūtur, digerunturq; in paſtillos, & ita ſiſtili nouo diligenter operto, aſſeruari debent. Laudatur maxime recens, iucundi

odoris, radice numerosa coherens, plenum, nec fragile. Ad eadem quæ syriacū pollet, sed vehemētius vrinam cit, et stomacho vtilius est. In inflammationibus iocineris, & felle suffusis auxiliatur. Cōtra stomachi inflammationes, cum absinthij decocto bibitur. Item aduersus lienem, renum et vesicæ vitia, & venenatos ictus ex vino. Additur in malagmata, potiones, & calfacientia vnguenta.

De montano Nardo

CAP. VIII.

Ontanum Nardū, quod ab aliquibus Thylachitis & Niris appellatur, in Cilicia et syria nascitur, caule et folijs Eryngio similibus, minoribus, minime tamē spinosis asperisq̃. Radicibus binis nititur, aut pluribus, nigris, odoratis, ceu hastulæ regię, sed longe gracilioribus, & exilioribus. Neq̃ caulē neq̃ fructum neq̃ florem profert, ad eadem quæ celticum efficac.

De Afaro

CAP. IX.

Afarum, quod & ipsum aliqui syluestre nardū appellāt, magis sanguinem martis, Latini perpensam, alij bachar, Osthane thesam, Aegyptij cerea, alij Nardum rusticū, Galli Bachar, Aethrusci succinū. Odorata herba est, qua i coronamētis vtunt, hederæ folijs, minorib⁹ multo, rotundioribusq̃, floribus cytini hyoscyami, purpureis, inter folia proxime radicē emicantibus, odoratis in quibus semen acinosum. Cauliculos habet angulosos, asperos & molles. Radices numerosas, geniculatas, tenues, obliquas, graminī nō dissimiles, longe tamē graciliores, odoratas, quibus odor inest cinnamomo proximus. Asperū siccumq̃ solum amat. Eius radix, ruptis, conuulsis, i ruffi vetere, & spirādī difficultate, & si vrina ægre redditur, opifera est. Men ses ciet. Contra serpentū ictus, eam in vino bibere salutare est. Folia, vt quæ astringant, illita, capitis doloribus, oculorū inflammationibus, incipientibus ægilopijs, māmīs tumētibus a partu, ignibus sacris auxiliantur. Odor somnū gignit. Crateuas hæbari⁹ de eo ita scriptū reliquit. Asarum excafactoriā vim habet. Vrinā cit. Hydropicis, & vetusto coxēdicum dolori prodest. Radices senis drachmis ex aqua malsa potæ, menses trahunt, & veratri albi modo purgant. In vnguenta additur. Vmbrosis montibus prouenit, sed plurimum in ponto, phrygia, illirico, & italiæ iustiniensi agro.

De Phu

CAP. X.

Hu, quod & aliqui syluestre nardū appellant, nascitur in ponto, folio olusatri, aut elaphobosci, caule cubitali, aut altiore, læui, cauo, molli, in purpuram vergente, geniculis intercep-
pto. Floribus narcisso proximis, maioribus, teneris, & in albicāte purpureis. Radice superi⁹ ad adigiti minoris crassitudinē, ex obliquo villosa
a. iij.

DE MEDICINALI MATERIA

in nigri veratri, aut iunci odorati modū, capillamētis inuicē cōtextis, flauescētibz, odoratis, cū quadā odoris grauitate nardū emulantibus. Excalcificat. Vrinam mouet, si sicca potui detur. Decoctum eadem præstare potest, ad lateris enīam dolorē efficac. Menses cit. Antidotis inferitur. Adulteratur radice rusci ammistā, sed maleficium depræhenditur, qm̄ hæc dura est, & frangēti contumax, sine vlla odoris gratia.

De Malabatto

Cap. XI.

Alabattrum arbitrantur aliqui esse indicī nardi folium, falsi
m quadam odoris cognatione, per multa enī nardū olent, quæ
admodum phu, Asarum, Niris, secus autem res se habet.
Nāq; malabattrum foliū sui generis est, quod indicæ gignunt paludes,
lentis palustris modo innatans aquis, sine radice. Id collectū statim li-
no transiuitur, & siccatum reconditur. Tradunt siccatis æstiuo feruore
aquis, humū aridis fruticibus vri, quod vbi non euenerit, ne amplius
quidem renasci. Laudatur recēs, cū nigredine quadā candicās, integrū,
nec fragile, odore caput feriens, quod diu insuauis odore permaneat, &
nardū sapore imitetur, nullo salis gustu. Infirmū vero & minutim con-
tusum, præsertim si cariosum virus olet, viciosum est. Eadē nardo sor-
titur vires, sed efficacius omnia præstat. Vrinam vehementius ciet, ac
stomacho magis prodest, malabathri vis. Lippitudinibus, inflāmatio-
nibusq; tritū et in vino feruefactū cōmode illinitur. Subditum linguæ,
oris halitū & suauitatem cōmendat. Vesiū quoq; odorē interpositum
feruat, & ab erosione tuetur.

De Casia

CAP. XII.

Casia, cuius complura sunt genera, iuxta odoriferam arabiam
c gignitur, crassi corticis sarmento, folijs piperis. Eligenda est
fuluescens, pulchri coloris, coraliæ æmula, perq̄ angusta, lon-
ga, crassa, & fistulosa, gustu mordēs, & cum aliquāto feruore astringens,
aromatica, vinoso odore, cuiusmodi est quæ ab incolis achy appellat,
ab alexādrīæ negociatoribus, daphnitis. Huic præfertur crassa, purpu-
rea, et nigricans, zigir cōgnomine, quæ rosam odore imitatur, præci-
pui in medicina vsus. Secundū locum tenet antedicta. Tertia, cui musca-
letico blāsto cognomen est. Reliquæ viles, et quæ Aphemum dicitur,
nigra, insuauis, cortice tenui, ac rimoso, & quam darcam & citton vo-
cant barbaro nomine.

De Pseudocasia

CAP. XIII.

Imilior huic est pseudocasia, q̄ vt explicari possit, quæ gustu
f coarguitur, cum nec acris, nec odorata sit, hærentemq; medul-
læ corticē habeat. Inuenitur etiam lata quædam fistula, mol-
lis, leuis, plena, ab alia distans. Dānatur candicās, scabra, hircinum vi-

rus redolens, & quæ tenui fistula & scabra cute sit. Vim obtinet calfaciendi, vrinam ciendi, siccandi, & leniter astringendi. Conuenit ad medicamenta oculorum & malagmata, quæ præstandæ claritatis gratia concinnantur. Lentigines tollit, cum melle illita. Menses trahit. Contra viperarum ictus pota auxiliatur. Aduersus intestinas inflammationes omnibus, et renū vicia, pota proficit. Fœminis in solia desideribus, aut suffragamentis, prodest ad dilationē vuluæ. Ea duplo pondere medicamenti mixta, cinamomi vicem supplet. Nam eisdem effectus præbet, ad plurima perq̃ utilis.

De Cinnamomo

CAP. XIII.

Innamomi genera plura patrium sibi nomē vendicantia. Præfertur tamen mosyllum, quod casia cui mosyliti nomē est, aliamquam referat effigiem. Sed in eo genere, recens, nigrum, ex vino in cinereū vergens, læue, tenuibus ramulis, ac frequentibus nodis cinctum, perq̃ iucunde olens. Optimi fere temperamentum, odoris proprietate constat. Inuenitur enim in optimo, quodq̃ seorsum nascit, odor cardamomo proximus. Insuper, acre & mordēs et cū calfactione quadā tenuis salsum, quod non cito confricāti hirsutū, aut friātī lanuginosum, læuibus tamē internodijs appareat. Si certior fieri voles, vellito ab radice surculum, facilis est huiuscemodi probatio. Nāq̃ fragmenta, adiecticia quædam sunt. Quæ autem potētius spirant, suo halitu cum nares consuluntur olfactū expleant, deterioris dignotionem impediunt. Est etiānum Montanū, crassum, pumile, fuluēscēs admodū. Tertium a mosyllo, perq̃ suauiter olet, nigrum, fruticosum, paucis intercedentibus geniculis. Quartū, fungosum, candicans, aspectu tuberosum, vile, ac friabile, magnā habens radicem, casiam plane repræsentantē. Quintum genus, gustu amarum, et cortice fuluæ cassiæ simile, tangētī firmum, minus neruosum, densa radice firmatum. Ijs quæ thuris, casia aut amomi odorem spirant, minus suauitatis inest. Deligitō scabrum, rugosum, læue, lignosum. Radicem autem vt inutilem reiicito.

De pseudocinnamo

CAP. XV.

Stetiānum gen^o aliud, cui pseudocinnamo cognomē est. Inualidi odoris, solutarumq̃ virium. Vocatur etiā zyngyber, cū tamen sit xylocinnamomū, præbēs quandam cinnamomi faciem. Est autem lignosum cinnamomū, sarmentā longa robustaq̃ ferēs, odore longe cinamomo inferiore. Sūt qui xylocinnamomū, a cinamomo differre dicant, q̃ a natura eius abhorreat. Cinamomum omne exalfacit, emollit, et cōcoquit. Vrinā ciet. Tam mēles quam partus potū aut ex myrrha impositū pellit. Cōtra bestias quæ virūs eiacularūt, venenaq̃ cōuenit. Caliginē pupillis oculorū obuersantē discutit. Crassiti-

DE MEDICINALI MATERIA

em extenuat. Lentigines & vitia cutis in facie ex melle illitum detergit. Contra tussis, defluxiones, aquam subter cutē fusam, renū vitia, et vitiā difficultatē efficacis est. Vnguētis preciosis inseri solet. & in summa, magni ad omnia vſus. Tritum vino excipitur, vmbraꝝ fſccatū, quo diutius eduret, recōditur. Est & quoddam cinamomum, quod aliqui pseu- docinamomum appellant, perq̄ denso atq; crasso sarmēto, longe tamen inualidius cinnamomo, & odore & gustu.

De Amomo.

CAP. XVI.

a Momum exigue fructicat, ex ligno se conuoluens in vuae modum. flore cu candida violā, paruo. folijs vitis albā simili- bus. Laudatur q̄maxime armeniacū, fuluo auri colore, ligno subruſso, valde odorato. Medicū, quoniā in campeſtrib⁹ et aquoſis ena- ſcitur, infirmius eſſe cōſtat. Eſt autem magnum, ſubuiride, tactu molli, frutice venoſo, odore origani. Pōticum vero ſubruſſum, parū, fragile, racemoſum, fructu turgens, & odore nares feriens. Deligito recens, can- didū vel ſubrubrū, quod nec aſtriſtū cohæreat, nec cōuoluatur, ſed ſo- lutū diſſundatur, ſeminis plenū, vuis paruis ſimile, graue, odoratū, mo- do cariē non contraxerit, acre, gustu mordens, ſimplici colore non eua- riente. Vim habet caſſaciendi, aſtringēdi, exiccādi. Somnum allicit, & illitum frōti, doloris ſenſum aufert. Inſlāmationes & meliceridas con- coquit, diſcutitq; . Iuuat quos ſcorpius percuffit, ex ocymo illitū. Et po- dagricis conſert. Inſlāmationes oculorū viſcerūq; lenit ex vua paſſa. Ad vuluarum vitia in peſſis, aut inſeſſionibus vtile eſt. Decoctum ioci neri, renibus, podagrā, potu conuenit. Antidoriſ immiſcetur, & pre- cioſiſſimis vnguētis. Adulteratur hærba amomo ſimili, quā Amomis vocatur, ſed ſine odore, ſine fructu. Naſcitur in armenia, flore origani. Quare i huiuſcemodi probationibus fragmēta fugiēda ſunt. Eligēda autem quā ab vna radice integros ſurculos emittunt.

De Coſto

CAP. XVII.

p Ræcellit Arabicus candidus, leuis. eximia odoris ſuauiatē. Secundū locuſi ſibi vendicat indicus, leuis, plenuſ, vt ſeru- la niger. Tertius eſt ſyriacus, grauiſ, colore buxeus, & odo- re feriens. Optimuſ eſt recens, albuſ, abūde plenuſ, denſuſ, a terebinti- bus non eroſuſ, ſine graueolentia, gustu caliduſ ac mordens. Viſ ei ex- caſſatoria. Vrinā ciet. Menſes pellit. Vitijs quā vuluā male habēt, tam impoſitu q̄ ſotu auxiliatur. Contra viperarum morſuſ ſextatē bibere prodeſt. Item aduerſuſ pectoriſ doloreſ, conuulſa, inſlāmationeſq; ex vi- nō & abſinthio. Venerē ex mulſo ſtimulat. Laras vētriſ tineas ex aqua pellit. Rigentibus, ex oleo, ante febrim ſignificationeſ, & neruorū re- ſolutionibus oblinitur. Vitiā cutiſ in facie, cum aqua vel melle illituſ

emēdat. Additur ī ātidota & malagmata. Sunt qui āmistis helenij co-
mageni prēduris radicibus, adulterent. quod deprehensu facile est. Si
quidem neq; gustu feruet helenium, neq; validum odorem vibrat, vt ca-
put tentare possit.

De odorato Iunco

CAP. XVIII.

Doratus Iuncus, in africa & arabia nascitur. Laudatissimus
o ex nabathea, Proxim^o arabicus, quē aliqui babylonium co-
gnominant. Alij teuchitin. Pessimus ex africa. Eligendus est
ruffus, recens, floribus refertus, tenuis, rubētibus fragmentis, qui ma-
nibus cōfricādo rosę odorem emittit. Igneq; mordacitatis ad linguā.
Floris & arundinū radicisq; est vsus. Vm vringe ciunde habet. Men-
ses pellit. Discutit īflationes. Caput aggrauat. Modice astringit, com-
minuit, excoquit, ac venarum spiracula laxat. Vrinā mouet. Flos eius
in potu utilis sanguinē reicientibus, doloribus stomachi, pulmonis,
iocineris, & renū. Miscet ātidotis. Radix astrigēti^o est. Ideo fastidi-
is stomachi, hydropicis, conuulsis, cū pari pōdere piperis, per dies ali-
quor dat. Decoctū vuluę īflātionib^o, ad desidentiū for^o, vtile est.

De Calamo odorato

CAP. XIX.

Alamus odoratus in india nascitur. Nelior est fuluus dense
c geniculat^o, et qui assulose frangitur, plena araneorū fistula, al-
bicās, lentus in mandendo, & asringens, ac cum aliquanta
acrimonia amarus. Vrinā potu ciet, quare cum graminis aut apii semi-
ne coctus, ī aq; subter curē fuscę morbo, renū vitiis, stillicidio vringe,
ruptisq; cōmode bibitur. Menses et potu & appositu pellit. Tussi sus-
fitu medetur per se, aut ex resina terebithina, hausto per arundinem fu-
mo. Ad muliebres infessus decoquitur. Et clysterib^o imponitur. Suffi-
tionibus, malagmatisq; odoris gratia commiscetur.

De Balsamo

CAP. XX.

Alsamum, arbor albę violę, lycij, aut pyrachathę magnitu-
b dine conspicitur. Foliū rutę proximū, longe candidius, pera-
petuo virens, in iudea solum quadā valle & ægypto nascēs.
Iis differens modis, scabricia, proceritate, gracilitate, quod igitur tenui
& capillacea coma est, theristū vocant, quasi demessile. Fortassis quo-
niā ob gracilitatem facile demetur.

De Opobalsamo.

CAP. XXI.

Estiuus sub ortu canis ardorib^o, arbos vnguibus ferreis in-
a ciditur, manatq; e plaga succus, quem opobalsamū vocant.
sed tā exiguo stillatu, vt annis singulis, ne plures quidē q̃
seni septenive congi cogantur. Inibiq; pondus, duplo repēditur argē-
to. Succī probatio est, vt sit recens, validi odoris, syncerus, nō ad aco-

DE MEDICINALI MATERIA

rem vergens, pellucidus, lævis, astringens, ac modice mordens gustu. Sed varie vitiat, misto ab aliquib⁹ terebithi, cypri, lētisci, balani vnguento. Itē susino, metopio, melle, aut cypria cæra, quod maleficiū facile depræhenditur. Namq; merus in laneā vestem fusus, neq; maculā facit, neq; si eluatur notā reliquit. Vitiatus autē inhæret, & lac instillat⁹ coagulat, quod adulterat⁹ non efficit. Quietia syncærus in aqua aut lacte celerrime liquatur lætescitq;. Vitiat⁹ vero olei modo innatat, se cōuoluens, aut in stellæ modū diffundēs. Syncæ⁹ senescens crassescit, deteriorq; redditur. Allucinant⁹ qui aqua concretū pectus ire, & ad ima fidere arbitrantur, postea dissipatū supernatare.

De Xylobalsamo

CAP. XXII.

Ligni genere quod xylobalsamū vocant pbatur recens, tenebue, fuluū, odoratum, quadā tenuis opobalsamū spirans. Nec cessari⁹ etiā feminis erumpit vsus. Quare eligatur flauū, plenum, grande, ponderosum, mordens gustu, seruens in ore, modice opobalsamū olens. Adulteratur semine hyperico simili, quod a petra oppido defertur. Sed coarguitur magnitudine, inanitate, viriū ignauia, sapore piperis. Efficacissima vis inest succo, & q̄maxime calfaciēs. Abstergit, quæ tenebras, oculorum pupillis offundūt. Medetur perfrictionibus vuluæ, cum rosaceo cærato appositus. Menses quoq; secundas, & part⁹ extrahit. Rigores illitu discutit. Vlcera sordida expurgat, & cruda cōcoquit. Vrinā potu ciēt. Aegre spirantibus prodest. Datur in lacte contra aconitū hausuū, aut serpentū ictus. Miscetur acopis, malagmatibus, & antidotis. In summa, præcipua autoritas succo, secūda semini, minima ligno. Semen cōmode potui datur doloribus lateris, pulmonum vitijs, tussi, ischiadicis, comitialibus, vertiginosis, orthopnoicis, vrinæ difficultati, torminibus, ac serpentum moribus. Ad muliebres suffitus perq̄ vtile est. Vuluā aperit in deflectionibus balnearū decoctū, & humorē euocat. Lignū eadem habet vires aliquāto minores. Ex aqua potum cruditatib⁹, torminosis, vulvis, venenatorū ictibus e pitulatur. Vrinā cit. Ad capitis vulnera cum ficca iri cōuenit. Squāmas ossium extrahit. Et ad vnguentorū spissamenta additur.

De Aspalatho

CAP. XXIII.

Spalathus quem alij Eryfisceptron, alij phasganon, Syri diaxylon vocant, frutex est furculosus, multis spinis horrens. Nascitur in istro, nisyro, syria, & rhodiorū insula, quo ad vnguentorū spissamēta pigmentarij vtuntur. Optimus est grauis, detracto cortice rubens, aut in purpuram vergēs, odoratus, gustatu amarus. Est & alterum genus candidū, lignosum, sine odore, quod deterius habetur. Vim calfaciendi cū astrictione obtinet. Vnde decoctū cum vino

ad oris vlcerat colluenda conuenit. Ad nomas genitaliū & sordida vlcera infunditur. Subiectum in pello, partum extrahit. Aluum fistit eius decoctum. Et sanguinis reiectionem potu cohibet. Vrinae difficultatem inflationesq; discutit.

De Musco

CAP. XXIII.

b Ryō id est musc^o, a quibusdā splachnō appellatur. In cedro arbore, populo alba, & quercu iauenitur. Optimum est cedri nū. Proximum populneū. In quo genere candidum & odoratus præstat, nigricans improbat. Astringendi vim habet. Decoctū infidentium vuluis vtile. Vnguento balanino, oleisq; inspissandi gratia inseritur. thymiamatum, acoporumq; cōpositionibus conueniens.

De Agallocho

CAP. XXV.

a Gallochū, lignum est quod ex india atq; arabia deportatur. thuia ligno simile, maculatum, odoratum, gustu astringens, cum quadam amaritudine. cute vestitur aliqtulum versicolore. Manditur, aut decocto os colluitur, cōmendandi halitus gratia. Sudores arcet toto corpori insparsum. Prothure ad suffimenta substituitur. Radix epota drachmæ vni^o pōdere, humida stomachi vitia, & imbecillitatē, feruorēq; mulcet. Si lateris, iocinerisve dolor excruciat, si dysenteria, aut tormina infestant, ex aqua bibere prodest.

De Narcaphtho

CAP. XXVI.

n Arcaphthum ex india desertur, corticosum, simile scycomori libro, quod iucundi odoris gratia suffitur. Miscetur thymiamatis cōpositis. Cōstrictionibus vuluæ suffitu prodest.

Ce Cancamo.

CAP. XXVII.

c Ancamum arabici ligni lachryma est, myrrha quodammodo similis, olidi gustus, quā ad suffimenta vsurpant. Vestes eo ex styrace & myrrha suffiuntur. Vim proditur obtinere extenuandi obesos, si ternum obolorum pōdere ex aqua, aut mulso aceto, aliquot dies ebibatur. Lienosis datur, comitialibus, & suspiriosis. Menses cum aqua mulsa pellit. Oculorū cicatrices confestim emēdat. Vino madefactum medetur eorundē hebetudinibus. Aduersus gingiuas humore prægnaeis, doloresq; dentium, non aliud efficacius.

De Cyphi

CAP. XXVIII.

c yphi thymiamatis cōpositio est, dicata dijs, qua abūde ægyptijs sacerdotes vtūtur. In antidota misceri solet. Suspiriosis datur i potu. Permultæ cōponēdi rationes, quarū vna hæc est. Sumitur cyperi dimidium sextariū, cum pari iuniperi adultæ modo. vuæ passæ pinguis, exemptis vinaceis, minas duodecim. refinæ res purgatæ minas quinq; calami & iunci odoratorum & aspalathi, singu

DE MEDICINALI MATERIA

lorum minā. myrrhæ duodecim. vini veteris sextarios nouem, cū duabus mellis minis. vuam detractis vinaceis tufam, cū vino & myrrha fubigito, cætera tufa & cribrata adijcito. die vno humorē cōbibere finito. dein mel coquito, dum fibi glutinis afciscat craffitudinē. eliquatam refinā accurate permisceto cum reliquis diligenter contritis, & in fictile vas recondito.

De Croco

CAP. XXIX.

c Rocum ab aliquib⁹ castor, ab alijs cynomorphos, a magis herculis sanguis appellat^r. Optimū in medēdi vsu coryceū, recēs, & boni coloris, paulū cādidi gerēs in capreolo, ob lō gum, oib⁹ suis partibus constās, nō fragile, plenū, a quo detractū est nī chil, quod madefactas manus inficit, nec fitū redolet, aut cariem sentit, subacre. Sin hui⁹ generis nō est, aut vetus, aut humore perfusum creditur. Secūdus locus datur coryceo, e tractu lyciæ cōtermino. Terti⁹ lycio e mōte olympo. dein ex agibus ætolix. Cyrenaicum e centoria, inter ficilica omnia viribus præstat. Omniū ad obsonia vsus. Itali tamē ob succi copiam, & coloris venustatē, ad thuiæ infectus vsurparūt. quibus de caulis magno venditur. Vtilissimū in medicina quod ante descripsimus. Adulteratur immisto crocomagmate tuso, atq; etiā sapæ subtilu, contrita, quo pōdus adijciatur, simul argēti spuma, aut plū bagine. Sed maleficium declarat infidens puluis, præsertim si sapam oleat. Thessalus ipsum tantū odoratum esse voluit. Alij exitiosum, tribus drachmis ex aqua potis. Proculdubio vim coquendi, emolliendi, atq; substringendi habet. Vrinā cit. Elegātem colorē præstat. Qui ex passo biberint, crapulā non sentiēt. Oculorum fluxiones illitum cum humano lacte, cohibet. Additur in potiones, quæ interaneorum causa temperantur. Ad vuluæ etiā, sedisq; cataplasmata, commode permiscetur. Venerem stimulat. Vergentes ad ignem sacrū inflammationes mulcet. Auricularijs collectionibus vtile. Quo facilius cōteratur, in calido fictili sole ficcari opōrtet, celeriterq; versari. Vrinā mouet radix ex passo pota.

De crocomagmate

CAP. XXX.

f It etiam expressis vnguenti crocini odoramentis, quod crocomagma vocant. Optimū est odoratum, modice myrrhā olens, graue, nigrū, ligni expers, læue, subamarū. quod madefactum croci colorem reddit, gustatumq; vehementer dentes ac linguā inficit, multis durans annis. Quale est quod a syria deferitur. Habet suas vires ad delenda quæ caliginem oculis obuersant. Vrinā cit. Calfas cit, concoquit, & emollit. Vires croci proportionē repræsentat, quandoquidē plurimam croci partem fibi crocomagma vendicat.

LIBER PRIMVS

8

De Helenio.

CAP. XXXI.

Emla rampans

h Elenium quod symphyton aliqui vocant, alij persicam, alij medicam, alij oreum, alij nectarion, alij cleoniam, alij idæam baton, aut stomū, Latini terminalium, aut enulam cāpanam, Aegyptij lenen, folia habet verbasci angustioris folij, asperiora, oblonga. Caulem quibusdam in locis non emittit. radicem subalbidam, interdum subruffam, odoratam, acrē, vegetam, magnam, ex qua agnatæ appendices liliorum aut ari modo feruntur. Montibus in vmbrosis, siccoq; solo prouenit. Foditur æstate radix, particulatimq; dissecta ficcatur. Potum radice decoctum menses & vrinas ciet. Ipsa q; i eclegmate ex melle prodest tussi, orthopnœæ, ruptis, cōuulsis, inflationibus, & serpentiū moribus. In summa excalfaciēs. Folia ex vino cocta vtiliter ischiadicis illinūtur. Helenium stomacho vtile, in passo conditum, siquidē salgamarij paululum ficcata radicem, mox decoctam, & frigida aqua madefactam, in sapā conijciūt, et ad vsus recondunt. Trita potaq; ad cruentas excreationes efficax est.

De altero Helenio.

CAP. XXXII.

a Iterum helenij gen^o in ægypto gigni Crateuastradit. Hæc ba est cubitalibus ramulis, serpylli modo per humū repentibus, folijs lenticulæ, sed longioribus crebrisq;, radice pallida, digiti minoris crassitudine, p imatenui, superne crassa, cortice nigro. Nascitur in maritimis collibusq;. Radix vna in vino epota, contra serpentium iētus auxiliatur.

de marcello

De Omphacino oleo.

CAP. XXXIII.

o Leum quod ex immaturis oliuis exprimitur, ad multos vsus recte valentibus accommodatissimum, Omphacinum id appellatur. Præstat recens, odoratum, quod non mordeat. Tale vnguētorū compositionibus idoneū intelligitur. Stomacho vtile est quod astringat. Gingiuas cōtrahit. Dētes firmat, si cōtineatur in ore. Sudores cohibet. Et quo vetustius ac pinguius, eo ad medicamētā aptius est. Et vt reliqua in commune dicantur, omne oleum calfacit. Emollit ventrem. A perfrictionibus corpus tuetur, ipsumq; prōptius ad obeunda munera reddit. Aluū laxigat. Vlceratorum medicamētorum vires permittū hebetat. Cōtra venena datur, assidue potū redditumq; vomitionb^o. Soluit aluū heminae mēsurā cum pari prisanae succo aut aqua potum. Ad tormina calidum simul decocta ruta trib^o sextarijs in potu datur. Ventris animalia pellit. Idē maxime ilei intestini morbo laborantibus infunditur. Vetus magis calfacit & vehementius discutit. Oculorū claritati sublitum confert. Si vetusti nō sit occasio, in vase decoquitur ad mellis crassitudinem vt vetustatem

de marcello

DE MEDICINALI MATERIA

repræsentet.

De Oleo syluestris oliuæ.

CAP. XXXIII.

Leum quod syluestres oliuæ fundunt, vehementer astringit,
 & ad sanorū vsus secundum sibi locum vendicat. In dolori-
 bus capitis vtiliter pro rosaceo substituitur. Sudores arcer.
 Defluētes capillos inhibet. Furfures, vlcera capitis manātia, scabiē,
 leprasq; abstergit. Tardius caniciē sentiunt, qui eo quotidie perungū-
 tur. Candidum oleum fit hoc modo. Album colore nec anniculo ve-
 tustius, in nouū fidile oris patuli funditur, centū heminarū mēsurā, &
 sub solem media quaq; die concha refunditur, ex altoq; demittitur, vt
 assidua deuolutiōe, ictuq; agitatū respumet, octauadie sēnū græcū mū-
 dū quinquaginta drachmarū pondere, calida aqua madefactū donec
 emollefcatur, in supradictū oleū deijcitur, ita ne extillet aqua. Postea te-
 dæ præpinguis picæ, assulatim casæ æquale pōdus adijcitur, & trās-
 actis octo diebus, oleum cōcha mouetur. Si intentum finem assequa-
 tur, in vas nouum vetere vino affusum recondi debet, substratis fertu-
 læ campanæ corollis drachmas vndecim pendētibus, cum pari iūdis
 pondere. Sin minus, rursus soli mandandū, & idem munus obeundū,
 vsq; dum inalbescat.

De Sicyonio.

CAP. XXXV.

Sicyonij cōponēdi ratio hæc est. In lebetē oris lati stāno idu-
 fctū, funditur olei albi quod crudæ oliuæ reddiderūt, cōgius
 vnus, aquæ cōgius semis. leui id igne coquitur, leniter mo-
 uēdo. At vbi bis efferbuit, & substracto igne refriguit, innatās oleū cō-
 cha tollitur, & adiecta noua aqua conferuefcit, & reliquis vt diximus
 peractis reponitur. In sicyonia maxime fieri consueuit, Sicyonij in-
 de accepto cognomine. Calfactonam ad quendā vsq; modum vim ha-
 bet. Febri ac neruorum vitijs prodest. Fœminæ ad cōmendādū faciē
 nitorem eo vtuntur.

De strigmentis balnearum.

CAP. XXXVI.

Trigmenta a balneis calfaciunt, molliūt, discutiunt. Ad se-
 dis rimas & cōdilomata illinūtur. Illa vero quæ ex palæstris
 puluere sibi asciuerūt, in sordis speciē redacta, articulorū no-
 dos imposita adiuuāt. Ischia dicis in fatus aut malagmatis locū, calida
 cōmode sufficiūtur. Dersæ gymnasiōrū parietibus simulacrisq; for-
 des calfaciunt. Tubercula, quæ ægre ad cōtionem perducuntur, diffi-
 pant. Desquāmatis & vlceribus sēnū profunt.

De Elæomelite.

CAP. XXXVII.

N palmyris syriæ quod Elæomeli vocant, ex quodā caudice
 manat, crassius melle, sapore dulci. Bilem, cruditateq; detra-

hit, sextario cū vna aquæ hemina dato. Sed qui sūpsere, torpescūt & vīribus deficiūt. quod minime vereri oportet, verū crebro excitare ne veterno pressi somnos captēt. Fit & oleū e piguitudine surculorū oleæ. Optimū vetus, crassū, pigue, nō turbidū. Calfacit. Priuatī caliginib⁹ oculorū illinitur. Lepras, neruorūq; dolores, illitum emendat.

De Cicino oleo.

CAP. XXXVIII.

In cinū oleū hoc modo tēperat. Maturi ricini quavoles quātī tate torrido sole flaccescūt, et instrati tātis per insolantur dū vestiens cortex fractus decidat. Caro colligitur, & cōiecta in pilā diligēter tūdītur, postea in lebetē stanno illitū, qui aquā habeat demittitur, subiectoq; igni feruescunt. & vbi insitū prorsus humorē reddiderūt, sublato ab igni vase, innatans oleū concha tollitur, & recōditur. Sed in ægypto, vbi largior increbuit vsus, lōge secus fieri solet. Nā repurgatos ricinos molæ mandant, & accurate molitos per spōratulā organo exprimūt. Tū quidē ematuruerunt ricini, cū cōtinētibus orbiculis exuūt. Ad p̄foras, & vlcera capitis manātia valet. Prodest inflāmatioib⁹, vuluis cōuerfis atq; p̄clusis. Itē idecoris cicatricib⁹ & auriū dolorib⁹. Emplastra efficaciora reddit additū. Potu aquā aluo extrahit. Vētris aialia pellit. De amygdalino oleo. CA. XXXIX.

Mygdalinū oleū quod aliqui metopiū vocāt, hoc fit mō. Se modius ex amaris nucib⁹ repurgatis ficcatisq; in pila ligneo pistillo leniter tūdītur in ossas. aquæ quæ ferbuerit sextarius adijciūt. & vbi dimidia hora humorē hauserit, vehemētius q̄ ātea tundit, mox tabellis premīt. & quod digitis hæsit, cōcha excipit. Pressis nucibus rursum hemina aquæ ispergit. & postq̄ ebiberit, idē opus psequēdū. Sigulas heminas reddūt singuli modij. Cōtra vuluarū dolores, strāgulatus, cōuerfioes, & eorū dē locorū inflāmationes efficax est. Vitijs renū, calculosis, difficili vrinæ, suspiriosis, lienosisq; p̄ficat. Dolores capitis, grauitatē auditus, sonos incertos, tinnitūq; discutit. Maculas tollit in facie, & cutē erugat cū melle radice lilij & tyria cæra aut rosaceo cærato. Et oculorū hebetudines emēdat. Vlcerā capitis manātia & furfures cum vino abstergit. De Balanino oleo CAP. XL.

Imili modo fit balaninū oleū, quod repurgat maculas, lētigines, varos, & cicatrices nigras. Aluū soluit. Stomacho aduersatur. Cōtra auriū dolorē, sonos, et tinnit⁹ auxilio est cū āserino adipe instillatū. Sifis sesamini ratio. Fit etiā e nuce iuglādē oleū, qd caryinū vocāt. Eādē vi habet q̄ balaninū. De Hyosciamino oleo. C. XLI.

hyosciaminū sic fit. Semē cādidū, recēs ac ficcū tūdīt. & calida aspergit aqua, vt i amygdalino diximus. dūq; isolat ficcatae partes madidis p̄misceāt. hoc autē fieri oportet, dū nigrescat & grauitatē oleat. Mox pressū atq; excolatū recondit. Ad auriū dolores efficax est. Pessis miscetur. ad emolliendū vtile.

DE MEDICINALI MATERIA

De Oleo e grano cnidio. CAP. XL. 11

f It & grano cnidio purgato & tuso. Vis ei aluū soluere potu-
De Cnicino oleo. CAP. XLIII.

n On secus cnicinum oleum temperatur. Cui facultas eadem
est quæ factio e gnidio grano, verum inualidior.

De Rhaphanino. CAP. XLIIII.

r Haphaninum e rhaphani semine fieri solet cæterorum more.
Phthiriasis mala valitudine cōtractas tollit. Scabritias cutis
in facie emendat. Ad obsonia vtuntur ægyptij.

De Melano. CAP. XLV.

m Elanthinum idem quod rhaphaninum potest.

De Sinapino. CAP. XLVI.

t Ritū sinapis semen, & calida aqua madefactū, adiecto postea
oleo exprimitur. Id ad diuturnos dolores efficax est. Trāssert
humores qui in aliqua parte concreuerunt.

De Myrteo oleo. CAP. XLVII.

m yrtē faciundi ratio hæc est. E myrto nigra syluestri, aut satia-
ua, foliorum mollissima quæq; tusa premuntur. Succo pares
omphacini olei portiones adiiciuntur. subiectisq; carbonibus
inferuefcunt donec concoquantur. Innatans oleum deraditur. Sed lon-
ge facilius hæc compositio. Tenera folia contusa coquantur in oleo &
aqua, & quod innatat eximitur. Priuatim alij deiecta in oleū folia in
sole macerant. Alij prius oleum inspissant malicorio, cupressō, cypri-
ro & iunco odorato. Efficacius est amarum gustu & oleolum, viride,
translucens, & olens myrtū. Astringit & indurat. Ideo medicamentis
miscetur quæ cicatricem obducunt. Prodest vlcēibus in capite ma-
nantibus, ambustis igni & papularum eruptionibus. Facit ad attrita
et furfures, sedis rimas, condylomata, articulos laxatos, corporis sudo-
res, & ad omnia quæ astringentem inspissationēq; desiderant.

De Laurino. CAP. XLVIII.

l Aurinū fit hoc modo. Maturæ lauri baccæ in aqua coquun-
tur. siquidē ex obducto corticæ quandā piguitudine reddunt
quæ manibus expressa, cōcha excipitur. Alij ōphacinū prius
oleū cypriro iūco odorato, & calāmo inspissant, deinde mollia lauri fo-
lia cōcoquunt. Alij etiā baccas, donec oleū odorē cōtraxerit. Alij styra-
cem & myrtum addunt. Optima laurus ad id latifolia & montana.
Oleum laurinum vtilius quo recentius, quoq; viridius colore, amarif-
simum, & acre. Vis ei excalectoria, emolliēs. Venarū spiracula laxat.
Lassitudines discutit. Omnibus neruorū vitijs, horroribus, destillati-
onibus, aurium doloribus, malis renū frigore contractis, illitum non
aliud iuuantius. Attamen potum nauseam parit.

LIBER PRIMVS

10

De Lentiscino.

CAP.

XLIX.

Imilis lentiscini ratio. Nā e maturo fructu temperatur, fa
fctis prius spissamentis vt in laurino diximus. Hoc scabiem
iumentorū canūq; sanat. Vtilissimū pessis, acopis, & lepra-
rū medicamētis. Sudores cohibet. Nec secus terebenthinū fieri solet.
quod refrigerat & astringit. De Mastichino oleo CAP. L.

Astichinū e trita sit mastiche, quod contra oīa vuluæ mala
m efficax est. Mediocriter calfacit, astringit, & emollit. Aduer-
sus prominētes stomachi duricias, cœliacorū, dysētericorūq;
cruciat⁹, vtile. Faciē emaculat, & colorē nitidū facit. Optimū in chio
insula cōponitur. De Vnguentorum ratione CAP. LI.

E ratione vnguentorū cōsequēter tractandū existimauimus.
d quādoquidē ea in nōnullis corporū virijs, aut medicamētis
mi sta, aut corpori perfusa, aut naribus obiecta, plurimū pro
sunt. In quorū probationib⁹ cōsulere nares oportet, an ea oleāt ex qui-
bus tēperatur. Optimū huiuscemodi iudiciū, quod in quibusdā plane
obseruari nō potest, propter ea quæ admiscētur odore cæteris præua-
lētia, vt i amaracino & crocino, telino, & plerisq; alijs, quæ cræbra cir-
ca hæc meditatione experiri cōueniet. De Rosaceo. CAP. LII.

Osaceū oleū sic fit. Iunci odorati quicq; libras & bessem tū-
r dīto, & subactas aqua in duabus olei libris & quicunque suba-
ide mouēdo coquito. Dūq; pcolaueris, i olei libras viginti &
quicuncē, adijcito rosas nō madefactas numero mille, & manib⁹ melle
le perundis identidē moueto, sensim premēs. finito nocte tota macera-
ri. postea exprimito. & vbi recrementū pessum ierit, mutato vase, in
craterē melle illitū recondito. Cæterū rosas quæ antea pressæ fuerunt,
in labellū demittito, & affusis octo libris & quadrante spissati olei, ite-
rum premito. eritq; secūdariū oleū. Quod si tertias vsq; quartasve per-
fusiones infundens exprimere voles, secūdariū fiet, tertiariū, & quarta-
rium vnguētum. Sed quoties id feceris, vasa melle oblini debēt. Si ve-
ro secūdā adiectionē instituere libet, in expressum oleū, numero pari
recētes rosas nullo humore ibutas inijcito. manibus melle præmadefa-
ctis, agitans premito, & iterū, tertio aut quarto, simili modo exprimēs
facito. totiesq; recenteis rosas detrahis vnguibus immittito. fiet enī ita
oleū multo validius. Nā septies oleū rosarū infusionē admittit, nec am-
plius. Prælum melle perungatur. Oleum a succo diligenter secerni
oportet. nam si minimū quid relinquat, vnguētū corrūpet. Alij autem
detrahis vnguibus, rosas tantum oleo macerant in sole hoc modo.
Rosæ quæ selibram pondere æquant, in sextario olei diebus octo
madescunt & vsque tertiam perfusionem quadraginta diebus inso-
lantur, & sic oleum reconditur. Alij calamo, aut aspalatho prius
b.ij.

DE MEDICINALI MATERIA

olei spissamēta faciunt. Alij coloris causa anchusam admiscēt, & salē quominus oleat. Vim astringendi & refrigerandi obtinet. Fomentis et cataplasmatibus vtile. Potū soluit aluū. Stomachi ardorē restiguit. Vlcera caua replet, & mulcet quæ cacoethe vocātur. Vlceribus i capite manātib⁹, atq; feruidis eruptionib⁹ illinitur. Caput dolēs eo p̄fundit. Dētes inter initia doloris collui prodest. Ad genarū duricias illitū efficac est. Ad laceffita interanea & cōcitas vuluas vtilissime subijcitur.

De Elatino.

CAP. LIII.

Racta elate tusa & scarificata in labellū deijcitur. Omphacinū oleū triduo infunditur, mox per sportulā exprimitur. Verū pares esse debēt vtriūsq; portiones. deī mūdo vase ad vsus recōditur. Viribus rosaceo proportionē respōdet. Aluū tamen nō mollit.

De Melino.

CAP. LIIII.

Elinū oleū hoc mō tēperatur. Olei cōgius, decē aquæ sextarijs ammiscetur. Adijcitur spathæ fractæ quadrans, & iūci odorati vncia, quæ die vno macerata coquuntur. mox in vas oris patuli oleū excolatur, & indita harundinacea crate, aut vetusta tegete, cotonea mala superponuntur, et vestimentis operta tantisper ibi residēt, dū malorū vires ad se oleū alliciat. Aliqui cotonea, decē die rū spatio operimētis inuoluūt, vt cōtineatur odor nec euanescat. Postea biduo macerata oleo, exprimūt. oleūq; reconditur. Id vim refrigeratoriā et astringentē habet. Contra scabiola vlcera et quæ serpūt, ac furfures, perniunculosq; effectū præbet. Exulceratis vuluis infunditur. Citatā vrinā sistit inditū. Sudores cohibet. Contra cantharidas, bupressi, pinorū erucas, bibi. Laudatur maxime quod cotonea mala olet.

De ænanthini compositione

CAP. LV.

Enanthe e labrusca, optime olēs postq̄ emarcuit, deiecta in omphacinū oleū mouetur, voluiturq; et cū biduo manserit exprimitur, oleū reconditur. Astringit, proximū rosaceo effectum præbens. sed aluū non resoluit, aut mollit. Probatissimum est quod odore ænanthem refert.

De Telini componendi ratione

CAP. LVI.

Oeni græci libræ quinq; calami libra vna, cypiri libræ duæ, olei libris nouem septenis diebus macerantur, quotidie ter mouētur, postea premūtur. Aliqui pro calamo cardomomū substituūt, & cypiri loco xylobalsamū macerant. Alij oleo antea his odoribus spissato sœnū græcū macerātes exprimūt. Hoc telinū abscessus emollit, et cōcoquit. Oibus vuluarū duricijs magnopere cōuenit. Fœminis difficile parietibus subijcitur, vbi præ excretis humoribus loci ficitatē cōtraxerūt. Sedis inflāmationes lenit. Tenesmo subditū prodest. Vlcera capitis manātia furfuresq; expurgat. Ambustis & per-

nionibus addita cæra proficit. Vitia cutis in facie emendat. Pigmentis ad conciliandum faciei nitorem inferitur. Eligi oportet recēs, quod non vehementer fœni græci odorem præ seferat, & manus abstergat, sapore ex dulci in amarum inclinato. Tale enim optimum iudicatur.

De Sampsuchino CAP. LVII.

Erpilli, casia, abrotoni, florum sisymbrij, frōdiū myrti, samfuchi singulæ portiones, quadam pro viribus singulorum cōiectatiōe, vna tundūtur. atq; is ophacini olei modus adijcitur, qui madentium vires non euicat, hæc post quatrduum exprimūtur. denuo aliā, simili mēsurā & æquali tempore macerata premuntur. ita enī validius reddi solet. Eligi oportet sampsuchū colore nigrum, plurimū redolēs, mediocriter acre. Vi habet acrē, calfa&toriā, extenuatē. Aduersus vuluæ præclusiones, cōuerfionesq; efficax est. Mēses & secūdos partus extrahit. Vuluæ strāgulatus recreat. Lūborū iginūq; dolores lenit. sed cū melle vti eo præstat, quādoquidē vehemēti astringitione locos indurat. Lassitudines illitū discutit. In opisthonicorum, vulforumq; cataplasmata vtilissime additur.

De Ocimini compositione. CAP. LVIII.

Ciminū oleū fit vt cyprinū, ocimi folia detrahens librarū
o vndecim & bessis pondo, die noctūq; viginti olei libris macerato, premito, colato. Cūq; exhauseris quallū, rursus parē olei modū fundito, & exprimito. Vocatur autē id secūdariū. nā tertriæ perfusionis nō est capax. Deinde recēs ocimū æquali pōdere vt in rosaceo diximus, maceratur. & cū tāto tēporis spatio maduerit, exprimitur, & oleū recōditur. quod si in animo fuerit ter aut quater madefacere, semper ocimū recēs addes. Potest ex omphacino cōfici, sed illo modo melius. Idē quod sampsuchinū potest, sed inefficacius.

De Abrotonini compositione. CAP. LIX.

Lei cyprini odoribus ibuti libris nouē & quicūce, foliorū
o abrotoni libras octo die noctūq; madefactas, premito. quod si in lōgū tēpus oleū velis asseruari, eisdē prioribus folijs, noua appones, & macerata exprimes. Calfacit. Ad vuluæ duriciās præclusionesq; efficax est. Menstrua & secundas pellit.

De Anethini compositione. CAP. LX.

Lei libris octo & dodrante, florum anethi libras vndecim &
o bessē maceratas, manibus premito, et recōdito. quod si iterū perfūdere velis, recētes anethi flores cōsimiliter madefacito. Vuluarum duriciās emollit. Venarū spiracula laxat. Cōtra rigores febriū circuitu redeuntes auxiliatur. Calfacit enī et lassitudines discutit. Prodest articulorum doloribus.

DE MEDICINALI MATERIA

De Sufini compositione.

CAP. LXI.

Vinum, quod alij liliū appellant, sic temperatur. Olei libræ nouē cū quincūce, calami libræ quinq; & quadrans, myrrhæ vnciæ quinq;, permixto odorifero vino decoquūtur. & colato oleo, cardamomi tuli & cœlesti aqua madefacti libræ tres & semis macerātur, p̄muturq;. Tres libræ cū semisse spissati olei assumūnt. Mil le lilia decerptis folijs in latum labellū demittūtur. Iniectū oleū, manibus melle punctis agitur. die noctuq; conquiescūt, & in pixidē maturinis exprimūtur. Oleum protin⁹ ab aqua, quæ simul expressa fuerat colo incerni oportet. non enī vt rosaceū morā tolerat. Nā concalscētū feruet & cōputrescit. Quare sæpius decapulādū. Vasa melle illinēda. Tenuis sal inspargendus. & si qua sordes vasis faucibus hæsit, eximenda. Odoramentis iam expressis ex quasillo in labellū transfusis, rursus olei prius odoribus imbuti quod primū pondus æquet, & cardamomi tuli drachmæ decē cōijciūtur. Hæc manib⁹ scite pressa, iteriecta breui mora exprimuntur, quod profluit repurgatur. tertio eadē infundūtur adiecto cardamomo & sale, & manib⁹ melle madefactis. Lōge optimū erit quod prius exprimitur. Proximū quod sequitur. Tertiū locū sibi vēdicat, quod nouissimum prodiit. Denuo i mille lilia enulsis folijs, expressum primo oleū infunditur. tū porro prosequēdū, eadēq; faciēda vt prius, addito cardamomo, dein expresso, & quo frequent⁹ recētia lilia maceraueris, eo validius vnguētum efficies. Deniq; cum factū abunde videbit⁹, singulis cōpositionib⁹ miscere cōuenit myrrhæ q̄o primæ duas & septuaginta drachmas, & croci decē, cardamomi quinq; et septuaginta. Croci vero & cinamomi pares portiones tundūtur, & cribratæ in labellū cū aqua demittunt⁹. expressumq; primo vnguentū infundit⁹. et paulopost excipiunt⁹ vasculis ficcis myrrha aut gūmi antea perfusis, et croco, melle & aqua, madefactis. Eadē sunt in altera aut tertia expressione. Aliqui simplex ex balanino, aliove oleo, & lilijs componūt. Optimū esse cōstat in phœnice, mox ægypto factū. Sed cū primis laudat⁹ quod lilia redolet. Excalfacit. Emollit. Vuluæ p̄clusiones laxat, & collectiones aperit. Vtilissimum ad muliebria mala. Vlcera i capite manātia, feruidas eruptiones, varos, surfuresq; emēdat. Vibices cicatricesq; celerrime ad colorem reducit, ita vt sæpe fallāt. In summa extenuat. Potū bilem per aluū extrahit. Vrinā ciet. Sed stoma cho alienum est, & nauseam parit.

De Narcissini compositione.

CAP. LXII.

n Narcissini olei spissamēta ita fiūt. Sex libræ aspalathi cū sextāte tūduntur, olei eloti libræ septuaginta cum vncijs quinq;

assumuntur. Aspalathus aqua madefactus in tertia olei parte coquitur, quo exempto, calamus quinq; libris & besse, cum myrrhæ gleba cōtunditur, cribratusq; ac vino veteri odorato immistus decoquitur. simulac autem cum ijs efferbuerit, eximitur. Refrigeratum oleum excolatur, cuius portio in labellum mittitur. Flores narcissi q̄ plurimi cōiiciuntur, qui bidui spatio vt in susino dictū est, p̄moti exprimūtur. Oleū subinde decapulandū. siquidē celestissime putredinē sentit. Valet hoc ad emolliendas vuluæ duricias, præclusionesq; sed capitis dolores facit.

De Crocinī olei compositione. CAP. LXIII.

Vm crocinū cōponere voles, prius olei vt in susino dixim⁹;

c spissamentafacies eisdem ponderib⁹ & mensuris, cui⁹ olei libras treis & semissem, croci vnciā vnā assumēs, idētidē in die moueto, & sexta die quam hoc assiduo peregeris, oleū a croco collis incernito. Eidē croco parē olei modū adijcito. Moue triduo. Dein contusæ myrrhæ atq; cribratæ drachmas quadraginta p̄misceto, & in pila agitans recondito. Aliqui parē cyprini portionem oleo aromatibus ad crocinū imbuto adijciunt. Optimū est quod abunde crocum spirat, in medēdi vsu expetitum. Proximū quod myrrhā refert. Calfacit. Somnū allicit. Quare persæpe phreniticis subuenit, aut per fufum, aut naribus admotū, aut illitum. Pus mouet. Vlcera purgat. Cōtra vuluæ duricias atq; præclusiones, & vlcera q̄ cacæthæ vocant̄ p̄dest, cū croco, cera, medulla, duplicato olei pōdere. Cōcoquit em̄, emollit, humectat, & permulcet. Ad oculorū glaucitates ex aqua illinitur. Huic autem simile est butyrinū, onychinū & styracinū, quæ et si nominibus distant, viribus & cōpositione cognata sunt.

De Cyprini spissamēto & olei cōpositione. CAP. LXIIII.

Lei omphacini eloti pars vna, aquæ cœlestis dimidiū, cuius vna parte oleū diluitur, altera adijciēdis odoramētis amiscet. dein assumptis aspalathi libris quinq; & semisse, calami libris sex & semisse, myrrhæ libra vna, cardamomi libris tribus & dodrāte, olei libris nouē & vncijs quinq;. Aspalath⁹ tusus & aqua affusus decoquit̄ i oleo, donec efferuescat. Myrrha autē vino vetere odorifero subacta, contusulq; calamus digeruntur in offulas, quæ exēpto aspalatho immittuntur, & vbi efferbuerint, sublato ahæno, oleū percolatur. Cardamomum tusum reliqua aqua aspersum infunditur. spatha agitur, nulla dū refrixerit interpellatione. Post hæc colato oleo, in viginti octo libras olei, floris ligustri quod cyprū vocāt, sex & quadraginta libræ cū besse istillant̄, q̄ sufficiēter madefactæ p̄ sportulā expmūtur, quod si copiosi⁹ desideret, idē floz pōd⁹ iniectū fili mō p̄maet, et iterū aut tertio si qs velit madefacere, poterit, et ita reddet efficacior. Eligi oportet

DE MEDICINALI MATERIA

bonum, quod cum odoris suauitate nares feriat. Aliqui cinnamomū addūt. Calfacit, Emollit, Venarū spiracula laxat. Vuluæ neruorūq; vi-
tius conuenit, Pleuriticis, fractisq; per se vel carato immistum. Malag-
matis imponi solet, quæ opisthotonicis, angina laborantib; inflamma-
tioniq; inguinū oppitulantur. Item acopis.

De Irini spissamento

CAP. LXV.

Pathæ q̄minutissime contusæ sex libras cum besse, in tribus
f & septuaginta libris & quincunce olei, æreo vase, additis de-
cem aquæ heminis incoquito, quoad odorē acceperit, postea
in craterem melle oblitum colato, ex eo aromatibus imbuto oleo, iri-
num primo temperatur, macerata Iride vt scripsimus. Sed alia est cō-
ponendi ratio. In olei septuaginta libris & quincunce, xylobalsami vt
dictum est contusi, libras quinq; & sextantem excoquito, postea detra-
cto xylobalsamo nouem libras & dextantem adijcito, & myrrhæ gle-
bam vetere vino odorato perfusam, & in olei odoribus imbuti quat-
tuordecim libris tantumdem tusæ iridis, binis diebus ac noctibus ma-
defacito, strenue & vehemēter distrigito, quod si vis validi; fieri, par-
pondus iterum ac tertio maceratum exprimito. Longe optimum est
quod solā irin olet, quale est in perge, in pamphilia, & elide achaia
natum. Vim habet calfactoriam atq; emollientē. Crustas adimit. Sor-
dida vlcera et putrida purgat. Cōfert fæminis vuluæ affectionib; ob-
noxijs. Item inflammationibus eiusdem atq; præclusionibus. Partus
eijcit. Hæmorrhoidas laxat. Cōtra auriū sonit; ex aceto ruta & ama-
ris nucibus, prodest. Diuturnis destillationibus naribus illitū, & cō-
tra graueolentia earū vlcera, quas ozenas vocāt, auxiliatur. Aluū pur-
gat cyathus epotus. Facit ad ilei cruciatus. Vrinam mouet. Difficileis
vomitiones adiuvat, perunctis eo digitis & immisis, vel ijs quæ ad
vomitum ciendum induntur. Anginæ etiā illinitur, aut ex aqua mulsæ
gargarisatur. Item contra faucium scabritiā. Datur ijs qui cicutā, co-
riandrum, aut venena fun̄gorum hauserunt.

De Gleucini compositione.

CAP. LXVI.

Leucinum absolute constat omphacino, iunco, calamo, celti-
g ca nardo, spatha, aspalatho, fertula cāpana, costo, et musto, cir-
cundatis interim vinaceis vase, quod aromata vinum & oleū
cōceperat. Tricenis diebus, bis in die mouetur, postea expressum oleū
reconditur. Calfacit, emollit, cohibet. Rigoribus & neruorū vuluæq;
vitijs auxiliatur. omni acopo iuuantius, quippe quod emolliat.

De Amaracino.

CAP. LXVII.

Maracinū longe optimum in cyfico fieri solet ex omphaci-
a no & balanino, spissamentis e xylobalsamo, iunco odorato,

& calamo factis, a scitæ suauitate costi, amomi, nardi, casia, carpobalsami & myrrhæ odoribus. Aliqui, quo preciosius fiat, cinamomū addunt. Mel autem & vinum assumuntur, hoc in vasorū illitionem, illud ad cogēdas tusorū aromatum offas. Amaracinum calfacit. Soporē mouet. Venarū spiracula laxat. Emollit. Feruorem excitat. Vrinā cit. Putridis vlceribus ac fistulis perq̃ vtile, necnon humentibus hernijs, postq̃ medica manus operam suam impenderit. Crustas, & terra vlcera quæ theriomata vocant, rumpit. Difficili vrinæ illita sede, & eius inflammationibus auxiliatur. Hæmorrhoidas illitu soluit. Vuluæ subditū mēstruos cursus euocat. Duricias, ac vuluæ tumores, discutit. Vulneratis neruis lacertisq̃ confert, leniter astringētibus madefactum & impositum.

De Megalino.

CAP. LXVIII.

Astitabatur olim megalinum, sed nunc compositio exoleuit & prorsus oblitterata est. Cuius ad historiæ complementum meminisse non fuit alienum. Mistura cum amaracino eadē erat, sed resina exuperabat, excellebatq̃. Quare leuiter emolliebat. Resina vnguētis, neq̃ tutelæ neq̃ voluptatis gratia, adijciebatur, sed coloris crassamētisq̃ causa. Ea tātisper coquebatur, dum desineret olere. Cuius coquendæ ratio declarabitur, dum de resina differemus.

De Hedycroo.

CAP. LXIX.

Vod hedycroon vocant, in coo fieri solet, eisdem præditum q̃ viribus & misturis, quibus amaracinū, sed suauius spirat.

De Metopio.

CAP. LXX.

It in ægypto vnguētum, quod metopion patrio nomine appellatur propter galbani missionē. Nam lignum in quo galbanum enascitur, metopion vocant. Constat amaris nuciis, omphacino oleo, cardamomo, odorato iunco, calamo, melle, vino, myrrhā, balsami femine, galbano & resina. Probatum pingue, graui odore, quod magis cardamomum & myrrham q̃ galbanum respiciat. Calfacit vehementer, & adurit, atq̃ extrahit. Ora venarum aperit. Vlcera purgat. Ad præcisos neruos, & lacertos, ad hernias putri humore contractas, efficax est. Caratis & malagmatis inseritur. Rigoribus, conuulsisq̃, præsertim quibus ceruix in scapulas deiecta, & retrorsum contracta est, vtile habetur. Sudores cit. Vuluæ spiracula laxat, et eiusdem duricias discutit. In summa, molliendi naturā habet.

De Mendefio.

CAP. LXXI.

Endesium constat balanino oleo, myrrhā, casia, & resina. Alii qui tamen post singulorū pondera, cinamomi exigū addūt, nullo compendio. Nam quæ simul contrita non fuere, vim

DE MEDCINALI MATERIA

nullā exhibent. Similē metopio vim obtinet, sed inferiorem multo.
De stacte. CAP. LXXII.

Stacte vocatur pinguitudo recentis myrrhæ cum exigua aqua tusa, et organo expressa. Ea perq̃ odorata, ac p̃ciosa est. atq; vnguentum per se facit, stacte nominatū. Maxime probat, quæ nullā olei missionē admisit, cuius minima portio cōpos est viriū plurimarū. Vim myrrhæ calidis vnguētis correspōdētē habet.

Decinnamomino. CAP. LXXIII.

Innamominum e balanino oleo, & xylobalsami, calami, iunci odorati spissamētis, atq; cinnamomi, & seminis balsamini suauitate, quadruplaq; myrrhæ ad cinnamomū portione cōstat. Mel ad cogenda omnia adijcit. Laudatur acre, molli odore, plane myrrham redolēs, crassum, odoratum, gustu perq̃ amaro. Id nō a resina, sed myrrha crassitudine obtinuit. Resina enī neq; amaritudinem præbet, neq; vllam odoris gratiam adijcit. Vim habet admodum acre, amaram, & calfacientē. Itaq; ora venarū aperit. Calfacit, discutit, dissipat. Humores & spiritus attrahit. Caput aggrauat. Contra vuluæ vitia cum duplo oleo, cæra, & medulla efficax est. Ita enim fere acrimonia exolefcit, & quædam emolliendi vis contrahitur. Alioqui adurit, et præ cæteris vnguētis indurat. Facit mirū in modū ad fistulas & vlcera quæ putredinis viriū senserūt. Item ad hernias humidiores, carbūculos, febriū rigores, tremores, gangrænasq; cū cardamomo. Aduersus serpentium mōsus, illinitur. Scorpionū & phalangiorum ictibus cum tritis grossis imponitur.

Denardino vnguento. CAP. LXXIII.

Atio nardini faciundi euariat. Nam aut malabathrino folio, aut sine eo fit. Complurimum autem balanino oleo, aut omphacino, iuncus odoratus spissamenti gratia adijcitur, sicuti propter odoris suauitatē costus, amomū, nardum, myrrha, balsamū. Laudatur tenue, non acre, nardi aut amomi odorē referēs. Vis ei extenuās, acris. Expurgat. Excalfacit. Humorem extenuat. Hoc liquidum est, nec habet strigmenti crassitudinem, nisi resinam recipiat. Fit etiam simplex ex omphacino oleo, iunco, calamo, costo, & nardo.

De Malabathrinō. CAP. LXXV.

Alabathrinū spissamēta nardini habet. Insup myrrha addit, q̃ de causa calfacit, crocino, aut amaracino, virib' correspōdēs.

De Iasmino. CAP. LXXVI.

Pud persas fit, quod iasminum cognominatur, ex albis floribus violæ, quorum sextans, in italicū sextariū sesamini olei demittitur, violis vt in lilino diximus, vicissim permutatis.

Apud perfas inter epulādū vsurpatur odoris causa. Nā toti corpori cōuenit, præsertim cū in balneis descēdū est. Sed his opitulatur corporibus quæ calfactionē, laxationemq̃, desiderant. Grauius enim spirat, q̃ vt libenter a plerisq̃ recipiatur.

De Myrrha

CAP. LXXVII.

Myrrha lachryma est arboris, quæ in arabia gignitur, ægyptiæ spinæ non dissimilis. e cuius vulnere defluit lachryma in subiectas tegetes. Alia circum caudicem cōcrescit. Dicitur ex his aliqua pediasimos, præpinguis, quæ expressa statē emittitur. Alia gabirea, pinguiissima, læto & pigui solo nascens, ea copiosam sudat statē. Omnium prima est, quæ troglodytica appellatur, accepto cognomine ab tractu, in quo prouenit, splendens, subuiridis, ac mordens. Quietiam legitur tenuis quædam, quæ troglodyticæ secunda est, bdelij modo mollis, verum odore grauiuscula, apricis nascens. Alia caucalis cognominatur, scabra præter modū, nigra, & retorrida. Omnium deterrima, quæ ergasima dicitur, pingui carens, cano situ obducta, acris, ad gūmis imaginem vergens, & viribus eius proxima. Improbatur aminea cognomine. Ex ijs pastilli fiunt, sed e pinguibus pingues, & odorati, e sicciorebꝫ haud quāq̃ pingues, & inodorati. Minus viribus pollet, quæ oleum non admittit, cum in pastillos digerebatur. A dulteratur macerato gummi aqua, in qua myrrha maduerit. Eligenda est recens, squallore obfita, leuis, vndiq̃ concolor, quæ contra fracta internatos quasi vngues, cādidos & læues ostendat, minutis glebis, amara, acris, odorata, calfaciēs, Superuacua & inutilis est grauis, coloris picei. Calfacit, cohibet. Soporē gignit. Siccat. alitrigit. Vuluā emollit, & præclusam laxat. Menfes & partus celeriter extrahit, cum absinthio, lupinorū cremore, vel succo rutæ admota. Tuberculo fabæ deuoratur in vetere rufsi, orthopnoea, in laterum pectorisq̃ doloribus, in alui profluuiio, et dysenteria. Rigores discutit, duabus horis ante febriū accessiones, fabæ magnitudine pota cōm pipere & aqua. Subdita linguæ liquataq̃, scabriciem arteriæ expolit. Et densam vocē expedit. Vētris tineas enecat. Contra grauem oris halitum mādatur. Et aduersus alarum tædia cū liquido alumine illinitur. Gingiuas & dentes stabilit, colluto cum vino & oleo ore. Vulnere capitis illitu glutinat. Medetur fractis auribus, ac ossibus nudatis, peruncta cum cochleæ carnibus. Item purulentis auribus inflammatiq̃ cum meconio castorio & glaucio. Ad varos autem cum casia & melle illinitur. Impetigines ex aceto purgat. Defluentes capillos cum ladano & vino myrteo illita, firmat. Diurnas distillationes lenit, illitis pinna naribus. Oculorū vlcera complet. Albugines tollit. Caliginem discutit. Sca-

fig. 12
Hanc

supra p. 10

Remittit

DE MEDICINALI MATERIA

briciē læuigat. Fit e myrrha peride atq̃ thure fuligo, & vt postea ostēdemus, ad eadem conueniēs.

De Beotica myrrha CAP. LXXVIII.

b Eotica myrrha, dissecta radix est arboris cuiusdam in beotia nascētis. Melior est quæ myrrham odore representat. Vis ei calfa & toria inest. Emollit discutitq̃. Suffimētis commodissime inseritur.

De Styrace CAP. LXXIX.

f Tyrax lachryma est arboris malo cotoneæ similis. Præfertur sordescens, flauus, resinofus, albicantibus grumis, q̃ plurimum in sua odoris gratia permanens, qui dum mollietur, melleum liquorem reddit, qualis e castabala vrbe, pissidia, & ciliacia deuehitur. Deterior niger, surfurosus, canoq̃ situ obductus. Cæterum lachryma inuenitur gummiū similitudine, perlucida, & myrrhæ æmula. Verum per pauca manat. Adulteratur ligni scoebe quam vermiculi erodentes excusserunt, melle, & iridis crassamento. & quibusdam alijs. Alij cærā aut adipem odoribus imbutum, fragrantissimis solibus cum styrace subigunt, et per laxa cribri foramina in frigida aqua vermiculos exprimūt, venūdantq̃. Styracen hunc, quoniam in vermiculorum speciem contrahatur, scoleciten cognominant, quē tanq̃ syncærum imperiti approbant, non animaduertentes ad præcipuam odoris fragrantiam. Siquidem acer admodum est, qui adulterationis vitio caret. Styrax calfacit, emollit, et concoquit. Medetur tussis, destillationibus, raucedini, grauedini, et retusæ voci. Vuluæ præclusæ duriciæue laboranti conuenit. Cit mēses potu appositusq̃. Alium leuiter molliit, si exiguum cum resina terebinthina bibatur. Miscetur vtiliter discutientibus malagmatis, acopisq̃. Adoletur autem & igni torretur, vt fiat ex eo veluti ex thure fuligo, ad eadē conueniens ad quæ thuris fuligo. Ex eo etiam in syria styracinum oleum cōponitur, quod calfacit vehemēter, & emollit. Verum caput dolore afficit, adgrauatq̃, et soporem adfert.

De Bdelio. CAP. LXXX.

b Delium alij Bolchon appellāt, alij madelcon. Lachryma est saracenicæ arboris. Probatur gustu amarū, trās lucidum taurini glutinis in morem, intus pingue, liquescens facile, ligni ac fordīs expers, suffitu oderatum, vngui simile. Est etiamnum bdelij genus sordidum, nigrum, in offas conuolutum, aspalathi odore, ex india aduectum. Desertur etiam a petra oppido siccum, resinofum, liuescens, sed facultate secundum. Adulteratur gummi. sed ita vitiatum nō perinde gustui amaritudinem representat, nec vsq̃ adeo suffitionibus

odoratū. Calfacit et emollit. Duricias, et turgētia guttura, humidāsq; hernias discutit cū ieiuna saliuā impositum. Vuluā spiracula laxat ap-
posito et suffitu. Et partus humiditatesq; omneis extrahit. Calculos
potu comminuit. Vrinā mouet. Tussientibus, a serpente percussis,
vtilissime datur. Valet ad rupta, vulsā, intentas laterum membranas,
et discursantes spiritus. Malagmatis inseritur, quæ contra duricias et
neruorum nodos profunt. Contusum resoluitur affuso vino aut aqua
calida.

De Thure

CAP. LXXXI.

Hus in ea gignitur arabia, quæ thurifera cognominatur. Pri-
matum tenet in eo genere masculum, stagonias appellatum,
suapte natura rotundū. Tale autem indiuidū est, candidū,
cū frāgitur intus pigue, in suffitu statim ardēs. Indicū vero fuluescit,
et colore liuet. Sed rotundum industria fāctitant. Nam in quadrangu-
lares formas dissectum dolijs versant, donec rotunditatē cōtrahat. Ve-
rum huiusmodi thus tēpore flauescit, quod atomum aut syagrum ap-
pellant. Secundum locum habet arabicum, et in smylo nascens, quod
aliqui copiscum vocant, minus multo et fuluius. Est et genus aliud cui
amymira cognomen est, alioqui candidum, quod dum mollietur masti-
ches more digitis cedit. Adulteratur pini resina & gummi, quod faci-
le deprāhendi potest. si quidem suffitum gummi flammam non eiaca-
latur, & resina in fumū euanescit. Thus vero statim ardet. Idem male-
ficiū odor prodit. Ad calfaciendum & āstringendum pollet. Ocu-
lorum caliginem discutit. Caua vlcera complet. Et ad cicatricem per-
ducit. Cruēta vulnera glutinat. Infrēnatq; sanguinis eruptiones, etiam
si cerebri membranīs effluat. Vlcerā quæ cacoethe vocantur & sedis
et reliquarum partium permulcet, tritum cum eo & laetelinae mentum.
Formicantes verrucas inter initia, impetiginēsq; ex aceto & pice illi-
tum tollit. Ambusta igni, perñionesq; cū suillo adipe aut anserino, &
vlcerā in capite manātia cum nitro, si infricetur sanat. Paronychijs cū
melle, auribz fractis cum pice, medetur. Ad reliquos aurium dolores
cum dulci vino infunditur. Imflāmata a partu māmæ cum cimolia &
rosaceo magna vtilitate perunguntur. Additur ad arteriæ viscerumq;
medicamenta. Prodest sanguinis excreationi potum. Sed in secūda va-
letudine haustum insaniam monet, & largius cum vino potum interfi-
cit. In fīctili mundo thus crematur flagrante glebula succēsum a lu-
cerna, donec exuratur. post perfectam vīlionem operire oportet, vsq;
dum restinguatur, sic enim in cineres redigitur. Aliqui ollulam æneo
vase cauo circa medium perforato cigunt ad excipiendam fulliginem,
vt in eius mentione mox ostendemus. Alij crudo fīctili luto oblito, &
in furnum indito, cremāt. Fīctili etiam nouo viuacibus prunis torre-

DE MEDICINALI MATERIA

tur, dum non amplius bullet, aut vaporem emittat, facile enim commi-
nuitur quod perustum non est.

De Cortice thuris.

CAP. LXXXII.

p Ræfertur thuris cortex crassus, pinguis, odoratus, recens,
læuis, minime scaber, sine membranis. Adulteratur admisto
pini aut nucis eius cortice, sed horum index ignis est. Siqui-
dē reliqui cortices suffiti nequaquam incenduntur, sed sine odore fumum
eruant. Thuris vero cortex ardet, & cum odoris fragrantia vaporem
eiaculat. Thuris modo vritur. Et vis eadēquæ thuri, sed validior astri-
gentiorq;. Quare cruentis excreationibus, vuluis fluctuone laboranti-
bus, in pello confert. Ad caua oculorum vlcera, cicatrices, sordesq; ef-
ficax est. Tostus scabris lippitudinibus auxiliatur.

De Manna thuris.

CAP. LXXXIII.

m Anna thuris probatur candore, micarum frequentia, & puri-
tate. Vim habet eandem quam et thus, sed inualidiusculam.
Sunt qui cribrata pini refina, ac polline, aut cortice thuris
contusi adulterant. sed hæc igne depræhenduntur. Neq; enim eque
suffitu aerium vaporem sed fuliginosum & impurum expuit. & permittit
suaveolentiæ odoris virus habet.

De Fuligine thuris.

CAP. LXXXIII.

f Vliginem thuris sic facito. Forcipicula, lucernis accēsas sin-
gulatim thuris glebas, in nouā fistilē ollā concauā imposito.
& æreo vase in medio perforato, deterfa diligēter sorde, obte-
gito. Aliā admoueto, in altero aut utroq; labro, subiectis quaternū di-
gitorū altitudine lapillis, quo facilius perspicui queat, si vratur. Et qua
locus capax fuerit, glebularum alias supponito. & antea quā prorsus pri-
or gleba restinguatur, aliam imposito. donec sufficientem fuliginem
videaris aggregasse. Continuo tamē externæ æramenti partes spōgia
aqua frigida madefacta, abstergatur. Ita enim temperato æris feruore,
fuligo omnis inhærebit. Quæ alioqui per leuitatē decidua, thuris cine-
ribus admiscetur. Dersa itaq; fuligine, cinis cremati thuris seorsum
substrahendus est. Idem opus quoad satiffa & tibi videbitur, obeun-
dum. Oculorum inflammationes mitigat, Fluctiones suspendit. Vlce-
ra purgat. Caua explet. Carcinomata fistit.

De Fuliginis compositione.

CAP. LXXXV.

f Imili modo e myrrha, refina, styrace, reliquisq; lachrymis,
fuligo excipitur, ad eadem conueniens.

De Pinu & picea.

CAP. LXXXVI.

p Inus & picea generi eidem ascribuntur, sed quandam flagi-
tant specierum distinctionem. Arbores vulgo cognitæ.
Quarum cortex astringit. Prodest tritus & illitus intertri-

gini, vlceribus summū corpus occupantibus, ambusisq; cum spuma argenti & māna. Vlcerā delicatulorum acrimoniā recusantium cærato myrtino exceptus ad cicatricem perducit. Tritus cum sutorio atramento serpentia cohibet. Suffitu partus et secundas eicit. Potus aluum sistit. Vrinā mouet. Folia eorum trita & illita inflammationes leniunt. Vulnē ab inflammatione vindicant. Trita autem & decocta in aceto, feruenti collutione, dentium dolores mulcent. Hepaticis vtilia sunt, drachmæ pondere in aqua aut mulsā pota. Pineæ nucleus cortex & folia potu eadem præstant. Teda particulatim secta si in aceto coquatur, et decocto dens colluatur, dolores leuat. Ex his etiam fit spatha acoporū pessorumq; cōpositionibus idonea. Quinetiam earum crematarum fuligo ad librarij atramenti confectiōem excipitur. Ea circumlitionib⁹ efficacissime imponitur, quib⁹ palpebras ornāt, coloremq; mentiuntur, calliblephara græci vocāt. Arrosis oculorum angulis, callosis glabrisq; genis, & collachrymationibus opitulatur. Pityides appellantur pinorum piceæq; fructus, qui in conis inueniuntur. Vim astrictoriam habent, et aliq̃tū exalfaciētem. Tussi & pectoris vitij auxiliatur, per se, aut ex melle sumpti.

De Pineis nucibus

CAP. LXXXVII.

Vces pineæ cum repurgatæ māduntur, aut cū passo aut cucumeris semine bibuntur, vrinā ciēt. Acrimonias in renibus aut vesica hebetant. Stomachi rosiones leniunt, datæ cum portulacæ succo. Virium infirmitatem roborant. Corruptorū quoq; humorum labē obtūdunt. Pineæ nuces recenter arboribus decerpæ in passo franguntur, & decoctæ, vetustæ tussi ac tabitudinī conferunt, si quotidie ex eo liquore terni cyathi bibantur.

De Lentisco.

CAP. LXXXVIII.

Entiscus nota arbor est, cui vis inest astrigēdi. Semini enim, folio, ramo, cortici, radicibusq; cognatæ insunt vires. Lique-
 1 mentum autē ita fieri solet. Folia cortex & radix in aqua coquuntur, et vbi abūde cocta sūt, folia abijciuntur. Aqua denuo coquitur, donec mellis habeat crassitudinē. Lentiscus sua astrigēdi dote, valet aduersus sanguinis reiectiones, alui profluvia, & dysenterias in potu. Item contra eruptionem sanguinis e vulua & eiusdem aut sedis proci-
 dentia. In totum acaciæ & hypocyssidis vicem repræsentat. Idem facit succus e tritis folijs. Decoctum fori caua explet. Et fracta ossa ferrumina-
 nat. Vuluæ fluxiones sistit. Nomas arcet. Vrinā pellit. Motus den-
 tium collutione stabilit. Virētes furculi calamulorum vice dentibus repurgādis affricātur. Fit e semine oleum, quod prodest cum quid astrigē opus est.

DE MEDICINALI MATERIA

De Refina lentiscina.

CAP. LXXXIX.

1 Entiscus refinam gignit, quæ lentiscina cognominatur, et ab aliquibus mastiche. Pota utilis est sanguinem reiicientibus, & tussi veteri. Stomacho auxiliatur, sed ructum mouet. Ad datur in dentifricia & illitiones faciei ad nitorem cutis conciliandum. Palpebras oculis incommodas replicat. Manducata halitum oris commendat. Gingiuas contrahit. Optima & copiosissima in insula chio prouenit. Præfertur nitedulæ modo resplendescens, & cādore tyrrenicæ cæræ similis, adulta, friabilis, odorata, stridorem edens. Viridis autem inferior est. A dulteratur thuris, refinæq; mistura.

De Terebintho.

CAP. XC.

1 Erebinthus cognita arbor est, cuius folia et semen & cortex astringunt, & ad eadē ad quæ lentiscus conueniunt, simili parata modo sumptaq;. Fructus esui aptus est, sed stomacho aduersatur. Excalfacit. Vrinā mouet. Venerē excitat. Cōtra phalangiorū morsus conuenienter in vino bibitur. Refina eius ex petra arabiaē opido defertur. Prouenit etiam in Iudæa, syria, cypro, aphrica & cicladibus insulis. Sed præualeat candida, perlucida, vitreo colore & in cæruleum vergēte, odorata, terebinthū olens. Terebinthina refinās omneis antecedit, proxima lentiscina, & e pinu et abiete. Has sequitur e picea et pineis nucibus refina. Naturā omnibus calfacere, mollire, discutere, expurgare. Tussi ac tabi conueniunt per se, aut in eclegmate ex melle. Vitia pectoris expurgant. Vrinam cient. Cruda concoquunt. Ventre emolliunt. Palpebras commodissime replicant. Lepras tollunt, cum erugine ac sutorio atramento, nitroq;. Auribus saniem emanantibus, item in pruritu genitalium vtilis. Malagmatis, acopisq; ammiscentur. Laterum doloribus illitu aut appositu auxilio sunt.

De liquida refina e pinu & picea. CAP. XCI.

1 iquida refina e pinu & picea, a Gallia et hetruria conuehifollet atq; oli a Colophone petebat, hinc Colophonie sibi cognometū vēdicauit. A galatia quoq; alpihus cōtermina, quā vernaculo nomine laticē appellant incolæ. Ea i linctu magnopere prodest tussi veteri. Colore inter se distant. Siquidem alia candida est, alia oleosa, alia mellei liquoris similitudine, vt larigna. Cupressus etiam liquidam fundit refinā, quæ ad eadem pollet. Quæ vero spissarū generi ascribuntur, quædam ex pineis nucibus, aliæ abiete, aliæ picea & pinu exierunt. Eligi debet longe omnium odoratissima, translucēs non ruffa, nec humida, quandam cæræ faciem præbens, et friabilis. E picea et abiete refinæ, cæteras antecedunt, odoratæ enim sunt, atq; thus odore imitantur. Præstantiores a pytiusa insula deferuntur, quæ secundum hispaniā sita est. Sed quæ e picea, nucibus pineis & cupress

so manarunt, nihil ad illas, nec tantis viribus potiuntur. Verumtamen eorundem gratia vt illæ sumi solent, Lentiscina terebinthinæ correspondet. Vritur resina omnis liquida in vase quadruplæ capacitatis ad humorem, qui infunditur. Itaq; resinæ congius, in duobus aquæ pluuiæ coquitur, subiectis leuibus prunis, resina assidue mouetur, donec omnis odor aboleatur, & friabilis et stridula reddatur, ac digitis cedat. Cæterum vbi refrigit, in fistile non picatum, quod aconitum vocant, id est non illitum, reconditur. Fiet etiam eximij candoris, si resina omnis eliquata præcoletur, quo sæculenta sordes excernatur. Vritur quoq; sine aqua, primum lento igne, & vbi coire cæperunt, maior carbonum strues supponitur, & triduo citra intermissionem discoquantur, vsq; dum suum odoris virus exuerint. Mox vt dictum est reponuntur. Spissam vnus diei spacio decoxisse satis est. Vtq; odoratis malagmatibus, & acopis & vnguentorum colorationibus magnopere vtilis sunt. Et resina perinde atq; thure fuligo excipitur, ad circumlitiones idonea, quibus palpebras fucant, & colorem mētiuntur. Prodest glabris genis, collachrymationibus, erosiq; oculorum angulis. Ex ea fit atramentum scriptorium.

De Piceliquida.

CAP. XCII.

Pix liquida quam alij conum vocant, e pinguisimis pini picæq; lignis congregatur. Optima est splendens, syncera, lauis. Contra venena, phthisin, purulentam excreationem, tussese, suspiria, & pectoris humores qui difficile extussuntur, efficax est, eclegmate cyathi mensura cum melle dato. Tonfillarum & vuæ inflammationes, anginaq; vtiliter perunguntur. Purulentis auribus infunditur cum rosaceo. Et illinitur cum trito sale serpentium moribus. Adiecta vero pari cæra scabros vngues extricat. Tubercula vuluæ, et duricias sedis, discutit. Cum farinaq; hordeacea et pueri impubis vrina decocta, strumās rumpit. Cohibet vlcera quæ serpunt, cū pineo cortice, aut sulphure, aut fursuribus illita. Cæterū cum thuris manna & carato subductos vlcerū sinus conglutinat. Rimis sedis & pedū, magno auxilio illinitur. Vlcerā replet, & cū melle purgat. Quin & cū vna passa & melle carbūculos, & putrida vlcerā emar

DE MEDICINALI MATERIA

ginat. Erodentibus medicamentis quas septas vocant, probe immiscetur.

De Picino oleo. CAP. XCIII.

Pice fit quod pissellæon appellant, separato liquore aquoso
c qui supernatat pici, sicut serum lacti. Nam expansa quamdiu
pix coquitur supra cortinam vellera madescunt, acceptoque ha-
litueius exprimuntur in vas. Quas pix liquida præbet utilitates. Alo-
pecias capillo replet cum farina hordeacea illitum, quibus & liquida
pix medetur. Iumentorum ulcera scabiemque emendat.

De Fuligineliquida picis. CAP. XCIII.

It hoc modo e liquida pice fuligo. In lucerna noua quæ elly-
f chnium habeat, nonnihil picis incendito, lucernamque fistili
vase in clibani speciem conformato, superius in angustum
fornicato, inferius perforato ut clibani esse solent, operito, & adoleri
finito, consumptoque liquore nouum infundito, quo ad sufficientem
vsui fuliginem collegeris. Vis ei adstringens, acrisque. V sui est ad pig-
menta quibus palpebras linunt & venustant, & ad circunlitiones, ite-
vbi glabris genis pilos restitui oportet, ad imbecilles lachrymososque
oculos. Insuper ad eorundem ulcera non inutilis est.

De Sicca pice. CAP. XCV.

Iliquida pix decocta in spissam coit, quam vocant aliqui pa-
l limpissam, quo in genere quædam visci modo lentescit, bo-
scas cognominata. Altera sicca est. Probatur pura, pinguis,
odorata, subruffa, resinosa. Calfactoriam vim habet. Dura emollit.
Pus mouet. Tubercula panosque discutit. Ulcera replet. Vulnereiis
medicaminibus commode permiscetur.

De zopissa. CAP. XCVI.

Opissam aliqui aiunt derasam nauibus refinam cum cera,
z quam alij apochyma appellant. Ea dissipandi naturam ha-
bet, quoniam marino sale macerata fit. Alij pincam refinam
hoc nomine vocauerunt.

De Bitumine. CAP. XCVII.

Itumen iudaicū cæteris antepōnitur. Cuius probatio est vt
 b purpuræ modo splēdeat, sitq; graue, ac validū odorē vibret.
 Nigrum autē et sordidum, vitiosum est. Adulteratur pice.
 Gignitur i fenice, babylone, zacintho, et sydone. Liquidū iuenitur in
 Agragrantino siciliæ, fontibus innatans, quo vtuntur ad lucernarū
 lumina olei vice. Hallucinātur qui id sicilicum oleū nominant. Nāq;
 Liquidū bituminis genus esse constat.

De Pissasphalto. CAP. XCVIII.

Afcitur in apolloniatarū agro circa epidamnum quæ pissas-
 n phaltos appellatur. Ea ceraunijs montibus deuoluta, impe-
 tu fluminis rapitur, æstuq; in littus expuitur, illic coacta in
 glebas. Mistam bitumini picem redolet.

De Naphtha. CAP. XCIX.

Aphtham vocant babylonij, bituminis colamen, colore cādī
 n dum. Inuenitur etiā nigrum. Vis ei ignium rapax, ita vt ex
 spacio protinus in eam transfiliat. Ad suffusiones oculorum,
 et albugines utilis. Bitumen omne discutit, glutinat, emollit. Ab inflā-
 matione tuetur. Vuluarum procidētia, strangulationesq; olfactu, suffitu
 impositu, emendat. Comitiales morbos suffitum depræhēdit, gagatis
 lapidis more. Purgationes mulierum cum vino et castorio potum eli-
 cit. Tussim veterē et anhelitū adiuuat. Serpentiū moribus, coxendicū
 laterūq; doloribus, auxiliatur. Datur celiacis in catapotio deuorādū.
 Cum aceto potum discutit sanguinem concretum. Dysentericis cum
 ptisana liquatum infunditur. Distillationibus suffitione medetur. Mi-
 rigar dentium dolores oblitum. Cæterū pilos in commodos siccum re-
 plicat, specillo impositum. Concalfactum autem et cum farina horde-
 acea nitro et cera illitū, podagris, articulorū doloribus, lethargicisq;
 prodest. Pissasphaltos eadē quæ pix et bitumen si misceatur potest.

De Cupresso. CAP. C.

Vpressus refrigerat et astringit. Cuius folia ex passo et exigua
 c myrrha vesicæ rheumatismis, et vrinæ difficultati auxiliā-
 tur. Pilulæ autem ex vino tusæ in dysenteria, alui fluxione,
 tussi, et orthopnœa, aut si reijciatur sanguis, conuenientissime bibun-
 tur. Earum decoctum eisdem præbet effectus. Tusa cum fico durici-
 as emolliūt. Nariūq; polypo medetur. In aceto coctæ & cū lupinis de-
 trita scabros vngues eiiciunt. Hernias intestinorum prolapsu erūpē-
 tes illitu reprimūt. Folia eadē præstāt. Pilulæcū arboris coma suffita,
 culices abigere existimātur. Folia trita & iposita vulnera cōglutinant;
 Sanguinē suppressūt. Capillū ex aceto tingūt. Illinūtur per se aut cū

DE MEDICINALI MATERIA

polēta ignibus sacris, vlceribus quæ serpūt, carbūculis, & oculorū inflammationibus. Admota cum carato stomachum corroborant.

De Iunipero parua. CAP. CI.

Vniperum paruam græci arceuthida, aliqui Mnesitheum, alij acatalidem, ægyptij Libium, Galli iupicellum, Romani iuniperum vocant. Eius duo genera. Altera maior, altera minor. Vtraque acris est. Excalfacit, & vrinam mouet. Accensa serpentes fugat. Baccarum nonnullæ nucis iuglandis magnitudine nonni³, quam grandescere, aliæ nucem ponticā æquare inueniuntur, rotundæ, odoratæ, in mandendo dulces, subamare, quæ archeutidis etiam non me³ id est iuniperi retinuerunt. Modice calfaciūt & astringunt, stomacho viles. Contra pectoris vitia, tussim, inflationes, tormina & serpentium ictus efficacissime bibuntur. Vrinam cient. Vnde ruptis, conuulsis, & vuluæ strangulatui subueniunt. Folia acrimoniam habent. Ideo tam ipsa quàm eorum succum ex vino contra viperarum morsus ilini, aut bibi prodest. Corticis cinis cum aqua illitus lepras eximit. Ramenta ligni deuorata interficiunt.

De Iunipero magna, CAP. CII.

Vniperus magna, quam aliqui syluestrem cupressum appellant, alij Mnesitheum, alij Acateram, Romani Iuniperum, vulgo cognita est, cupresso assimilis. Asperis maritimisque locis plerumque nascitur, easdem quas supradicta vires habens.

De Hærbæ Sabina. CAP. CIII.

Ræcis brathy, alijs baryton, alijs baron, romanis hærbæ sabina appellatur. Duorum generum est. Vna folijs cupresso similis, spinis horridior, grauiter olens, acris & feruens. Arbor est coactæ breuitatis, quæ sese magis in latitudinem fundit. Huius folijs nonnulli pro suffitu vtuntur. Altera tamaricæ folio similis est. Vtriusque folia nomas fistunt. Collectiones illitu mitigant. Et cum melle nigricias sordesque repurgant. Carbunculos cum vino pota³ rumpūt. Sanquinem per vrinā eliciunt. Partus apposita extrahunt. Et suffitu idem præstant. Vnguentis calfacientibus immiscetur & priuatim gleucino.

De Cedro. CAP. CIIII.

Edrus arbor magna est, ex qua picē colligunt, quæ cedria vocatur. Iuniperi modo baccas parit, baccarum myrti magnitudine, rotundas.

De Cedria. CAP. CV.

Edria optima est crassa, perlucida, validi odoris. quæ dum effunditur, guttatim non dissipata coit. Cui ea vis inest vt de sancta corpora conseruet, et viuientia corrumpat. Quæ ex cau

sa mortuorum vitam aliqui appellauere. Vestimenta quoque & pelles, eximia calfaciendi et siccandi dote, corrumpit. Magni ad ocularia medicamenta vsus. Quippe illita oculis claritatem affert. Albugines cicatricesque detergit. Instillata autem cum aceto, vermes auriū necat. Cū hyssopi decocto ifusa, sonitus sibilosque sedat. Causis dētiū idita eos frangit, & dolores leuat. Quapropter cū aceto colluere eosdem prodest. Peruncto ante coitū genitali abortiuum fieri constat. Anginae ea terunguntur. Tonfillarū inflammationibus auxilio est. Lendes pediculaeque illitu enecat. Cerastrae moribus cū sale imposita subuenit. Cōtra hausta leporis marini venena, in passio sumpta auxiliatur. In elephātia aut liuctu, aut perunctione proficit. Pulmonū vlcera purgat, & si cyathus eius sorbeatur, per sanat. Tineas & cætera vētris animalia necat. Infusa partus extrahit. Fit et oleū, a cedria separatum dum coquitur, velleribus supra halitum eius expassis, vt in pice. Eiusdē ad omnia vsus. Priuatim vehemēter perunctum scabiem quadrupedum, canum, boumque per sanat. Inhærentes ricinos enecat. Vlcerā quæ ex tonsura accēperunt, ad cicatrices perducit.

De Cedride. CAP. CVI.

Edrides cedri fructus vocātur. Calfactoriā vim habent. Stomacho aduersantur. Auxilio sunt tussi, cōuulsis, ruptis, straguriæ. Menses ciunt, ex polline piperis poti. Contra haustū leporem marinū in vino sumuntur. Serpentes fugantur, peruncto ex adipe ceruino, aut medulla, corpore. In antidota addūtur. Fuliginem quomodo ex pice, congeri oportet, quæ eandē quā picea fuligo vim præbet.

De Lauro. CAP. CVII.

Aurus quædam tenui folio cōstat. Altera latiore. Vtraque ex calfactoriam naturā habet & emollientē. Vnde decoctū earū in muliebres infessus additū, vuluæ & vesicæ vitij conuenit. Virentia folia sensim substringunt. Illita quoque vesparū apiumque idibus opituluntur. Eadē cū polenta aut pane illita inflammationem omnē mitigant. Sed pota stomachū effundunt, et vomitiones mouēt.

De Baccis lauri. CAP. CVIII.

Auri baccæ magis quā folia calfaciunt. Ergo in eclegmate cum melle vel passio profunt tabi, orthopnoeæ, & omnibus thoracis rheumatismis. Contra scorpionū idus ex vino bibūtur. Vitiligiues emaculant. Succus baccarum vtilissime aurium dolori et grauitati instillatur, cū vino vetere et rosaceo. In medicamēta autem adijciūtur quæ neruorū lassitudines reficiūt, acopa vocant, et ad vnguenta quæ calfaciunt et discutiunt. Cortex radice calculos rumpit.

DE MEDICINALI MATERIA

Partus necat. Hepaticis prodest, tribus obolis in vino odorato potus

De Platano.

CAP. CIX.

Enerrima platani folia in vino decocta, mox illita, oculorum fluxiones sistunt. Tumores & inflammationes leuant. Decoctus cortex in aceto, dentes in dolore colluit. Virides pilulae in vino potae, serpentium moribus auxiliantur. Exceptae autem adipe igni ambusta sanant. Incidens foliorum pilularumque lanugo, oculos & aures defendit.

De Fraxino.

CAP. CX.

Raxinus arbor nota est, cuius folia cum succo peruncta, aut ex vino pota, viperarum ictibus auxiliantur. Corticis cinis ex aqua illitus lepras eximit. Ramenta scobemque potu, perniciem afferre traduntur.

De populo alba. ^{populus alba} CAP. CXI.

Otus albae populi cortex vnciae vnus pondere, ischiadicis ac vrinæ stillicidio prodest. Abortiuum fieri tradunt, si cum mulino rene bibatur. Folia quoque cum vino post purgationes pota, idem prestare produntur. Tepens foliorum succus vtiliter aurium dolori instillatur. Pilulae quae primo foliorum partu exiliunt, illitae cum melle, oculorum hebetudini medentur. Memoriae prodiderunt corticem albae populi particulatim caesum, & fulcis stercoreatis mandarum, omni tempore anni edules fungos proferre.

De Macere.

CAP. CXII.

Acer ex barbaria aduehitur, cortex flauescens, crassus, gustu perque astringens, qui contra cruentas excreationes, dysenterias, & alui fluxiones bibitur.

De Vlmo

CAP. CXIII.

Lmi & folia & cortex & rami, vim habent spissandi. Folia trieta ex aceto ad lepras efficaciter illinuntur. Vulnera glutinant, sed multo magis corticis tilia, si fasciae loco intorquetur. Nalori more flecti potest. Crassior cortex in vino aut aqua vnciatim potus, pituitas trahit. Fracta ossa celerius solidescunt, si decocto foliorum corticis aut radicis foueantur. Humor in folliculis enascens prima germinis eruptione, cuti illitus nitorem inducit, faciemque splendidiorē praestat, qui dum ficcatur, in animalia abit, quae culicum formam gerunt. Folia cum tenerescunt, holerum more ad obsonia vsurpantur.

De Lignorum marcere.

CAP. CXIII.

Incidens caudicibus lignisque veteribus caries congeritur, quae farinae modo illita, vlcera purgat, & ad cicatricem perducit. Serpentina cohibet, si cum pari aniso & vino subacta.

linterisq; imposita, illinatur.

De Populo nigra.

CAP. CXV.

P Opuli nigra folia cum aceto illita, magna vtilitate podagricis doloribus illinuntur. Resinam populus fundit, quæ in malagmata additur. Semen potum ex aceto comitialibus vtile est. Lachrymam commemorant, quæ i padum amnem defluat, durari ac coire in succinum, quod electrum vocant, alij chrysothoron. Id attritu iucundum odorem spirat, & aurum colore imitatur. Tritum, potumq; stomachi ventrisq; fluxiones sistit.

De Harundine.

CAP. CXVI.

I N harundinum genere quædam nastos vocatur, ex qua sagittæ factitari solent. Alia femina qua tibiærum ligulas efficiunt. Alia quod fistulis addita fit, Syringias, cui multum inest caninis, crebris cinctis geniculis, ad librorum conscriptionem accommodata. Alia crassa, coccinea, apud amnes nascens, quæ a quibusdam cypria, ab alijs donax appellatur. Alia phragmites seu vallatoria, gracilis, candidans, vulgo cognita. cuius trita radix per se, aut cum bulbis suis illita, spicula aculeosq; corpore extrahit. Luxata, lumborumq; dolores, cum aceto mulcet. Virentia folia tusa & imposita ignibus sacris medentur, & cæteris inflammationibus. Corticis cinere perunctæ cum aceto alopecie sanantur. Panicula lanugo si aures intrauerit, exsurdar. Eundem effectum implet harundo quæ cypria dicitur.

De Papyro.

CAP. CXVII.

P Apyrus qua chartæ sunt, nullis non cognita, præcipue in medicina vtilitatis ad laxandas fistulas. Madefacta lino inuoluitur usq; dum inaruerit. Constricta enim atq; immissa in hiatus humore completur, et intumescendo fistulas aperit. Habet nescio quid alimenti radix. Itaq; ægyptij eam mandunt, succum tantum deuorantes, & mansam expuunt. Iphis radicibus pro ligno vtuntur. Crematæ papyricinis depascentia vlcera cum omnium partium, tum oris maxime, cohibent. Verum melius id combusta charta præstat.

De Myrica.

CAP. CXVIII.

M yrica seu tamarix arbor vulgo cognita est, cum apud pigras & stagnantes aquas nascatur, fructum quasi florē ferens copiose mucosum. Aegyptus syriaq; alterā gignunt mitiorem, syluestri cætera similem. Fructus parit gallæ proximū, inæqualiter asperum gustu, quo convenienter vtimur vice gallæ in medicaminibus oculorum orisq;. Datur cruentæ excreationi in potu, & celiacis, & contra profluua feminarum, regium morbum, et phalangiorum morsus;

DE MEDICINALI MATERIA

Illitus tumores inhibet. Cortex in eisdem vsus adhibetur. Decoctum foliorum cum vino potum, lienem absumit. Ad dolorem dentium in collutionibus salutare, & mulieribus fluxioni vulvæ oportunis, in defessionibus. Phthiriasis lendibusq; circumfusum prodest. Abundantiam fœminarum sistit impositus arboris cinis. Potorios calices e caudice lienosis moliantur, quo datus in his potus proficiat.

De Erica.

CAP. CXIX.

e Rica fruticosa arbor myricæ similis, longe minor, cuius flores apes reprobum mel efficiunt. Tam flos quam coma serpentium ictibus illitu medetur.

De Acacalide.

CAP. CXX.

a Cacalis fructus est nascētis in ægypto fruticis, seminis myricæ quadā tenus similis, cuius aqua in qua maduerit ad collyria additur, quæ ad excitandā oculorū aciem conueniūt.

De Rhamno.

CAP. CXXI.

r Hamnum alij persephonion vocant, alij leucacantham, Romani spinā albam, aut cerualem, Aphri atadim. Rhamnus fruticat, in sepibus ramos ferens rectos & aculeos in acutæ spinæ modum, folijs paruis, oblongis, suppinguibus, teneris. Alterū ei genus candidius. Tertium nigrioribus latoribusq; folijs constat, et quadam tenus rubentibus. cuius rami quinum cubitorum longitudinem implent, infirmioribus horrentes spinis, innocentioribusq; Fructum ædit latum, candidum, tenuem veluti folliculum, hastulæ regię similem. Omnium folia igni sacro, & serpentibus vlceribus, efficaciter illinuntur. Fama est ramos huius valuis fenestrisve impositos, veneficia depellere.

De Halimo.

CAP. CXXII.

h Alimum alij damafonium vocant, alij Erymon, alij Brettaniam, alij Rhabdion, alij Basilion, magi Mercurij basim, aut Osiridis diadema, alij Elystephanon aut sacrum caulem, pythagoras Anthenoros, ægyptij asontiri, alij asphen, alij ascaluri, alij asariphen, Latini Albutium aut Ampeluciam. Halimus frutex est sepimētis idoneus, similis rhamno, sine spinis, folijs oleæ, sed latoribus. Nascitur in sepibus & maritimis. Folia decoquuntur citratorum gratia. Radix conuulsa, rupta, torminaq; mitigat, dragmæ pondere in aqua mulla pota. Eadem lactis vbertatem facit.

De Paliuro.

CAP. CXXIII.

n Aliurus frutex cognoscitur aculeatus, durus, cuius semen pingue et fuliginosum inuenitur. Quod potum tussi opitulatur. Vesicæ calculos cōminuit. Serpentium ictibus aduer-

LIBER PRIMVS

satur. Folia & radix astringentiam vim habent. Quorum decoctum potu alium sistit. Vrinam trahit. Contra venena & serpentium morsus auxiliatur. Radix recetia tubercula, tumoresque omnes discutit, tria & imposita.

De Acuta spina.

CAP. CXXIII.

a Cuta spina, quam pyrinā aut pityanthen aliqui vocāt, arbor est pyraastro similis, spinosa, et minor. Baccas profert myrti, plenas, rubras, fragiles, & intus nucleū, radicē multifidā, alte descendente. Huius baccā potu aut cibo, alui profluuium, & abundantia foeminarum sistit. Radix illita aculeos & spicula extrahit. Arborum fieri tradunt, si ter radice veter, aut sensim feriat, aut perungatur.

De Rubo canis

CAP. CXXV.

f Rutex est arboris instar, rubo longe maior. Folia fert multo latiora myrto, firmis circa ramos spinis, flore candido, fructu oblongo, nucleo oliuæ simili, qui per maturitatem fuluescit, et floculos intus continet. Fructus exemptis interioribus flocis arefactus, aluum sistit. Feruefacti enim in vino, mox poti, arteriam infestant.

De Ligustro

CAP. CXXVI.

l ligustrum arbor est oliuæ folijs circum ramos, latioribus, mollioribus, et virentioribus. Flore candido, muscoso, odorato, semine sabuci, nigro. Optimum nascitur in Canopæ et ascalone. Folia astringentiam vim habent. Quare commanducata vlcerebus oris medentur. Illita feruidis inflammationibus, carbunculisque profunt. Decocto eorundem igni ambusta fouentur. Capillum ruffant tria folia, que in radiculae succo maduerint. Flos ex aceto fronti illitus capitis dolore sedat. Cyprinum oleum quod ex eo fit, excalfacit, emollitque nervos, quoniam mista quæ feruenti natura prædita sunt, assumat.

De Tilia

CAP. CXXVII.

t Tilia arbor est ligustri magnitudine, folijs oleæ, nigrioribus et latioribus. Fructu lætisci, nigro, subdulci, racematim coherentem. Asperis nascitur. Huius folia astringunt, ad eadem visalia ad quæ oleaster, cum astringentia est opus, maxime ad infantium vlcera in ore, commanducata, aut si decocto colluantur. Pota vrinam accenses cient.

De cisto

CAP. CXXVIII.

c istus quem aliqui citharon, aut cissaron vocant, ramosus fruticulus est, sed improcerus, foliosus, saxosis locis nascens. Folijs rotundis, acerbis, hirsutis. Flos masculo ut mali punice, foeminae albet. Vis astringens, unde flores in vino austero bis in die po-

DE MEDICINALI MATERIA

ti, profunt dyfentericis. Et nomas illiti cohibent. Vetustati vicerum, et igni mabustis cum cerato medentur.

De Hypocistide. CAP. CXXIX.

Hypocistis Roberthron, aut cytinus a nonnullis cognominatus, iuxta cisti radices nascitur, floris punici similitudine. Quædam flaua. Altera virens. Tertia candida. Liquatur acaciæ modo. Aliqui tamen exiccant, fractamq; macerant, et iocoquunt, reliqua; vt in lycio prosequuntur. Vires acaciæ habet. Verum ali- quâto magis ficit, et astringit. Prodest dyfentericis, cœliacis, sangui- nem excreantibus. Fœminarum profluuiio et pora et indita.

De Ladano. CAP. CXXX.

St et alterum cisti genus, ledon a nonnullis appellatū, frutex simili modo nascens, longioribus folijs et nigrioribus. quæ verno tempore quiddam contrahunt pingue. Foliorum vis astringens, atq; effectus cisti præbens. Fit ex eo quod ladanum dicitur. Siquidem cum cisti frondes pascuntur capræ hirciq; pinguitudinem conspicue barba carpunt, et suo lentore vilosis crinibus adhærescen- tem reportant, quam depeſcentes incolæ, colantesq; cogunt in ossas, et ita recondunt. Alij vero attrahis funiculis, insidentem fruticibus lentorem abstergunt, conglomerantq; in ladanum. Maxime proba- tur odoratum, subuiride, facile mollescens, pingue, quod arenas non collegit, nec squallore obſitum est, resinofum, quale in cypro gignitur. Arabicum vero lybicumq; vilius. Natura ei spissandi, calfaciendi, mol- liendi. Laxat ora venarum. Capillum fluentem continet, addito vino myrrha aut myrteo oleo. Cicatricibus decorem reddit cum vino illitum. Medetur aurium doloribus cum hydromelite aut rosaceo infu- ſum. Suffitu secundas eiicit. Pessis immiſtum, vuluæ duriciæ sanat. In medicamenta quæ dolorem tuſſimq; finiunt & malagmata vtiliter in- ſeritur. Aluum fistit cum vino vetere potum. Et vrinam ciet.

De Hebeno. CAP. CXXXI.

Ebenus optima habetur æthiopica & nigra, nullis habes ve- narū discursus, ſactitij cornus læuitate. Cū frāgitur denſa appā- ret, mordēs gustu, atq; astringēs. Suffitur iucūdo odore ſupra carbonēs ſine ſumi tædio. Recens putē ad ignē prolata ob pinguitudi- nem accenditur, & trita ad cotem flauescit. Altera est Indica interna- tis ſegmentis candicantibus, & modice fuluis, item frequentibus ma- culis. Cæterum prior, bonitate antecedit. Apud quosdā ſesamina, aut ſpinea ligna, hebeni vice veneūt, quod diſcernitur ex eo, quod fungosa ſunt, et in purpureas aſſulas reſoluuntur, nichil mordacitatis in gustu nec redolentiæ in ſuffitu præferentia. Caliginem oculorum abſterget;

Ad veteres distillationes, pustulasq; mirū in modū pollet. Si quispiā facta ex eo coticula collyrijs vtatur, meli^o proficiet. Ad oculorū medicamenta efficax est, si scobes ramentave vino chio die noctuq; macerata, in collyria digerantur. Nonnulli prætrita ramenta excolant, reliquaq; eundem in modum peragunt. Alij pro vino aqua vtuntur. Vritur in fistili nouo donec in carbones redigatur. Lauatur plumbi modo, & ita siccis lippitudinibus conducit.

De Rosa. CAP. CXXXII.

Osa refrigerat & astringit, sed sicca multo magis. Succus recentibus folijs exprimitur, desectis forfice vnguibus, sic apellantur candidæ foliorū partes. Reliquū in pila premi & teri debet in vmbra, donec cogatur, & ita ad oculorū circūlitiones recodi. Siccantur etiam nū folia rosarum, continuo versata, ne muceāt, neve situs in ijs infideat. Aridis rosis & in vino decoctis expressus liquor, facit ad dolores capitis, auriū, oculorum, gingiuarū, sedis, recti intestini, ac vuluæ, pina illitus aut infusus. Eadē sine expressione tusa, præcordiorum inflammationibus, humidis stomachi vitijs, igni sacro illini prodest. Siccis ac tritis fœmina asperguntur. Misceri solent vlnarijs antidotis atq; compositionibus quas antheras vocant. Folia vruntur in calliblephara. Flos qui in medijs rosis inuenitur, siccatus, gingiuarum fluctionibus efficaciter inspergitur. Capita pota citam aluum, et cruentas reiectiones sistunt.

De Roseis pastillis. CAP. CXXXIII.

Astilli quos rodides vocant, hac ratione conficiuntur. Rosarum viridium, quæ nullo antea humore madefactæ exaruerint, drachmæ triginta, indicæ nardi drachmæ decem, myrrhæ drachmæ sex, tritæ digeruntur in pastillos, qui trium obolorū pondus æquēt. Siccatiq; in vmbra, in fistili non picato, atq; obturato recoduntur. Alij adijciunt costi drachmas duas, iridis illyricæ totidem, & vinum ethium cum melle miscent. Mulieribus monilium loco vsui sunt, ad retundendum graue sudoris virus. Tritis etiam vtuntur ad ilitiones & diapasmata quæ fiunt ad sudores coercendos, ita vt a balneis inarescant corpora, dein frigida aqua abluantur.

De Lycio. CAP. CXXXIIII.

ycium quod aliqui pyxacanthan vocant, arbor est spinosa, ramis trium cubitorum, aut longioribus, folijs buxi, densis, fructu piperis, nigro, læui, amaro, densoq; cortice pallido, nō dissimili lycio madefacto, radicibus multis, obliquis, lignosis. nascitur plurimum in Capadocia, Lycia, & plerisq; alijs locis. Aspera loca amat. Coquuntur rami cum radiculis tusi & ante per aliquot dies mace-

DE MEDICINALI MATERIA

rati, tum abiectis lignis denuo liquor coquitur, donec mellis crassitu-
 do fiat. Adulteratur id lyciū adiecta decoctioni amurca, aut absinthij
 succo, aut felle bubulo. Innatans spuma inter coquendum exempta, ocula-
 lorum medicamentis additur. Reliquo ad alia vtuntur. Simili modo
 fit lycium, semine expresso & insolato. Optimum quod vri potest, re-
 stitutumque rubentem spumam ostendit, glebis extrinsecus nigris, intus
 cum fregeris ruffis, ingustabile, cum amaritudine astringens, crocino
 colore, cuiusmodi Indicum est, cæteris præstātius. Lyciū astrigit. Cæ-
 liginem oculorum discutit. Genarum scabiem, pruritus, veteresque flu-
 siones sanat, Facit ad purulentas aureis, exulceratas gingiuas, tonsil-
 las, labiorum fissuras, sedis rimas, attritusque illitum. Cæliacis, dysen-
 tericis, potum inditumque cōuenit. Datur sanguinem excreantibus, & tussi
 ex aqua. Contra rabiosi canis morsus in catapotio deuoratur, aut in
 aqua bibitur. Flauos facit pilos. Paronychij, vlceribus quæ serpunt
 aut putrēt, medetur. Fœminarum profluvia appositum sistit. Rabio-
 forum ictibus ex melle potum, aut vice catapotij deuoratum, auxilia-
 tur. Tradūt Indicum fieri lycium, ex frutice lonchitide appellato. Ea
 spinarū generi ascribitur, ramos rectos habēs, ternū cubitorū lōgitu-
 dine, maioresve, rubo crassiores, a radice numerosos. Fructus cortex ru-
 bescit. Folia oleæ similia. Harba in aceto decocta proditur lienis in-
 flāmationibus et regio morbo mederi. Et fœminarū purgationes eli-
 cere. Asseuerant etiam crudam in potu, eisdem effectus præstare. Se-
 men cyatho dimidio potum, pituitam expurgare. Venenis quoque au-
 xilio esse.

De Acacia.

CAP. CXXXV.

2 Cacia in ægypto nascitur instar arboris, frutice spinoso,
 non se in rectum attollente. Florem habet candidum, & se-
 men lupino simile in folliculis, ex quo succus expressus sic-
 catur in vmbra, niger ex maturo semine, subruffus ex viridi. Eliga-
 tur modice ruffus & odoratus. Aliqui folia cum semine exprimunt.
 Manat & gummi ex ea spina. Vis ei ad spissandum, refrigerandumque
 efficax. Succus oculorum medicamentis vtilis. Valet ad ignem sacrū,
 vlcera quæ serpunt, perniones, pterygia, & oris vlcera. Procidentes
 oculos reprimat. Menstrum abundantiam sistit. Prociduam vuluam co-
 hibet. Citam aluum suppressit aut potus aut inditus. Capillos deni-
 grat. Lauatur oculorum medicamentis, trito in aqua, mox effuso quod
 concreuerat, donec pura extet aqua. Et ita cogitur in pastillos. Vritur
 etiam in fictili nouo fornacibus, torreturque in carbonum halitu perfla-
 ta. Spinæ decoctum solutos artus fotu committit. Præfertur eius spi-
 næ gummi, quod in vermiculorum speciem contrahatur, & vitri mo-

do perluceat, ligni expers. Proximum est candidum. Sordidum vero ac resinofum inutile. Cutis meatus obstruit. Et medicamentorum quibus ammiscetur, acrimoniam hebetat. Ambustis ex ouo illitum pustulas non patitur erumpere.

De Acacia altera. CAP. CXXXVI.

Alterum acaciæ genus in capadocia pontoque provenit, ægyptiæ spinæ similitudine, longe minor, tenerior, humilis. Aculeorum vallo munitur, folia habens rutæ. Semen lenticula minus fert autumnis, in loculis ternū quaternumque seminū capacibus. Succus eius astringit, viribus inferior, & ocularibus medicamentis inutilis.

De Amurca CAP. CXXXVII.

Murca expressæ oliuæ recrementum est. Decocta in cupreo vase ad crassitudinē mellis astringit, cæteros præbēs lycij effusus. Insuper dentiū dolori, & vulneribus, cum aceto, vino aut mulso, cōmode illinitur. Additur in medicamenta ocularia, et meatus obstruentia. Vtustate meliorem fieri constat. Vtiliter infunditur sedis, genitaliū, et vuluæ exulcerationi. Si vero cum omphacio recoquatur ad mellis crassitudinē, cariosos dentes extrahit. Iumentorum scabiem cum decocto lupini et chameleonte illita sanat. Cruda et recenti amurca podagras articularesque dolores foueri vtilissimum. Peruncta in violosa pelle et hydropicis imposita, tumoris mollem reprimat.

De Vitice. CAP. CXXXVIII.

Gnon aliqui agnon, alij lygon vocant, alij Amictomia non, alij tridactylon, magi semnon, alij hæma ideos. Ægyptij sum. Romani salicem marinam, alij piper agreste, alij lecrisiticum. Vitex seu castus frutex est in arborem assurgens. Nascitur in fluminum ripis, asperisque locis, ac torrentium alueis. Ramos gerit prælongos, fractu peruiacces, folia oliuæ, sed molliora. Duo genera eius. Vna harum album florem mittit cum purpureo, altera tantum purpureum, & semen ut piper. Excalfactorias vires habet & astringitorias. Semen eius potum venenatis idibus, aquæ quæ cutem subiit, lienosisque auxiliatur. Lac euocat. Menses ciēt, drachmæ pondere in vino potum. Genituram exoluit. Caput tentat, & soporem affert. Decoctum hærbe & seminis in defensione, mulieribus vuluæ malo oportunitis opitulatur. Item inflammationibus. Purgationes mouet semen cum pulegio potum, etiam suffitu vel appositu. Capitis dolorem dissoluit illitum. Instillatur cum aceto & oleo capiti in letargo & phrenitide. Folia suffitu aut substratū fugant venenata. Illita quoque serpentium moribus auxiliatur. Testium duricias cum butyro et folijs

*Agnes rusticus
vol. 5 de singl.*

substratum

DE MEDICINALI MATERIA

vitium emolliūt. Rimas sedis semen cum aqua illitum mitigat, et cum folijs medetur luxatis, vulneribusq;. Virgam qui manu teneat dū iter facit, negatur intertriginem sentire. Agnum quasi dicas purum vocāt Græci, quoniam matronæ in thesmophorijs atheniensium castitatem custodientes, folijs cubitus sibi sternunt. & lygon quasi vimen, propter inuictam fere ramorum flexilitatem.

De Salice. CAP. CXXXIX.

He. Alix vulgo nota est, cuius semē, folia, cortex, & succus spissā di vim habent. Trita folia cum exiguo pipere et vino pota, ileosis subueniunt. Sumpta cum aqua præstant mulieribus ne concipiant. Salignum semen in potu sanguinē expuentibus prodest. Cortex eosdem præbet effectus. Corticis cinis admisto aceto illitus, clauos et callos tollit. Ex folijs et cortice succus cū rosaceo in calice punici calfactus, aurium doloribus auxiliatur. Decocto eorum podagras foueri vtilissimum. Furfures purgat in corpore. Excipitur succus qui manat ex ea, cum floret exciso cortice. In plaga enim concretus humor inuenitur, qui ad purganda quæ obstant oculis, suam vim præbet.

De Syluestri olea. CAP. CLX.

Syluestris olea, quam aliqui oleastrum appellant, alij æthiopicam oliuam, folia astringunt. Trita autem & imposita ignem sacrum, vlcera quæ serpunt, epinyctidas, carbunculos, paronychia, nomasq; cohibent. Crustas emarginant cū melle illita. Quin etiam sordida repurgant. Inflammationes panosq;, cum melle imposita discutiant. Cutem a capite vulsam conglutinant. Oris vlceribus com manducata medentur. Succus et decoctum eosdem habent effectus. Sanguinis eruptiones, ac muliebri profluuium, admotus succus inhibet. Vux oculorum pustulisq; prodest. Vlcers & veteres defluationes fistit. Quapropter in collirijs additur, ad genarum erosiones perq; vtilis. Exprimitur succus tuis folijs, affuso vino ex aqua, siccatusq; sole in pastillos digeritur. Sed longe validior ad recondendum succus habetur, qui cum vino q̄ cum aqua expressus est. Auribus subuenit, siue vlcerentur, siue pus effluat. Folia conuenienter celiacis cum farina hordeacea illinuntur. Vruntur enim floribus folia, vt spodij viscem cinis præstet. In cruda olla oblito ore luto, vsq; dum figlinū percoquatur, restinctaq; vino & rursus subacta, eodē modo vruntur. Postremo cerusæ modo elota coguntur in pastillos. Huiusmodi cinerem in medicamentis oculorum constat spodio non cedere. Sed eisdē viribus præditum esse putandum est. Foliorum satiuæ olea eadem vis intelligitur, sed aliquanto inferior. Vnde ocularibus medicamē

tis ob suam mitiorem vim conuenientior est. Sudor ligno virenti ac-
cēso manans, illitu sanat lichenas, furfures, et scabiem, Oleaginum se-
men illitum medetur furfuribus, et vlceribus quæ depascunt vorantq̃.
Quod autem intra nucleum est ex adipe & farina scabros vngues ex-
cutit.

De Colymbadibus oliuis CAP. CXLI.

Olymbades trita & ambustis illita, pustulas gigni prohi-
bēt. Sordida vlcera purgant. Muria succus collutas gingi-
uas contrahit. Et motus dentium firmat. Oliua flaua & recēs
stomacho vttilior est. Vētri difficilis. Nigra autem & matura, corru-
ptioni oportuna est. Stomacho aduersatur. Oculis non conuenit. Ca-
pitis dolorem mouet. A refecta illitu depascentia vlcera fistit. Et car-
bunculos emarginat.

De Oleo syluestris oliuæ CAP. CXLII.

Leum syluestris oliuæ humidis gingiuarū vitijs colluitur.
Dentiū mobilitates stabilir. Calfa & i fatus, gingiuis fluctio-
ne laborantibus vttilis est. Lanā enim specillo circūligatam
oleo madefacere oportet, et gīgiuis admouere, donec albæ spectētur.

De Lachryma æthiopica olea. CAP. CXLIII.

Achryma quam æthiopica olea stillat, scamoniæ similis est,
fulua, stillis exilibus constans, mordax. Quæ autē ammoni-
aci, aut gummi similitudinem refert, colore nigricans, nec
gustu mordens, superuacua est. Nostrates olea, oleastriq̃ similem la-
chrymam sudāt, quæ cōmode ad oculorū hebetudines illinitur. Cica-
trices albuginesq̃ illitu emendat. Vrinā et menses ciet. Causis dentiū
ipressa, ad dolores efficax est. Inter venena scribitur. Partus pellit. Le-
pras et ipetigines sanat. Appellatur autē æthiopica et agrestis olea.

De quercu CAP. CXLIII.

Værcus omnis adstrictoriā vim habet, præsertim liber qui
cortici & ligno intercedit. Quinetiā tunica putamini glādis
subiecta Decoctum ex ijs datur dysentericis, cœliacis, sangui-
nem excreantibus. Trita in pello, fœminis fluctione vuluæ laboran-
tibus subiicitur.

De Glande. CAP. CXLV.

Landes eodē effectus exhibent. Vrinā ciunt. Capitis do-
lorem & flatus in cibum sumptæ pariunt. Resistant eitate
venenatorum iſtibus. Decoctum corticis cum lacte vacci-
no potum prodest contra toxica. Intritæ crudæ, inflammationes illitu
leniunt. Ad duricias quas cacoethæ vocant, & malefica vlcera cum sal-
sa æxungia conueniunt. Ilignæ glandes viribus quærnas præstant.

DE MEDICINALI MATERIA

De Fago & ilice. CAP. CXLVI.

f Agus & ilex quærcus generi assignantur, & confimile munus obeunt. Ilignæ radici cortex cum aqua coctus dum eliquescat & tota nocte illitus, denigrat capillos, prius cimoſa terra purgatos. Folia omnium tufa & trita tumoribus profunt. Et imbecillas membrorum partes corroborant.

De Caſtaneis. CAP. CXLVII.

f Ardianæ glâdes quas aliqui caſtaneas, aut lopima, aut glandes Iouis appellât, adstringunt, ſimileſq; effectus præbent. Præfertur tunica quæ carnem & corticem media intercuroſat. Caro his qui ephemerum biberunt conueniens eſt.

De Galla CAP. CXLVIII.

g Alla fructus eſt quærcus. Aliqua omphacitis appellât, parua quidê ſed toroſa, ſolida, nullo foramine peruia. Altera plana leuis, perforata. Eligi debet omphacitis, quæ efficacior eſt. Vtriuſq; vis vehemêter adſtringere. Trita excreſcētia in carne, ſuſtiones gingiuarû & vuæ, atq; oris vlcerationem cohibent. Nucleus, dentium caruēnis inditus dolorem ſedat. Crematæ carbonibus donec igne ſagrent & vino aut aceto aut acida muria extinctæ, ſanguinem ſupprimunt. Decoctum quibus inſidere expedit efficacior eſt. Et contra vuluas procidentē, ſuſtioneſq; Capillos denigrant aceto aut aqua maceratæ. Dyſentericis cœliacisq; cum vino aut aqua trita couenienter illinuntur, aut bibuntur. Obſonijs addi debent, aut integræ in aqua præcoqui, in qua nonnihil excoquendum eſt, quod iſtis conſecrat. In ſumma his vtendum ad adſtringenda quæ opus ſunt.

De Rhoe. CAP. CXLIX.

r Huſ quæ obſonijs aſpergitur, ab aliquibus erythros appellata, ſemen eſt coriarij fruticis. Ita vocari ſolet, quoniam coriorum inſectores ea vtantur ad inſpiſſandas pelles. Arboreſcula in petris naſcens, binum cubitorum altitudine, folijs oblongis, rubicantibus, in ambitu ſerratis, acino vuarum graciliū, denſo, magnitudine terebinthi, quadâtenus lato. Cuius corticoſa tunica perq; utilis eſt. Folia vim habent adſtringēdi & acaciæ effectus præbent. Decoctum capillos denigrat. Dyſentericis inſunditur, et in potus eorum inſeſſuſq; adiicitur. Inſtilatur auribus purulentis. Gangrænas et pterygia cohibent folia ex aceto aut melle illita. Liquamentum ſit ex aridis folijs, ad craſſitudinē mellis in aqua decoctis, ad eadem vt lyciū coueniens. Semen eoſdē effectus exhibet. Cœliacorum, dyſentericorumq; obſonijs inſpergitur. Fraſta deſquāmata, liuidaq; illitū ex aqua ab inflammatione vindicat. Linguae aſperitates cum melle abſtergit.

Candida foëminarū profluuiā sistit. Hæmorrhoidas sanat, cū quærno carbone intrito admortū. Latex in quo semen maduit decoctus, cogitur coitq; efficacior ipso semine. Gummi defert quod dentium cauis imprimitur, ad dolores finiendos.

De Palma.

CAP.

CL.

Alma in ægypto gignitur. Ea medio autumnī vigore decerpī solet, arabici myrobalani similis, pomatis cognomine, colore viridi, & odore mali cotonei. quod si ematurescens sole percoquatur, phœnicobalanus fiet. Palma acerba est et adstringēs. Cōtra alui foëminarūq; profluuiā, in vino austero bibitur. Hæmorrhoidas sistit. Vulnera glutinat illitu. Phœnicobalani plus siccis adstringunt. Capitis dolorē afferunt. Copiosiores in cibo inebriāt. Sicciores sanguinē excreantibus, stomachicis, & dysentericis viles in cibo. Illi nuntur cū cotoneo et cærato cœnanthino vesicæ vitij. Carioræ præsertim faucium asperitati esu medentur.

De Thebaicis palmis.

CAP.

CLI.

Hebaicarū decoctū potu æstuationē sedat. Vires recreat cum hydromelite veteri sumptū. Cibo idē faciunt. Fit ex eis vinū ad eadē conueniens. Decoctū potu & gargarisatione magnos pereadstringit, & cohibet. Nuclei palmarum cæterorū more cremati in crudo fistili, & vino resincti cinere loti, spodij vicē efficiunt. Mīscunturq; in calliblephara. Quod si non iustam vñionē acceperint, de nouo cremandi. Vim adstringendi habent, & spiracula cutis obstruunt. Contra oculorum vnam, & pustulas, palpebrarum defluuiā, cum nardo effectum præbent. Corporis excrecentias reprimunt. Vlcera ad cicatricem perducunt. Sed inter primas viles ex palmis humilibus ægyptiæ.

De Palma Elate.

CAP.

CLII.

Alma, quam aliqui elaten aut spatham appellāt, fructus palmarum adhuc florentium, tegumentum est calyxq; quo in spissamenta vnguentarij vtuntur. Optima habetur odorata, adstringēs, grauis, præclusa, intus pinguis. Vis ei adstringētia. Sistit vlcera quæ depascunt. Laxatos artus committit. Trita miscetur cataplasmatibus & malagmatis. Prodest præcordijs, imbecilli stomacho, & iocineri affecto, mista cōferentibus cataplasmatibus. Eius decoctum subinde deterfum, capillos denigrat. Datur bibēdum congrue, renum vesicæ & viscerum vitij. Vulux ac ventris fluxiones sistit. Scabiem cum resina & cæra sanat, si viginti diebus recens apponatur. Fructus quem suo amplexu fouet, Elate etiam vocari solet, & ab aliquibus Boassus. Adstringit & spathæ effectus præstat, non sic vnguentis expectatus. Alba medula caudicis recens in cibo, aut decocta eadem facit.

DE MEDICINALI MATERIA

De Malo punico.

CAP.

CLIII.

m Alū punicū omne boni succi est, stomacho vtile, nullū sufficiens alimentū. Dulcia stomacho vtiora habentur. Sed aliā quantulū in eo calorem gignūt. Inflationes pariunt. Vnde in febri abdicantur. Acida adstringūt. Aestuanti stomacho auxiliantur. Et multo magis cōtrahūt, ac vrinā ciēt. Ora gingiuasq; lædūt. Vinosā vero mediā fortiūtur naturā. Nuclei acinorū acidi punici i sole fīcati, & obsonijs insparfi, concoctiue, fluentē aluū stomachūq; fīstunt. Cœlesti aqua madescūt, bibūturq; cōmodē sanguinē excreātibus. Ad defessus dysentericorū, fœminarūq; fluctione vuluæ laborantiū vtilēs sunt. Expressus nuclei succus coquitur cū melle ad oris, virilitatis, & sedis vlcera, nomas, reduuias, & ea quæ in corpore extuberant, aurīū dolores, & narium vitia, præsertim acidi.

De Cytino id est flore punici.

CAP.

CLIIII.

h Vius flores cytini vocātur, qui adstringūt, siccāt, cohibēt. Sāguinolēta glutināt. Quas punicū præstāt vtilitates. Humida giguarū vitia mobilesq; dētes decocto colluūtur. Herniā prolapsu intestini erūpētē cataplasmate repellūt. Memorix tradūt qui tres q̄minimos cytinos deuorauerit, nullā eo āno lippitudinē passurū. Eliquat hypocythidis exēplo.

De Malicorio. CAP. CLV.

m Alicoriū asperū est mali punici putamē, quod aliqui fidion appellant. Id spissandi vim habet, & quos cytini, præbet vsus. Decoctū radice potu latas vētris tineas pellit. Et easdē

euocat.

De Balaustio.

CAP.

CLVI.

b Alaustiū syluestris punici flos est cytino similis. Cui⁹ cōplura genera reperiūtur, cādidū, fuluū, rosaceū. Liquamētū ex eo fit hypocythidis modo. Cui adstrictoria vis inest, eadē faciēs quæ hypocythidis & cytinus.

De Myrto. CAP. CLVII.

m yrtus satiuā nigra vtior est medicinæ q̄ candida. Sed hac multo magis mōtana. Semen tamē imbecillijs parit. Vis & myrti & seminis adstringit. Semē viride aut aridū in cibo datur sanguinē excreantibus, & vesicæ erosionibus. Succus virentibus baccis expressus eosdē effectus exhibet. Stomacho vtilis. Vrinam cit. Prodest cōtra phalāgij morsū, & icorpionis idus in mero. Seminis decoctū capillū tigit. Ius decocti in vine vlcera in extremitatibus sanat. Oculorū inflammationes illitū cū polline polētā lenit. Cōtra ægilotas illinitur. Crapulā arcet præsumptū vinū, quod feruescēdo semine exprimat, alias enī acorē cōtraheret. Præstat vinū seminis effectus. Vtile procidētiæ vuluarū in defessionibus, sedis vitijs, & fœminis fluctione vuluæ laborantibus. Purgat fures, vlcera capitis manantia, atq; eruptiones popularum. Fluentes capillos continet. Additur

quoq; in medicamēto quod liparas vocāt, vti oleū quod ex folijs eius factū est. Decoctū foliorū ad defeffiones balnearū conuenit. Et contra laxatos artus, & male solidescētes. Eo fracta ferruminationi repugnātia vtilissime fouētur. Vitiliginē emēdat. Purulentis auribus infunditur. Et capillos denigrat. Succus eadē efficit. Trita folia & ex aqua illita humidis vlceribus, & mēbris omnibus fluxione laborātibus, cœliacisq; profunt. Et admisto omphacino oleo aut exiguo rosaceo cum vino ad vlcera serpētia, ignē sacrū, testiū inflāmationes, epinyctidas, & cōdylomata. Arētium foliorum farina vtiliter inspargitur paronychijs, pterygijs, & cōtra alarū fœminūq; perfusiones. Cardiacorū sudores cohibet. Folia cruda seu cremata cū cærato, ambustis, paronychijs, pterygijsq; medentur. Exprimitur folijs succus aduso vetere vino aut aqua cœlesti, cuius recētis vsus est. Nā exiccatus plane carīē sentit, & vires amittit.

De Myrtidano. CAP. CLVIII.

Myrtidanū dicī ē incrementū inæquabile, verrucosum & cōcosm lor. Quod perinde quasi manus myrti caudicē amplectitur.

Magis q̄ myrtus adstringit. Tusum addito austero vino reponitur, coactūq; in pastillos ficcāt in vmbra, multo efficacius & folio & semine, cærato, pessis, in seffionibus, cataplasmaris admistū, vbi adstringēdū aliquid est.

De Cerasijs. CAP. CLIX.

Erasia vētri vtilia sunt, si viridia fumanē. Eadē ficcata aluū fiunt. Gūmi quod cerasi refudarūt, cū vino diluto tussi vetustate medet. Colore cōmēdat. Visū exacuit. Appetētiā iuitat.

Idē ex vino potū calculosis auxilio est. De Siliquis CA. CLX.

Iliquæ recentes stomacho aduersantur. Aluū soluunt. Eadē ficcatae sistunt. Stomachoq; vtiliores sunt. Vrinam ciunt, sed præcipue quæ vinaceis condiuntur.

De Malo. CAP. CLXI.

Olia flores & germina cū omnis mali, tū maxime cotoneæ adstringūt. Pomis acerbis adstringendi vis ineſt. Maturis vero longe secus. Ex ijs verna bilem gignūt. Neruos lædūt.

Inflationes pariūt. De Cotoneo malo. CAP. CLXII.

Otoneas stomacho vtilia. Vrinam cient. Verum tosta accommodatiora habentur. Proſunt cœliacis, dysentericis, purulentis extuffientibus, cholericis, præsertim crudā. Macerato-

rum liquor, cōmode in stomachi aut vētris fluxionibus, potui datur. Succus crudorum assumptus orthopnoicis salutaris est. Decocto fouentur vuluæ & sedes si procidant. Cotonea quæ melle condiuntur, vrinam mouēt. Mel autem sibi constringentem illā vim & inspissantem adſciscit. Quæ cū melle coquūtur stomacho atq; ori gratiora sunt.

DE MEDICINALI MATERIA

sed minus inspissant. Cruda cataplasmatibus adiunguntur, ad cohibendam aluum, aut si stomachus aestuet, aut in vomitiones effundatur, ad mamarum inflammationes, praeduros lienes, & condylomata. Fit vinum ex ipsis tuis expressisq. Sed quo perduret, quidecim sextarijs succi vnus mellis adiungitur, alioquin in acorem degenerat. Prodest ad omnia quae dicta sunt. Fit & oleum ex ijs quod melinum vocauimus, quo vtimur quoties adstringenti oleo est opus. Eligi oportet vera, rotunda, parua, & odorata. Quae vero struthia dicuntur magna quidem sunt, sed minus vtilia. Flos & viridis & ficcus cataplasmatibus imponitur, ijs conueniens quae adstrictionem desiderant. Inflammationibus oculorum, reiectionibusq. sanguinis, contra citam aluum, & mensum impetus, in vino bibitur.

De Malis dulcibus. CAP. CLXIII.

m Elimela ventri molliuit & animalia expellit. Stomacho negotium exhibet. Aestuosa. Ea a multis dulcia mala vocantur.

De Orbiculatis malis. CAP. CLXIII.

e Pirotica mala quae latine orbiculata dicuntur, stomacho vtilia. Sistunt aluum. Urinas euocant. Malis tamen cotoneis inuolidiora.

De Syluestribus malis. CAP. CLXV.

f Syluestria mala similia sunt vernis, & adstringunt. Sane in hunc usum immatura opus sunt.

De Perficis malis. CAP. CLXVI.

p Erfica poma matura tam stomacho quam ventri vtilia sunt. Acerba aluum cohibent, sed sicca vehementius. Decoctum e ficcis alui stomachiq. fluxiones sistit.

De Praecocibus. CAP. CLXVII.

a Rmeniaca quae a latinis praecocia dicuntur, minora sunt superpradictis, & stomacho vtiliora.

De Medico malo seu citreo. CAP. CLXVIII.

m Edica mala aut cedromela quae latini citrea vocant, nemini non cognita. Arbor ipsa omnibus anni temporibus pomifera, alijs deciduis, alijs subnascetibus. Malum oblongum est, rugosum, colore aurum imitans, cum grauitate odoratum. Semen habet pyri. Id in vino potum venenis resistit. Aluum mouet. Oris suauitatem commendat, decocto eius colluto, aut succo. Estur in malacia mulieribus. Vestitijs impositum ab erosionis vitio vestes vindicare existimatur.

De Pyro. CAP. CLXIX.

p pyrorum multa genera, quae tamen omnia adstringunt. Adduntur conuenienter in repellentia cataplasmata. Decoctum e ficcis & cruda ipsa aluum sistunt. Ieiunos esitata laedunt.

De Pyraſtro. CAP. CLXX.

a Chras pyraſtri genus eſt, quod tardiſſime matureſcit. Vim pyro adſtringentiorẽ habet. Et ad eadem conuenit. Stringunt etiam eius folia. Ligni pyrorum cinis efficaciter his auxiliatur, quos fungi ſtrangulant. Aiunt fungos ſi ſylueſtria pyra cū eis coquantur, innoxios fieri.

De Meſpilis. CAP. CLXXI.

m Eſpilus quæ a nonnullis Aronia vocatur, ſpinofa arbor eſt, folio acutæ ſpinæ. Fert pomū ſuaue, exiguū, tribus itus offi- culis. Qua ex cauſa id nonnulli tricoccon appellauere. Tara de matureſcit. Eſu adſtringit. Stomacho gratū eſt. Aluūq; ſupprimi-
t.

De Setanijs. CAP. CLXXII.

a Lterum meſpili genus in Italia naſcitur, quod aliqui Seta- nium, alij Epimelida vocāt. Arbor folijs malī, ſed minori- bus. Pomum fert rotundum eſui aptum, ima parte latius. Quod adſtringit, ſeroq; matureſcit.

De Loto arbore ſeu faba græca. CAP. CLXXIII.

l Otus arbor eſt vaſtæ magnitudinis, ferens baccā pipere ma- iorẽ, dulcem, graui odore, ſtomacho facilẽ. Aluū ſiſtit bac- cis. Rametorū ligni decoctū ſiue potu ſiue infuſione dyſen- tericis, ac ſœminis fluētione vuluæ laborantibus, auxilio eſt. Ruſſat capillos. Citam aluum cohibet.

De Corno. CAP. CLXXIIII.

c Ornus dura arbor eſt baccas ferens oliuæ modo oblongas, quæ primum virent, dein per maturitatem rubefcunt, aut caræ colorem repræſentant. In cibo adſtringunt. Proflu- uio alui atq; dyſenterię ſalutares, ſiue in edulio, ſiue in cibis exhibean- tur. Muria vt oliuæ condiuntur. Sanies quam virentia folia torrendo reſudarunt, impetigini conuenienter illinitur.

De Sorbis. CAP. CLXXV.

f Orba colorẽ malorū referētia priuſq; matureſcāt, diſſecta & ſole ficcata mandūtur, vt aluū ſiſtāt. Eadẽ eſt functio moli- torum farinæ, ſi polentæ loco ſumatur. Quod & decoctum eorum in potu præſtat.

De Prunis. CAP. CLXXVI.

p Runus arbor eſt nota, cuius pomū eſtur. Sed ſtomachum male habet. Aluum mollit. Syriaca pruna & præcipue quæ damasci gignuntur, exſiccata ſtomacho vtilia ſunt. Aluū adſtringunt. Folia pruni in vino decocta gargarizatu vtuam, gingi- uas, & tonſillas fluētione laboranteis reprimunt. Præſtant idẽ ſyl-
d .iij.

DE MEDICINALI MATERIA

uestrium prunorum baccæ, post maturitatem exiccatæ. Cum sapa vero decoctæ stomacho vtiliores redduntur. Aluumq; magis adstringunt. Gummi prunorum agglutinat. Potum in vino calculos comminuit. Ex aceto quoq; illitum impetigines infantium sanat.

De Arbuto. CAP. CLXXVII.

Arbutus siue vnedo arbor est cotoneæ malo non dissimilis, a tenui folio. Cuius fructus pruni magnitudinem implet, nullo intus nucleo. Huic apomacolæ cognomen est. Maturus aut flauet, aut rubescit, in esu acerosus. Stomacho aduersatur. Capitisq; dolorem mouet.

De Amygdalis. CAP. CLXXVIII.

Mygdalæ amaræ radicū decoctum, vitia cutis in facie corrigunt. Illitæ nuces idem munus præstant. Menfes admotæ ciunt. Capitis dolori auxiliatur, illitæ fronti aut temporibus cum aceto vel rosaceo. Epinyctidas sanant ex vino. Item putrescentia vlcera, & quæ serpunt, & morsus canum cum melle. Earum autem esu dolores finiuntur. Aluum emolliunt. Somnum faciunt. Vrinam ciunt. Contra sanguinis reiectiones cum amylo assuntur. Renum vitij, & pulmonum inflammationibus ex aqua in potu aut eclegmate cum resina terebinthina dantur. Calculosis difficilique vrinæ in passu auxiliatur. Et illinctu cum melle & lacte hepaticis, tussi, & inflationibus coli, nucis auellanae magnitudine. Quinis septenisue præsumptis ebrietatem non sentiunt potores. Vulpes si cū quauis esca eas vorauerint, emoriuntur. Gummi eius calfacit & adstringit. Reijcientibus sanguinem, potū auxilio est. Impetigines quæ summum corpus occuparunt, illitum cum aceto tollit. Tussi vetustæ cum diluto vino potum medetur. Calculosis cum passu bibere prodest. E nucibus græcis dulces cibo idoneæ, sed multo minus valent in remedijs q̃ amaræ. Attamen extenuant. Vrinam ciunt. Recentium esu cum suo putamine humida stomachi vitia recreantur.

De Pistacijs. CAP. CLXXIX.

Pistacia quæ in syria gignuntur, pineis nucibus familia sunt, a & stomacho facilia. Trita cum vino cōtra serpentium ictus profunt, siue edantur siue bibantur.

De Nuce iuglande. CAP. CLXXX.

Vces iuglandes sunt difficiles concoctu, stomacho inutiles, a biliosæ, capitis dolorem inferentes, tussientibus inimicæ, & vomituris ieiunis in cibo aptæ. Cū ruta vero & ficis præsumptæ venenis resistunt. Nec minus si a veneni haustu comedantur. Largius citatæ tineas latas pellūt. Illinūtur mammarū inflammationi,

abscessibus, luxatisq; cum mellis exiguo & ruta. Cum cepa autem sale et melle, canis hominisq; morlui proficiunt. Tormina cum calyce suo perustæ, & vmbilico admotæ sedant. Putamen combustum tritumq; in oleo & vino, infantium capite peruncto, nutrit capillum. Alopecias replet. Sistunt menses nuclei vsti, si trini ex vino admoueantur. Ijdem e veteribus illiti carbunculis, gangranis, & ægylopijs medentur. Alopecijs commanducati & impositi præsentī sunt remedio. Nucibus tuis oleum exprimitur. Recetes stomacho innocentiores sunt, & suauiores. Itaq; allio mistæ eximunt acrimoniā. Liuiore in corpore illitu tollunt.

De Nucibus auellanis. CAP. CLXXXI.

Vces auellanae quas & leptocarya vocant, stomacho infestæ sunt. Ipsæ tamē tritæ & in aqua mulsæ potæ, tussi veteri medentur. Tostæ & cum exiguo piperis potæ distillationem concoquūt. Crematarum cinis cum axungia aut adipe vrsi perunctus alopecijs capillum reddit. Aiunt nōnulli vsta earum putamina, & in cineris speciem redacta cum oleo, cæfiorum oculorum pupillas infantibus denigrare, persuso scincipite.

De Moro. CAP. CLXXXII.

Orus arbor nota est, cuius fructus aluum soluit. Stomacho inutilis est, & facile corruptionem sentit. Hoc idem præstat mori succus. Decoctus autem æreo vase atq; insolatus adstrictior redditur. Facit ad fluctiones, nomas, & tonsillarum inflammationes, addito mellis exiguo. Sed inolefcit vis eius adiecto scifili alumine, galla, croco, & myrrha, item myricæ semine, iri, & thure. Immatura mori poma ficcantur, tusaq; acinorum rhois vice obsonijs miscetur, vt cœliacos iuuent. Radicis cortex decoctus in aqua & potus aluum resoluit. Latas vētris tineas excutit. His quoq; auxiliatur qui aconitum hauferunt. Folia ex aceto illita ambustis igni medentur. Tinguuntq; capillum, vitium & fici nigræ frondibus simul coctis in aqua cœlesti. Succus foliorum cyathi mensura potus contra phalangiorum morsus auxilio est. Feruēfacti corticis & foliorum iure dentes aptissime in dolore colluuntur. Radix circiter messē incisa, facto in ambitu scrobe, succum emittit quī postridie concretus inueniri solet. Is in dolore dentium efficax est. Tubercula discutit. Et aluum purgat.

De Sycomoro. CAP. CLXXXIII.

Sycomorū aliqui etiā sycaminū id est morū vocāt, cuius fructus sycomorū etiā propter inefficacē gustū appellatur. Arbor est magna, fico similis, frōdosa, multo lacte abūdās. folijs mori. Pomum ter aut quater in anno fert, non ramis vt ficus, sed caudice ipso.
d. iiii.

DE MEDICINALI MATERIA

fo, caprifico non diffimile, dulcius grossis, sine granis interioribus. Quod non maturefcit nisi vngue aut ferro scalpatur. Nascitur plurimum in caria, rhodo, locisq; non multi tritici feracibus, vbi prouentu fecundo iuuamentum adfert, cum annonæ caritas premit. Pomū aluo vtile est, sed nullam præbet alimoniam. Stomacho aduersatur. Succus tenera arbore antequam fructū ferat eximitur, lapidis idu summo cortice desquammato. Si enim altiore plaga violetur cortex, nihil effluet. Spōgia aut vellere lachryma excipitur, quæ ficcata & in pastillos coacta reponit. Vis succi emollit. Vulnere cōglutinat. Discutit collectiones cōctioni repugnantes. Bibitur etiam aut illinitur contra serpētium morsus, duratos lienes, stomachi dolores, & horrores. Celerrime pomum teredinē sentit. Gignitur & in cypro arbor genere distans, quod vlmus esse videatur, folijs sycomori, fructu pruni crassitudine, multo dulciore, supradictis cætera similis.

De Ficis. CAP. CLXXXIII.

Ici maturæ recētes stomachum lædunt. Aluū soluant. Sed facile contrāta ab eis fluxio sistitur. Sudorem euocant pampulasq;. Sitim sedant. Calorem restingunt. Siccis natura ex-calfaciendi. Vires alunt. Sed sitim magis stimulant. Aluo vtilis. Rheumatismis vētris et stomachi contrariæ. Gutturi autē, arteriæ, renibus, vesicæ, & ijs quos longa valetudo decolorauit, anhelatoribus, hydro-picis, comitialibus aptissima. Feruētæ cum hyssopo & potæ, pectus purgant. Tussi veteri, diurnisq; pulmonum vitijis conueniunt. Aluū molliunt tusa cum nitro & croco, dein manducata. Decoctum artemisia & tōssillarum inflammationibus gargarizatu prodest. Cum hordeacea farina cataplasmati miscentur. Et in muliebres fots cum fœno græco & ptisana. Cæterum cum ruta coctæ torminibus infunduntur. Coctæ illitæq; duricias discutunt. Parotidas ac panos emolliunt. Furunculos ad maturationem perducunt, maxime nitro, iri, aut calce ad-dita. Crudæ si cum antedictis tundantur, eadem efficiunt. Cum ma-li corio, pterygia purgant. Cum atramento sutorio deploratis fere tibiarum fluxionibus, & cacoethicis vlceribus medentur. Quin & cū vino decoctæ addito absynthio & hordeacea farina, vtilissime hydro-picis illinuntur. Crematæ cum cæratofanant pernioles, pruriginis. Sonitusq; si crudæ terantur, & synapi liquido exceptæ auribus instil-lentur. Tam sylvestri, q̄ satiuæ fici lacteus succus coaguli modo lac cō-trahit, concretumq; dissoluit, vt acetum. Exulcerat corpora. Venarū spiracula laxat. Soluit aluum. Vuluam aperit cum detrita nuce græca potus. Mēstrua ciet cum luteo oui appositus, aut tyrrenica cæra. Podagricorū cataplasmatibus cū farina fœnogræci & aceto vtilis. Lepras,

lichenas, vitiliginēs, vitia cutis in facie, pſoras, vlcera in capite manā
 ria, cum polenta expurgat. Inſtillatum plagæ percuffis a ſcorpione,
 venenatorum iſtibus, & rabioſi canis morſibus auxiliatur. Prodeſt
 dentium dolori lana exceptus, & in cauis eorum additus. Verrucarū
 informicationes tollit cum adipe, circumlita in ambitu carne. Hoc
 idem præſtat ſuccus e teneris ramis ſylueſtris fici, qui lacte prægnātes,
 ſilente adhuc oculo tuſi exprimūtur, & ſiccatus in vmbra reponitur.
 Et lac & ſuccus imponuntur exulceratorijs medicamētis. Decoſti cū
 bubulis carnibus ramuli ficulni, facilem afferunt decoctionem. Lac
 efficiunt quod magis ſoluat, ſi inter coquendum ficulneo furculo ſpa-
 thæ loco moueatur.

De Groſſis.

CAP. CLXXXV.

Roſſi quæ erinei nonnullis vocātur, coſtæ illitæ & ſtrumas
 g nodosq; omneis emolliūit. Crudæ formicātes verrucas & thy-
 mos nitro farinaq; additis tollunt. Folia eadem poſſunt. Il-
 lita cum ſale & aceto vlcera in capite manantia, epinyctidas, & furfu-
 res ſanant. Ijs ſicolæ extuberationes, & genarum ſcabriciæ perfrican-
 tur. Nigræ ficus folijs cauliculisq; candidæ vitiliginēs perunguntur.
 Faciunt ad canū morſus & vlcera quæ ceria id eſt fauos vocant. Groſ-
 ſi cum ſylueſtris papaueris folijs oſſa extrahunt. Furunculos cum cæ-
 ra diſcutiunt. Contra muris aranei morſus, & ſcolopendræ venena, cū
 eruo & vino oillitæ auxiliantur. Fit ex cinere ficus tam ſylueſtris q̄ ſati-
 næ lixiuiū, crematis ramorū cauliculis, quod ſubinde macerari opus
 eſt & inueteraſcere. Si quidem inter cauſtica intelligitur. Gangrænis
 prodeſt. namq; expurgat & conſumit quæ excreſcunt. quo vtendum
 ita eſt. Spōgia aſſidue hoc lixiuio imbuta ſuperponitur. Interdum dy-
 ſentericis, & in fluxiones vetuſtas, & ſinus cuniculatim exedentes,
 magnosq; inſtillari conueniet. Etenim purgat, conglutinat, carne re-
 plet, & oras committit, non ſecus atq; emplaſtra quæ cruentis vulne-
 ribus iniſciuntur, enhæma vocant. Bibitus ad diſcutiendum ſanguis-
 nem concretum, & contra præcipitationes, rupta, conuulſa, cum cya-
 tho aquæ recenter colatum, addito olei exiguo. Cœliacis, dyſentericis
 per ſe cyathus datus prodeſt. Neruorum vitij, conuulſionibus com-
 mode illinitur ex oleo, vt pote quod ſudores moueat. Aduerſus gypſi
 potum & phalangiorum morſus bibitur. Hæc eadem præſtant reliqua
 lixiuia. præſertim quænum. Omnia tamen adſtringunt.

De Perſea.

CAP. CLXXXVI.

p Perſea arbor eſt, in ægypto fructum ferens cibo idoneū, ſtoma-
 cho vtilem, in quo phalangia cranocolapta nomine inue-
 niuntur, præſertim in thebaide. Arida folia illitu ſanguinis

DE MEDICINALI MATERIA

eruptiones fiſtunt. Arborem hanc prodiderunt aliqui in perfide exi-
tioſam eſſe , tranſlatamq; in ægyptum , mutata natura in cibos rece-
ptam.

De Iberide. CAP. CLXXXVII.

i Beris ſiue cardamantica folia habet naſturtij, vere virens
tia, caulem cubitalē, aut minorē. In incultis naſcitur. Aeſta
telacteum florē promit, quo tempore efficacior eſt. Radices
duas naſturtio ſimiles habet, calfacientes, et adurentes. Ipſæ enī iſchia
dicis cum falſa axungia emplaſtro vtilis, quaternis horis alligatæ, vt
dein in balneas deſcendatur, & poſtea oleo cum lana locus perunga-
tur.

De Halicacabo. CAP. CLXXXVIII.

h Alicacabum aliqui diræxon, alij ſtrychnon, alij quod inſa-
niam faceret manicon, alij dorichnyon quod cuſpides eo ti-
gerentur appellauere, Rhomani Apollinarē minorem, aut
vlticanā herbam, alij opſaginem, Daci cocalidam, Aphri cancabon.
Frutex eſt multos habens ramos fractu peruicaces, ſurculoſos, folia
plurima, pingua, cotoneæ malo ſimilia, florem rubrum, acinum in to-
liculis paruis croceum, ciceris magnitudine, ſemina quina ſena
ve erui modo rotunda. Naſcitur in petris non procul
a mari. Huius ſuccus cum vino potus drachmæ
pondere ſomnum conciliat, vt papaueris
opium. Semen vrinam cit. Dantur
hydropicis duodeci corym-
bi. Plures autē poti-
tionem

creant. Remedio eſt aqua mulſa copioſa potui data, Succus & cortex
miſcentur paſtillis, qui doloris ſen-
ſum auferūt. Decoctū in vino ſi
in ore contineatur, dētiū
dolorē mitigat. Radi-
cis ſuccū melle illi
tus oculorū he-
betudines
diſcu-
tit.

F I N I S

LIBER SECVNDVS
 PEDACII DIOSCORIDIS ANAZARBEI
 DE MEDICINALI MATERIA LI
 BER SECVNDVS, IOANNE
 RVELLIO SVESSI
 ONENSI IN
 TERPRE
 TE.

30

I

N primo charissime Ari libro, quem de medica
 nali materia condidimus, de aromatibus, oleis,
 vnguentis, arboribus, & nascentibus in eis suc
 cis, lachrymis, seminibusq; differuimus. In hoc au
 tem secundo de animantibus, melle, lacte, adipe,
 frumentis, atq; oleribus explicabimus, subnexis
 hærbaceis quæ acri prædita sūt facultate. Vt pote
 quæ cum ipsis cognatione iuncta sint. Qualia allium, cepa, synapi, in
 telliguntur. Idq; ideo, ne cognatorum vires disiuxisse videamur.

De Aquatili echino. CAP. I.

Arinus echinus stomacho ventriq; utilis est. Vrinam cit.
 m Huius testa recens inassata, commode medicamentis ammi
 scetur, quæ pforas abstergunt. Crematæ vero cinis sordida
 vlcera expurgat. Luxuriantem carnem reprimit.

De Terrestri herinaceo. CAP. II.

Errestris herinacei coriū combustum alopecijs cum piceli
 t quida aptissime illinitur. Afficatum corpus, & cū aceto mul
 so potū, renum vitijs auxilio est. Item aquæ quæ cutē subiit,
 conuulsionib⁹, elephantia, & male habitis, quos cachectos vocāt. Vi
 scerum fluxiones exsiccat. Eiusdem iecur testa insolata arefactum, ad
 eisdem vsus vtilissime reconditur.

De Hippocampo. CAP. III.

h Ippocampus marinum animal est exiguum, cuius cremati
 cinis cum liquida pice aut axungia seu amaracino vnguen
 to illitus, alopecias replet.

De Purpura. CAP. IIII.

p Vrpura vsta exsiccat. Dentes abstergit. Excrescentias in car
 ne cohibet. Vlcers purgat. Et ad cicatricem perducit.

De Buccinis. CAP. V.

c Adem præstant concremata buccina, sed vehemētius vrūt.
 Si quis salis plena, fistili crudo adurat, dentifricio cōueniūt.
 Ambustus vtiliter illinuntur, quibus solui medicamentū

DE MEDICINALI MATERIA

non oportet. Nam postea q̄ vulnus cicatricem duxerit, ipsum in testæ modum induratum, spōte sua decider. Fit etiam calx e buccinis, vt in eius mentione demonstrabimus.

De Ionijs. CAP. VI.

alio alij
i Onia vocantur purpurarum buccinorūq̄ media, qua parte testæ volumē clauiculatim intorquetur. Cremata simili modo, maiorem purpuris buccinisq̄ facultatem vrēdi consequuntur, vt pote cum ea parte, eorum natura prematur. Buccinorum carnes ori gratae sunt, & stomacho vtilēs. Sed aluum non molliunt.

De Myacibus. CAP. VII.

moches
m yaces laudatissimi in ponto. Cremati eundem buccinis effectum præbēt. Priuatim plūbi more eloti, oculorum medicamentis cum melle vtilēs habentur. Genarum crassitudines absumunt. Albugines purgāt, & cetera quæ oculis caliginem offundunt. Carnes eorum ad canis morsus vtilissime imponuntur.

De Tellinis. CAP. VIII.

*Nonny de l'Inde
in ardonia
purpure*
r Ecetes tellinæ aluo vtilēs, sed maxime ius earum. Salitæ vruntur, tritæq̄ in cinerem & cū cedria instillatæ, auulsos pilos renasci non patiuntur.

De Chamis. CAP. IX.

c Hamarum conchularumq̄ in exigua aqua decoctarum ius, aluum ciet. Id cum vino assumitur.

De Onyche. CAP. X.

o Nyx conchylj tegumētum est, ei simile quo purpura intergitur. Quod in Indiæ nardiferis lacubus inuenitur, suauem ideo spirans odorem, q̄ conchyliis inibi nardi pabulo vescantur. Colligitur posteaq̄ stagnantes aquæ aestiuis squalloribus inaruerunt. Laudatissimus qui a rubro mari deferitur candicans, pinguis. Babylonicus nigrescit, atq̄ minor conspicitur. Ambo odoris gratia suffiuntur. Sed aliquatenus castoreum olent. Idem suffitu excitant foeminas vuluæ strāgulatu oppressas, comitialesq̄. Poti ventrem molliunt. Crematum conchylium eadem efficit quæ purpura & buccinum.

De Cochleis. CAP. XI.

imassond

t Errestres cochleæ stomacho vtilēs sunt & non facile corrumpuntur. Optimæ sardonica, aphricana, astypaleica, & quæ in sicilia, chio, & liguriæ alpibus gignuntur, pomariæ id est operculares cognominatæ. Marina stomacho idonea, & facile aluo excernitur. Fluuiatilis virus olet. Quæ vero vepribus frutetisq̄ glutinata cohæret, quā vocāt nōnulli cehlon, ventrem & stomachum turbat. Vomitiones excitat. Crematæ omniū testæ exalfaciendi et vrēdi

naturam sortiuntur. Purgant lepras, vitiligines, dentesq;. Emendant oculorum cicatrices, & vitia cutis in facie, albugines, ac visus hebetudines; si vsta tritaq; ex melle illinantur. Crudæ cum tegumentis impositæ, aquæ inter cutem tumores exugunt. Sed non ante solvantur, quam omnis hauriatur humor. Podagricas inflammationes leniunt. Impactos corpori aculeos illitæ euocant. Menses tritæ & admotæ ciunt. Carnes earum cum thure & myrrha illitæ, cum vulnera alia, tū maxime quæ nerui acceperunt, conglutinant. Tritæ in aceto sanguinem naribus erumpentē infrænant. Viuæ corpus & præsertim aphricanæ cum aceto deuoratum, stomachi dolores mitigat. Trita cum testa, vino & myrrha, si exiguū inde bibatur, coli vesicæq; cruciatus sanant. Terrestris pilos incommodos replicat, si quis abrafo acu lēto, pilum attingat.

De Cancris.

CAP.

XII.

Errestris

c Ancrorum fluuiatilium exustorū cinis qui duo cochlearia expleat, adiecto confimili radice gētianæ modo, triduo potus cum vino magnopere prodest canis rabiosi moribus. Rimas pedum sedisq;, perniunculos, & carcinomata, cū decocto melis lenit. Triti crudi, potiꝫ ex asinino lacte, auxiliantur contra serpentium phalangiorumq; morsus, atq; scorpionum ictus. Decocti autem & cum iure esitati, ijs profunt qui tabe conficiuntur, aut leporem marinum hauserunt. Necant scorpiones triti & cum ocimo admoti. Posunt eadem marini, verum inefficacius omnia præstant.

De Terrestri scorpione.

CAP.

XIII.

Errestris, scorpionis

t Terrestris scorpio tritus & impositus, suæ plagæ remedium est. Quin inuenitur assatus ad eadem prodesse.

De Marino scorpione.

CAP.

XIII.

Marinus

m Arini scorpionis fel conuenit ad suffusiones oculorum, albugines, & hebetudines.

De Dracone marino.

CAP.

XV.

Draco marinus

d Raco marinus replicatus atq; impositus, ictus spinæ suæ qua ferit, medela est.

De Scolopendra.

CAP.

XVI.

f Colopēdra in oleo decocta si illinatur auellit capillos. Sed contactu pruritus facit.

De Torpedine pisce.

CAP.

XVII.

Torpedine in hacbo pumia

m Arina torpedo diuturnis capitis doloribus admota, cruciatus vehementiam mulcet. Eadem apposita cōuersam sedem prociduatq; coercet.

DE MEDICINALI MATERIA

De Viperinis carnibus. CAP. XVIII.

Iperinae carnes si coctae edantur, claritatem oculis afferunt.
 v Neruorum vitij auxiliantur. Incrementes strumas reprimunt.
 detracta autem cute, caput caudaque, quoniam carne vacant,
 amputari debent. Quippe commenticium est quod praecipitur, certam
 vtrinque mensuram praecidi oportere. Reliquum vero corpus elotum
 dissectumque discoquitur cum oleo, vino, salis exiguo, & anetho. Aiunt
 ijs qui viperas esitent pediculos procreari, quod plane a veritate ab-
 horret. Adijciunt aliqui longam senectutem agere, qui eo cibo vescun-
 tur. Sal ex eis ad eadem conficitur, sed inefficacior est. Viua autem vi-
 pera in fidele nouum demittitur. Adijciuntur salis caricarumque trita-
 rum, singulatim quique sextarij, mellis cyathi sex. Mox fideilis opercu-
 lum luto oblinitur, & fornacibus inassatur, donec sal in carbones re-
 digatur. qui postea tritus in pulueris faciem, recoditur. Plerumque quo
 stomacho gratior fiat, immiscetur nardi spica, aut folium, aut malaba-
 thri momentum.

De Senecta anguium. CAP. XIX.

Eneas anguium in vino decocta dolori aurium infusu, &
 f dentium, collutione auxilio est. Addunt eam in medicamen-
 ta oculorum sed praecipue viperinam.

De Lepore marino. CAP. XX.

Epus marinus loligini paruae similis est, qui per se tritus
 l aut cum vrtica illitus, capillos euellit.

De Lepore terrestri. CAP. XXI.

Errestris leporis inassatum cerebrum manditur, iuuandis tre-
 t moribus qui valetudine contracti sunt. Affritu aut cibo faci-
 lem infantibus dentitionem praestat. Exustum caput & cum
 adipe vrsino aut aceto illitum, alopeciarum inanitatibus medetur. Le-
 porinum coagulum post triduum a concubitu potum, conceptum ad-
 mere, partusque spem intercipere proditur. Vuluae & alui fluxum sistit.
 Comitiales iuuat. Contra venena ex aceto bibitur, praesertim aduersus
 concretum lac, & viperarum morsus. Sanguis eius si calidus illinatur
 vitia cutis in facie, vitiliginem, lentiginemque sanat.

De Pastinaca. CAP. XXII.

Arinae pastinacae radius, qui eius cauda enatus aduersis squa-
 m mis reflectitur, dentium dolore mitigat. Nam eos fragit & euocat.

De Sepia. CAP. XXIII.

Epiae coctae comestum atramentum aegre conquoquitur. Al-
 f uum mollit. Collyrijs e testa factis conuenienter genarum sca-
 briciae perficitur. Vsum in sua testa donec id quod crusto-

sum est abscedat, postea tritū, expurgat vitilignes, furfures, dentes, & vitia cutis in facie. Eorum in medicamenta oculorum addi solet. Cōtra albugines, oculis iumentorum efficaciter inspuitur. Pterygia oculorum absumit, cum sale tritum & iniectum.

De Mulo pisce.

CAP. XXIII.

m Vlorum assiduo cibo, aciem oculorum hebetari constat. Is marini draconis, aranei, ac scorpionis moribus medetur, si crudus atq; dissectus admoueat.

De Testibus hippopotami

CAP. XXV.

h Ippopotami testes exiccati ac triti contra serpentū morsus bibunt.

De Fibrinis testibus.

CAP. XXVI.

f Iber ancipitis vitæ animal, plerumq; cū piscibus & canicris ex aqua victum capescit. Huius testes serpentium venenis aduerfantur. Sternutamenta mouent. Et in vniuersum varios obtinent vsus. Siquidem menses ac parrus ciunt, duabus drachmis cum pulegio poti. Secundas quoq; eiiciunt. Contra inflationes, tormina, singultus, venena, ixiāq; ex aceto bibuntur. Lethargicos, & vtrūq; veterno obdormiscentes excitant infusi. Cum aceto autem & rosaceo, olfactu & odoris suffitu, idem faciunt. Poti & illiti prosunt tremulis, conuulsionibus, & omnibus neruorum vitijs. In summa calfactoriā vim habent. Eligi debēt testes qui ex vno ortu connexi sunt. Fieri enī non potest vt gemini folliculi in vna membrana coniuncti reperiantur. Liquore intus veluti mellis cærosi odoris grauis, gustu acri, mordente, ac friabili, naturalibus tunicis circumdato. Quem fraude aliqui corrumpunt conijcientes in follem gummi, aut ammoniacum cum sanguine & castorio subactum, & ita exiccantes. Vanum est quod traditur, testes ab ipsis euelli, & a sese abijci, quum venatu vrgentur. Siquidem tangi nequeunt, ita vt in sue sustrikti. Operæ autem precium est, diuisa pelle melleum liquorem cum euesiente tunica assumere, & sic catum potui dare.

De Vulgari mustella.

CAP. XXVII.

m Vstella quæ in domibus nostris oberrat, ambusta exenteratur, & inueterata sale in vmbra siccatur. Ea binis drachmis cū vino pota aduersus omnia serpentium venena præsentaneo est remedio. Toxico, simili sumpta modo resistit. Eius ventriculus coriandro fardus inueteratusq; percussis a serpente, & comitialibus potu auxiliatur. Cremata in fistili podagricis confert, cinere ex aceto illico. Sanguine perunctæ strumæ iuuantur. Comitialibus etiam prodest.

DE MEDICINALI MATERIA

De Ranis.

CAP. XXVIII.

Contra omnium serpentium venena pro antidoto sunt ranæ,
 c si ex sale et oleo decoctæ edantur, iulq; earum itidem sorbea-
 tur. Contra inueteratos tendonum rigores pollent, Illitus ea-
 um cinis, profluentis sanguinis impetus sistit. Explendis alopeciarū
 inanitatibus ex liquida pice illinitur. Viridium ranarū cruor auulsos
 generis pilos renasci prohibet, in vestigia euulforum instillatus. Deco-
 ctæ in aceto & aqua, dentium dolores collutione leniunt.

De Fele.

CAP. XXIX.

Ecens felis in cibo nutrit, & facilem præbet aluum. Sale ve-
 r ro conditus, non suppeditat alimētum. Arteriam expurgat.
 Et vocem expedit. Illita saliti caro, aculeos extrahit. Muria
 eius incipientibus dysenterijs prodest, si in defidentium foras adijcia-
 tur. Fluxiones siquidem ad summa cutis elicit. Ischiadicis infusa me-
 detur.

De Cerro pisce.

CAP. XXX.

Erri saliti caput exustum, excrecentes vlcera oras puluil
 c losq; reprimat. Nomas cohibet. Thymos clausq; absุมit.
 Caro non secus atq; salsamentum prodest a scorpione per-
 cussis, aut a cane demorsis.

De Menis.

CAP. XXXI.

Enarum ex capitibus cinis si illinatur, callosas sedis rimas
 m abolet. Eius etiam garrum corporis putredines collutione fe-
 dat.

De Gobio.

CAP. XXXII.

Obius recens in suillum vētrem coniectus, si confuta rima in
 g duodecim aquæ sextarijs, donec duo supersint decoquatur, &
 sub diuo refrigeratus potui detur, alius sine molestia deijci-
 tur. Illitus contra serpentium canumq; morsus auxilio est.

De Thunno.

CAP. XXXIII.

Onditanei thunni caro, quam omotharicon vocant sumpta
 c ijs auxiliantur, quos vipera nomine prester m omorderit. Sed
 oportet vinum q̄ plurimum subinde cogantur haurire, ita vt
 vomitione reddatur. Contra acrimōnias escratorum maxime valet. Ca-
 num moribus vtilissime illinitur.

De Garro.

CAP. XXXIIII.

Arrum omne, quod ex piscibus carnibq; sale maceratis li-
 g quamen est, illitū depascentia vlcera sistit. Morsis a cane me-
 detur. Dysentericis atq; ischiadicis infunditur. Nonnullis vt
 exulcerata adurat. Alijs autem ad lacescenda, quæ vlcera non fense-
 runt.

De Iure piscium.

CAP. XXXV.

r Ecentium piscium ius, modo per se, modo ex vino potum, aluum subducit. Priuatim adhuc vsum conficitur e gobijs, & scorpionibus, & iulide, e percis, & recentibus alijs saxatilibus, nec virus recipientibus, simpliciter cum aqua oleo & anetho.

De Cimicibus lectularijs. CAP. XXXVI.

c Imices qui in cubilibus enascuntur, cauis fabarum inclusi, si antefebrium significationes septeni deuorentur, quartanis auxilio sunt. Et citra fabas illiti, percussis ab aspide profunt. Vuluarum exanimationes olfactu reuocant. Poti cum vino aut aceto adhærentes sanguisugas abigunt. Triti, & vrinariæ fistulæ impofiti, stranguriam leuant.

De Millepeda.

CAP. XXXVII.

m Illepedæ, quæ sub aquario vase stabulantur, animalia sunt multis pedibus nitentia, quæ cōtacta manu contrahuntur in orbem. Hæ ex vino potæ difficili vrinæ, & regio morbo auxiliantur. Millepedas illini anginis vtilissimum. Tritæ, & in cortice mali punici calfactæ, doloribus aurium addito rosaceo conuenienter instillantur.

De Blatta pistrinaria CAP. XXXVIII.

b Lattæ eius quæ in pistrinis inuenitur, interanea trita aut cum oleo decocta, aurium dolores instillatu mitigant.

De Pulmone marino. CAP. XXXIX.

p Odagras pernionesq; emendat pulmo marinus recens, tritus & illitus.

De Suillo pulmone. CAP. XL.

f Vjllus & agnus vrsinusq; pulmo, impofitu, intertrigines ab aquis contractas, ab inflammatione tuetur.

De Vulpino pulmone. CAP. XLI.

p Vimo vulpis si arefactus bibat, suspiriosos adiuuat. Adeps quoq; liquefactus, infususq;, auris dolorem finit.

De Afinino iocinere. CAP. XLII.

a Sini iecur inassatum, esu comitialibus prodest. Verumtamen ieiunis edendum præcipitur.

De Genitali cerui maris. CAP. XLIII.

g Enitale masculi cerui tritum & in vino potum, a vipera demorsis auxiliatur.

DE MEDICINALI MATERIA

De Vngula Afini.

CAP. XLIIII.

- v Ngularum afini cinis, per dies multos binis coclearibus porus, proditur comitiales adiuuare. Eadem oleo subacta strumas discutunt. Et illis per nionibus medentur.

De Lichenibus equorum. CAP. XLV.

- i Ichenes sunt in equorum genibus, & super vngulas indurati calli, qui triti & in aceto poti comitialibus mederi traduntur.

De Vngula capræ. CAP. XLVI.

- v Ngularum caprinarum cinere peruncta ex aceto alopecie sanantur.

De Caprino iocinere. CAP. XLVII.

- c Apræ inassati iocineris decidua sanie, inungi lusciosos prodest. Et dū coquitur apertos oculos vaporari. Carnes assas vesci perq̃ vtile. Tradunt hircini iocineris cibo comitiales depræhendi.

De Apri iocinere. CAP. XLVIII.

- i Ecur apri recens si arefactum teratur, ex vino potum contra serpentium volucrumq; morsus auxilio est.

De Canerabioso. CAP. XLIX.

- i Ecur canis qui rabie exagitatur, ab emorsis sumptum, ne tententur metu aquæ tueri creditur. Vtuntur autem ad arcendos aquæ pauores dente eo, qui caninus dicitur. Hūc a cane qui mormordit exemptum, & folliculo inditum, pro amuleto brachio adnectunt.

De Soleis veteramentarijs. CAP. L.

- v Eteris soleæ crematæ illitus cinis ambusta igni, intertrigines, necnon calciamentorum attritus sanat.

De Mergi iocinere. CAP. LI.

- f Iccatum mergi iecur & ex hydromelite binis coclearibus potum, secundas expellit.

De Gallina. CAP. LII.

- d Iffectæ gallinæ & adhuc calentes appositæ, serpentium moribus auxiliantur. Sed identidem alias sufficere oportet.

De Gallinaceo cerebello. CAP. LIII.

- g Allinarum cerebellum in vino bibendum datur contra serpentium morsus. Sanguine a cerebri membrana profluente sistit.

Subdita autem ventriculo galli membrana cornu non abfimilis, cuius pellis in decoctionibus detrahi solet, siccatur. Tritaꝫ in vino cōuenientissime stomachicis datur in potu. Ius e vetere gallinaceo aluum soluit. Abiectis itaqꝫ interaneis salem coniici oportet, & confuto ventre decoqui in viginti sextarijs aquæ, donec ad treis heminas redigātur. Torū id refrigeratū sub diuo, datur. Aliqui incoquunt olus marinum, mercurialem, cnicum, aut filiculam. Crudos humores crassosqꝫ, atram bilem & strigmenta elicit. Prodest lōgis febribus, suspirijs, articularijs morbis, & inflationibus stomachi. Eorum venter sale conditus & in vmbra siccatus, contra eximias vacuationes medicamentorum trium drachmarum pondere, præsentī est auxilio. Quandoquidē protinus deiectiones cohibet. Teri autem debet in farinam, & aqua subactus dari.

De Ouorum natura. CAP. LIIII.

Vum molliculum plus alit forbili, & durum plus molli. Lutum oui contra oculorum dolores vtile est. Inassatum sedis inflammationibus prodest, cum croco & rosaceo. Et condylomatīs cum meliloto. Cum vua autem fruticis eius quē rhoa dicunt, & galla in patinis frigitur, vt cibo aluos sistat. Per se etiā offerri solet.

De Candido oui. CAP. LV.

Andidum oui crudū refrigerat. Spiramenta cutis obstruit. inflammationes oculorum infusum lenit. Ambusta si statim eo perungantur, pustulas nō sentiūt. Faciē a solis adustione tuetur. Fronti impositum cum thure fluxiones arcet, auertitqꝫ. Inflammationes oculorum lana exceptum, addito rosaceo melle & vino mitigat. Vtiliter cōtra hæmorrhoidū morsus crudum forbetur. Sūmetepidū prodest vesicæ rosionibus, renū exulcerationibus, faucium scabriciæ, reiectionibus sanguinis, destillationibus, & thoracis rheumatismis.

De Cicadis. CAP. LVI.

c Izadæ quæ inassatæ manduntur, vesicæ doloribus profunt.

De Locustis. CAP. LVII.

I Oculis odoris suffitu vrinæ difficultates adiuuant, præsertim quæ fœminas male habent. Earū carnes nullo sunt vsui. Est & quoddā genus locustæ quæ assiracos aut onos dicitur, sine pennis, prælongis mēbris. Exiccata autē si ex vino bibatur, cōtra scorpionis morsus magnopere proderit. Hac abūde vescūtur Aphri, qui leptim incolūt.

De Ossifrago. CAP. LVIII.

v Enter eius auis quam latini ossifragum appellant, particulatim potus, calculos cum lotio pellere proditur.

DE MEDICINALI MATERIA

De Galerita.

CAP.

LIX.

- g Alerita auicula est parua, apicem in vertice pauonis modo gestans, quæ assa & in cibo sumpta cœliacos adiuuat.

De Hirundinibus.

CAP.

LX.

- d Isectis crescente luna pullis hirundinis, qui primo partu excludi sunt, in ventre eorum lapillos offendentes. E quibus duos, vnum versicolore, alterum purum eximes. Ij priusq̃ terram attrigerint, in iuuenæ corio, aut ceruina pelle, lacerto aut collo adalligati, comitialibus proderunt. Et sæpe prorsus eos recreabunt. Hirundines vti ficedulæ in cibo, aciei visus medicamentum præbent. Tam pullorum q̃ matrum cinis cum melle oblitus, oculis claritate adfert. Anginæ eo comode perunguntur. Vuæ & tonsillarum inflammationibus hoc cinere succurritur. Et ipsæ & pulli exiccati, si drachmæ pondere ex aqua bibantur, hos iuuant qui anginæ morbo conflitantur.

De Ebore.

CAP.

LXI.

- c Boris scobe illito paronychia sanantur. Vim adstringendi ebur obtinet.

De Suillo talo.

CAP.

LXII.

- f Vis talus comburitur, dum nigro albescat, qui tritus & potus inflationibus coli, longiq̃ torminibus medetur.

De Ceruino cornu.

CAP.

LXIII.

- c Eruini cornus cinis elotus, binis cochlearibus epotus prodest dysentericis, excreantibus sanguinem, cœliacis, regio morbo, & vesicæ doloribus cum tragacantha. Fœminis fluxione vuluæ laborantibus, cum liquore huic rei accommodato. Cerui cornu cotusum, crudo fistili luto circumlito & in furnum indito vritur donec albescat. Id cadmiæ modo elotum, vlceribus oculorum & defluxionibus salutare est. Infusum dentes expurgat. Crudi cornus suffiti nidore ferpentes fugantur. Feruescendum in aceto sive ginginæ colluantur, maxillarum a dentitione dolori admittit.

De Eruca.

CAP.

LXIII.

- c Rucis quæ in oleribus gignuntur cum oleo peruncti, a venenatis bestiis feriri negantur.

De Cantharidibus.

CAP.

LXV.

- c Frumentis cõgestæ cantharides ad recondendum idoneæ sunt, quæ fistili vase non picato cõduntur, & raro lintheo obligato ore, & deorsum cõuerso suspēduntur super acetiferuētis quacerrimi halitum, donec aestu examinētur. Postea lino trāffixæ reponunt. Potentissimæ omnes variæ, luteis lineis, quas in penis trāuersas habet, promissosq̃ corpore, crassæ, ac blattarum modo præpignes. Sed inertes

ac imbecillæ quæ, vnius sunt coloris.

De Bupreste.

CAP.

LXVI.

Imili modo reconduntur buprestes, genera quædam cantaridum, & pinorum erucæ, quæ supra cribrum suspensum feruenti cinere paulisper intostæ, reponuntur. Vis omnium cõmunis erodere, vlcerare, calorem elicere. Qua de causâ ammiscetur medicamentis quæ lepras, ferofq; lichenas, & carcinomata sanant. Menses ciunt pellis emollientibus additæ. Aliqui cantaridas antidotis impositas, aquæ subter cutem auxiliari prodiderunt. Argumento q; vrinam moueant. Alij pennas pedesq; contra potarum veneficia, remedio esse tradiderunt.

De Salamandra.

CAP.

LXVII.

Alamãdra lacertæ genus est, iners, varium, quod frustra creditum est, ignibus non vri. Vim habet erodentẽ, calidioria, exulceratẽ. Additur vt cantaris in medicamenta, quorum vis est exesse, & lepras abolere. Similiq; modo reconditur. Liquefacta in oleo pillos euellit. Exenterata detrahtis pedibus & capite in melle seruatur ad eundem vsum.

De Araneo.

CAP.

LXVIII.

Raneus quem olcum, alij lycium vocant, subactus cum splenio, & linteo illitus, prolatusq; vtriusq; temporibus aut frontis, tertianos circuitus per sanat. Tela eius imposita sanguinẽ sistit. Vulnere quæ summam cutẽ occuparunt, ab inflammationis iniuria vindicat. Est & alterum aranei genus qui cãdidã, tenuẽ, densamq; telam orditur, quẽ in loculo ligatũ, & lacerto appensum, quarranis circuitibus mederi narrat. Decoctus ex rosaceo & infusus, aurium doloribus auxiliatur.

De Lacerta.

CAP.

LXIX.

Acertæ caput intritũ & appositũ, aculeos & omnia corpori infixa extrahit. Varos, formicantes verrucas, & penfiles quas ærochordonas vocant tollit. Iecur, ex his dentibus coniectũ dolores finit. Si diuulsã admoueatur, idtis a scorpione leuamentum præstat.

De Sepe.

CAP.

LXX.

Eps quam aliqui lacertam calchidicam vocarũt, in vino posita morsus suos sanat.

De Scinco.

CAP.

LXXI.

Cincus aut ægypti, aut indiæ, aut rubri maris alumnus. quic inueniatur in lydia mauritanix. Est autem terrestris crocodilus sui generis, qui saltus affertur in nasturcio. Aiũt carnes quæ renes amplectantur, id sibi viriũ vëdicasse, vt si drachmæ pōdere bibantur, venerẽ accēdant. Verũ decocto lentis cũ melle aut semine la

DE MEDICINALI MATERIA

Stuæ cū aqua poto, veneris cupiditates inhihentur. Additur in antidota. De Terrenis vermibus. CAP. LXXII.

Erreni vermes, impositi præcisos nervos glutinant. Tercias discutiant decocti cum anserino adipe. Infusi, affectis auribus medentur. Cum oleo autem decocti si in contrariam aurem instillētur, dentium doloribus præstant auxilium. Poti ex passio vrinam ciunt.

De Mure araneo. CAP. LXXIII.

m Vs araneus dissectus & impositus, sui morsus veneficia luit.

De Muribus. CAP. LXXIIII.

m Vres qui in domibus oberrant, concisos scorpionum plagis vtilissime imponi, in cōfesso est. Si in assatos infantes ederint, oris saluam exiccare promittunt.

De Vsu lactis. CAP. LXXV.

l Ac generatim omne boni succi est. Corpus alit. Aluū emoluit. Stomachum & intestina, inflatione vexat. Vernū tamen dilutius æstiuo habetur. E viridi pabulo aluum magis læuigat.

Probatum autem candidum, æquali crassitudine, quod vngui instillatum cogitur. Aluum minus tentat caprinum. Quoniam adstringentibus pabulis, robore, lentisco, & oleaginis frondibus, magna ex parte vescitur. Inde stomacho accommodatissimum reddi solet. Ouilum autem dulce, asperū, & præpingue, non vsq; adeo vtile stomacho. Bubulum tamen, ahninum, & equinum, ventri magis idonea. Sed ipsum turbant. Quibus in locis pecora, scamoniā, veratrū, lematidem, aut mercurialem pascuntur, lac omne ventrem & stomachum subuertit. Quale in iustinis montibus esse, a nobis proditum est. Siquidem capræ quibus candidum veratrū pabulo fuerit, primo foliorum partu, euomunt, & eorum lac haustum nauseam creat, & stomachum in vomitiones effundit. Adstringentius omne decoctum, præcipueq; candentibus calculis marinis exutum. In summa, omnibus auxiliatur interenis exulcerationibus, præsertim faucium, pulmonis, interaneorum, vesicæ & renum. Foris vero contra pruritum cutis, eruptiones papularum, & vitiatos corporis succos. Recens cum melle crudo, addito sale, datur exigua aqua dilutum. Minus inflat quodcunq; feruefactū. Decoctum cum calculis marinis ad dimidias, vlcerosas vëtris fluctiones adiuvat.

De Sero lactis. CAP. LXXVI.

l Ac quodcunq; serum continet implicatum. Quod vbi discessit a lacte, multo potentissimum ad purgationes redditur. Datur quibus sine acrimonia volumus deiectionem moliri.

ri, vt melancholicis, comitialibus, lepris, elephantijs, & erumpētibus toto corpore papulis.

De Schisto ceuscissili lacte. CAP. LXXVII.

X omni lacte fit quod schistum appellant. Lac autem fistili
 e nouo feruet, ramoq; ficulneo recēti mouetur, insparfis postq;
 bis aut ter efferbuerit, totidem aceti mulsi cyathis, quot sunt
 heminae lactis. Ita enim ferescens liquidū ab eo diuiditur, quod in ca-
 seum concreuit. Sed cum feruet, ne superfundatur, cōueniet spongia ex
 frigida cōtinuo fistilis labrum detergere, seltariumq; argenteū frigidaē
 aquæ plenum demittere. Bibitur heminis per interualla singulis vsq;
 ad quinas, ita vt intercedentibus spatijs, potantes ambulent. Lac autē
 recens efficax est contra rosiones vstionesq; ab exitiālibus medicamē-
 tis factas, vti a cantharidibus, aut salamandra, bupreste, aut pinorum
 eruca, hyoscyamo, dorycnio, aconito, aut ephemero. Præsertim bu-
 bulum ad id eximie confert. Gargarizatur autē exulceratis faucibus,
 tonsillisq;. Asininum peculiariter collutos dentes gingiuasq; stabilis.
 Fluctiones alui si vlcera sentiantur tenesmosq;, ouillum, bubulum aut
 caprinum cum marinis lapillis decoctum, sistit. Per se autē & cum hor-
 deacea ptisana aut hālicaceo cremore infusum, magnopere intestino-
 rum rosiones mitigat. Exulceratæ vuluæ immittitur.

De Muliebri lacte. CAP. LXXVIII.

Vmanum lac dulcissimum est. Et maxime alit. Mammis au-
 h tem exuctum, prodest tibi & stomachi rosionibus. Contra
 haustum leporē marinum præsidio est. Oculis cruore exictu
 suffusus, cum thuris polline instillatur. Podagricis vrile est cum meco-
 nio & cærato illitum. Lac omne respuēdum splenicis, hepaticis, comi-
 rialibus, vertiginosis, & neruorum vitio laborantibus, febriculosis,
 & capite dolentibus, nisi si quis interdum purgationis gratia vt osten-
 dimus, schistum præbeat. Primiperæ canis lacte perunctos narrant
 glabrescere. Potum contra venena antidoti vicem obtinet. Abortus
 mortuos expellit.

De Caseo. CAP. LXXIX.

Aseus recens sine sale sumptus alit. Stomacho utilis est & fa-
 cile in mēbra delegatur. Corpus augeat. Aluū modice mol-
 lit. Alius tamen alio præstantior, pro natura lactis a quo con-
 ficitur. Decoctus autem & expressus, deinde inassatus, aluum sistit.
 Illitus, oculorum inflammationibus & sugillatis prodest. Qui vero
 recens salitus est, minus alimenti præbet. Corpus apte minuit. Sto-
 macho aduersatur. Negocium ventri interaneisq; exhibet. Vtustio-
 e .iij.

DE MEDICINALI MATERIA

re fistitur aluus. Sero quod a caseo manauit, q̄o optime canes alūtur.

De Hippace.

CAP. LXXX.

q Vod hippacen vocant, caseus est equinus. Ea virus redolet. Magnopere alit. Bubuloq; proportionem correspondet. Nec desunt qui hippacen, equinum coagulum appellarint.

De Butyro & eius fuligine. CAP. LXXXI.

c Laete pinguisimo probatum fit butyrum, quale bubulum est. Fit & ex caprino, agitato in vasis laete, donec pingue discedat. Butyrum natura oleosum est & emolliens. Vnde largius epotum, ventrem resoluit. Prodest vbi oleum nō adfuerit, contra venena. Cum melle si infricetur, dentitiones adiuuat. Gingiuarum pruritus, & oris vlcera infantibus emendat. Illitum foris capaciore alimentorum facit corpora. Et ab albidis pustulis per summa scatentibus asserit. Cōtra inflammationes & duricias vuluæ, quod nec virus respicit, nec vetustatem sentit, butyrum efficax est. Dysentericis, & coli exulcerationibus infunditur. In medicamēta addi solet, quæ pus mouent. Vtile præsertim cum nerui, aut cerebri membranæ, vesica, aut ceruix, vulnera accœperit. Id autē purgat. Replet. Carnē creat. Ab aspidē percussis vtilissime imponitur. Recens obsonijs additum olei vicem pensat. & adipis vice fungitur in bellarijs. Colligendæ ex eo fuliginis ratio hæc est. Butyrum in lucernā nouam ingestum accēditur, fistiliq; operculato quod superne in siphunculum definat, & sub pedibus cuniculos clybani modo habeat, crematur, & subinde aliud in assumpti locum sufficitur, dū coaceruetur fuliginis modus, quem facere institueris. Penna post dera datur ad vsus. Eius effectus est in medicamētis oculorum, exiccare & adstringere. Fluxiones cohibet. Et vlcera celeriter ad cicatricem perducit.

De Medicina lanarum. CAP. LXXXII.

f Vccidæ lanæ molles, e collo fœminibusq; laudatissimæ habentur. Subueniunt inter initia vulneribus, percussis, desquamatis, liuidis, ossibus fractis, aceto oleo aut vino imbutæ. Si quidem capaces sunt liquidorum, quibus oblesæ partes fouentur. Et ob pecudum sordem, sic enim œsypum vocant, emolliunt. Capitis, stomachi, aliarumq; partium doloribus, cum aceto & rosaceo efficaciter imponuntur.

De Lanis vltis.

CAP. LXXXIII.

c Rematarum lanarum cinis crustas obducit. Excrescētiās in carne cohibet. Et vlcera ad cicatricem perducit. Mūdæ autem & carptæ in fistili crudo cæterorum more vrūtur. Nec

secus purpurarum tomēta cremari solent. Aliqui cum sordibus lanas carpunt & melle irrigant, eodemq; modo vrunť. Alij in fītili oris paruli, verucula inter se distantia componūt, & conceptas lanas oleo ita suffusas, vt ne stillare quidem possint, assulis tēdā subiectis & eisdem lanisq; permutatim interstratis, leuiter succendunt, & vītas tollunt. Quod si e tēda pix, pinguitudine vlla profluxit, collecta recōditur. Lauatur ad oculorum medicamenta. Cinerem in labellis aqua addita manibus confricant, & cōfidere patiuntur. Idq; sēpius, mutātes aquā donec linguam adstringat, nec mordeat.

De Oesypo pecudum forde. CAP. LXXXIII.

Esypon vocant grāci, succidarum lanarum pinguitudinē.

- o Cuius parandi ratio hāc est. Succidā molles radícula curatē,

calida aqua lauantur, & quibuscunq; sordibus expressis, & in labellum oris ampli coniectis, aqua infunditur, magnoq; impetu cocleari vti respumet agitur, aut lignea rude validiuscule conturbatur, quo largius sordida spuma colligi possit. Deinde marina respergitur. Et confidēte pingui quod supernatabat, collectoq; in fītili vase, denuo aqua in labellum fusa agitur. Spuma mari perfunditur, & demum eximitur. Hoc tantisper neri solet, dū consumpta pinguitudine nihil prorsus spumae extet. Collectū esypū manibus emollitur, & si qua insedit spurcitia, cōfestim demitur. Exclusaq; sensim omni aqua, recentiq; affusa, manibus misceatur, donec admotum linguae esypū, adstringat leuiter, nec mordeat. Atq; pingue candidūq; spectetur. Tū in fītili vase conditur. Verum omnia feruido sole fiant. Nonnulli excolatum pingue frigida aqua eluunt, & manibus non secus atq; cerasum foemine, confricant. Ita enim cādidius redditur. Alij elotis lanis, & sordibus quibuscunq; exemptis, ac lento igni in aeneo vase ex aqua decoctis, pingue quod supernatat collectum, aqua vt diximus lauant, colatumq; in fītilem ollam quā calidam aquam contineat, linteo operiunt, atq; soli mandant, donec candidum fiat, & satis crassum. Alij bi diu spacio aquam effundūt, nouamq; adiiciunt. Melius est laeue, radícula non curatum, quod succidarum virus oleat. Et si manu in concha fricetur cum aqua frigida albescat, nihil in se duri aut concreti habens. Veluti quod cærato aut adipe adulgeratur. Oesypum excalfacit, explet vlcera, & emollit, praesertim sedis ac vuluae, cum meliloto & butyro. In vellere appositum mēses & partus euocat. Vlcerā nō aurium modo sanat, sed & genitalium cum anserino adipe. Cōtra erosos angulos oculorū, scabiososq; genas quae occalluerunt, & ciliorum defluuia, efficacis est. In testa noua torretur, donec redactum in cinerem pinguitudinē amittat. Ex eo etiā fuligo colligitur, vti demonstrauimus. Quae

DE MEDICINALI MATERIA

in oculorum medicamenta commode addi solet.

De Coagulo. CAP. LXXXV.

1 Eporis coagulum tribus obolis ex vino, venenatorum mor-
sibus, cœliacis, dysentericis, & sœminis studio vuluæ labo-
rantibus, ac reiectionibus a pectore, auxiliatur. Sanguinem
concretum discutit. Post menstruas purgationes appositum vuluæ cū
butyro, præstat mulieribus vt concipiant. Potum vero partus enecat.
Et post excretiones, pariēdispem adimit. Equi coagulum quam hip-
penaliqui vocant, priuatim cœliacis dysentericisq; conuenit. Hædi,
agni, hinuli, capræ, apri, cerui, vituli, bubaliqu; coagula similes natu-
ras sortiuntur. Contra aconiti potum in vino, & cōcretum lac in ace-
to, conuenienter assumuntur. Hinuli coagulum triduo a purgationi-
bus admotum, partus spem intercipit. Vituli marini coagulum casto-
rei vires repræsentat. Comitialibus, strangulatis vuluis, potu conser-
re existimatur. Sed syncæri hoc experimentum est. Aqua inspergitur,
qua paulisper cum alterius animantis, tum præcipue agni coagulum,
maduerit. Quod si verū est, statim liquefcit in aquam. Sin minus, cō-
simile permanet. Excipitur autem catulis qui nondum natare possunt.
In summa coagulum omne dissipata cogit, & coacta dissoluit.

De Adipis ratione. CAP. LXXXVI.

a Deps anserinus aut gallinaceus recens & sine sale conditus,
ad vuluæ vitia proficit. Sale inueteratus, & qui tēporis spa-
tio acrimoniam concepit, vuluæ inimicus est. Recens exem-
ptis membranis in fictilem ollam demissus, quæ altero tantopere ca-
paciore sit, quantus sit modus adipis quem curare institueris, obstru-
cto diligenter vase, flagrantissimo soli exponitur. Eliquefcens inde humor
in fictile alterum excolatur, donec adeps omnis absumatur, mox loco
vehementer frigido reconditur. Et ad vsus digeritur. Alij fictile ful-
ciūt super aquam calidam, aut tenuem & elāguidam prunam, quæ so-
lis vicem penfet. Est & alia curandi ratio. Exemptis membranis teri-
tur, coniectusq; in ollam liquatur, adiecto minuti salis momēto. Mox
lineo colo trāsfusus reponitur. Vtiliter in medicamenta additur, quæ
lassitudines & fatigationes leuant. Suillus adeps & vrsinus hoc curā-
tur modo. Recēs, præpinguis, renibus potissimum detractus, in lar-
giore aqua cœlesti & q̄frigidissima, exēptis tunicis, diligētissime ma-
nibus confricatur, & exprimendo ferme ficcatur, subindeq; noua aqua
abluitur. Cæterum fictili capacitatis duplæ inditus, in aquam demergi-
tur. Et subditis leuibus prunis spatha mouetur. Eliquatusq; colo trās-
funditur in aquam. Vbi vero refrixit & guttatim aquam omnem exclu-
sit, in prælotum fictile demittitur. Et infusa aqua leniter eliquari debet,

& manu deprimi, quo facilius sæculentum virus pessum eat. Postea in pilam spongia madefactam transfunditur. Vbi coire cœpit, residens in imo sordes eximitur. Tercio citra aquam eliquatur, repurgatusq; fiftili bene operculato, perq; frigidis locis reponitur. Hircinũ seuum, ouilum, ceruinumq; ita curato. Elotũ ex his quodcunq;, tunicis vt in suilli mentione dictum est exemptis, pilæ emolliẽdum tradito, ac manibus fricato, affusa paulatim aqua, donec ne amplius quidem cruentum virus excernatur, aut pingue aliquod innatet, sed nitida spectetur. Deinde in ollam conijcito, & adiecta aqua vt superemineat, leui pruna liquefacito, atq; in aquam colato. Cumq; refrixerit, iterum in loto fiftili eliquato. Et quæ ante diximus facito. Tercio sine aqua liquefactum, in perfusam liquore pilam colato. Refrigeratumq; vt in suilli ratione diximus, recondito. Bubulum autem seuum renibus maxime detractũ, exemptis membranis, aqua, marina ex alto petita eluendum est. Mox in pilam tundendum diligenter, affusa maris aqua. Cum vero dissolutũ fuerit, in fiftilem ollam conijciẽdum, & marina aqua quæ nõ minus dodrante superemineat, proluẽdum. Decoquendum donec omnis aboleatur odor, additis ad singulas seui articas minas, quaternis tyrrhenicæ cæræ drachmis. Excolatumq;, detractis quæ pessum ierant sordibus, in nouo fiftili reponendum. Opertumq; soli interdiu credendum, vt ad candorem reducatur, & virus euanescat. Priuatim taurorũ pingua sic curari debent. Renibus euulsum pingue profluente amnis aqua abluito, detractisq; tunicis fiftili nouo postq; exiguum sale inasperferis, liquefacito. Dein in nitẽtẽ aquã excolato, & vbi concresecere cœpit, manibus iterum confricando vehementer lauato, aqua sepius infusa refusaq;, donec q̃optime elotum videatur. Rursus in olla cũ pari modo vini odorati decoquito. Et cũ iterũ efferbuerit, dempto ab igni vase, ibidẽ finito pernoctare. Postridie si grauiter adhuc oleat, noua olla repetitum, vino odorato perfundatur. Eadem quæ prius fiant, dum canne virus euanescat. Colliquatur, & sine sale, præsertim affectionum earum causa, quibus sal aduersari solet. Sed ita paratum nõ magnopere albescit. Eodem modo pardorũ ac leonum pingua curari oportet. Taurorum autem & vitulorum pingua, necnon ceruorum medullæ, odoramentis imbuuntur, hac ratione. Pingue quod odoratũ reddi debet, demptis quo diximus modo membranis, elotum & vino q̃odoratissimo nulla maris aqua diluto seruẽfactum, pernoctare finitur. Alterum id genus vinum eadem mensura infunditur, colliquatur, & exquisite colatur. Nouẽq; eius heminis, iunci arabici septẽ drachmæ adijciũtur. Quod si ipsum odoris fragrantioris fieri voles, quadraginta floris eiusdem drachmæ, cum paribus palmæ, calami, & ca.

DE MEDICINALI MATERIA

hæ modis additur. Et xylobalsami, aspalathi singulæ drachmæ, cinna-
momi, cardamomi, & nardi, singulæ vnciæ. Omnia exactius tundun-
tur, & affuso vino odorato, in vase operto quod supra carbones firma-
ter collocatum sit, ter efferuescunt, & semoto ab igni vase inibi perno-
ctant. Postridie vinum effunditur. Aliudq; generis eiusdem adijcitur.
Ter simili modo conferuescat. Matutinis vinum effundatur. Et ablu-
to vase, si quid imo subsidēs hæsit, detergatur. Postremo eliquatū pin-
gue & excolatū, ad vsus recoditur. Hoc autē modo odoramētis imbui-
tur, quod antea curatum est. Verum ante dicta prius inspissari solent,
quo facilius sibi odoramētorum vires adsciscant. Itaq; assumens quod
voles cum vino feruefacito, impositis vna myrti ramulis, serpylo, cya-
pero, item aspalatho plenius tuso. Aliqui tamen pro vsu, vno dumtaxat
horum contenti sunt. Cum autem ter efferbuit, exemptum leniter
& linteo colatū, aromatis vti expōitum est imbuitur. Adipibus spis-
samenta sic fiunt. Syncærus & sanguinis expers adeps, reliqua habēs
quæ sæpe retulimus, in ollam nouā demittitur, infuso vino albo vete-
re odorato, quod semipedis altitudinem superet, lento igni feruescat,
dum vernaculus odor aboleatur, planeq; vinum redoleat. At vbi de-
posito vase refrixit, duæ adipis minæ in ollam mittuntur, & duo vini
eiusdem sextarij, & seminis loti, eius inq; cuius e ligno ludicræ tibiæ fa-
ctantur, tusi minæ quattuor adijciuntur. Lento igni subinde miscēdo
decoquuntur. Cumq; odoris virus euauerit, excolatusq; adeps refri-
xerit, vna contusi aspalathi mina, cū amaracini floris minis quattuor,
& vetere vino subigitur. Nocte vna hæc odorē rapiunt, cōbibunt ve.
Postridie in fictilem ollam tricongialem ea omnia cum adipe iniecta,
additis sextarijs tribus vini, vna feruescūt, quousq; & vim & odorem
spissamentorum adeps ipse contraxerit: qui eliquescens colatur & re-
ponitur. Quod si maiore odoris fragrantiam efflagites, drachmas octo
q; pinguisimæ myrrhæ vino macerata quod multos in annos asserua-
tum est, misceto. Gallinæceus anserinusq; sic odoribus imbui solent.
Cuiusuis eorum percurati sextarij duo fictili olla excipiuntur, erysce-
ptri, xylobalsami, palmæ elatæ, & calami plane contusi singulorum
fiscūcia admiscetur. Vini lesbij veteris cyathus vnus adijcitur. Ea ter
efferuescunt prunis. Mox vase sublato ab igne, die noctuq; refrigeran-
tur. Postridie liquata per linteū mundū in vas excolatur. Vbi vero
adeps coierit, concha excipitur, fictiliq; nouo densius operto perfrigi-
dis locis reponitur. Hyberno tēpore id instituire oportet. Aestate si-
quidem pingua nō cogūtur. Nec desunt qui tyrrhenicæ cæræ momē-
tum adijciant, quo facilius in vnum corpus omnia coalescant. Eadem
ratione suillus adeps & vrsinus cæteri q; id genus, odoramentis imbui-

untur. Verum sanfuci odorē adeps ipse repræsentabit hoc modo. Cuius rati q̄ optimi adipis præsertim taurini mina vna, tempestiuq; sanfuci exquisitè confracti sesquimina miscentur, & insparso largiore vino digeruntur in offas, quæ in vase cooperto nocte quiescunt. Matutinis in fictili olla leuiusculo igni, affusa aqua coquuntur. Dumq; suum adeps odorē exuerit, defæcatus ac bene opertus, nocte tota permanet. Postero die deterfa sorde quæ pessum ierat, sanfuci vt dictum est contrufi iterum sesquimina priori pastillo adijcitur. Eodemq; modo in offas cogitur. Alijs quæ diximus peractis, decoquitur & colatur. Quod si qua fundo hæsit spurcicia deraditur, & frigido loco reconditur. Si quis tamen incuratum adipem anserinum, gallinaceum, aut vitulinum, a putredine tueri velit, ita faciundum est. Quamuis adipem diligenter eloram & ficcata in vmbra super cribrū per lintea mūda manibus vehementer exprimat, linoq; consutam vmbroso in loco suspendat. Et post multos dies noua charta inuolutam, frigido loco recondat. Pingua autem indito melle vindicantur a putredinis vitio. Vis omnium est excalfacere, mollire, odorem ciere. Taurinus adeps, bubulus, & vitulinus aliquātum adstringunt. Earundem virium compos leoninus. Nam resistere eum aiunt ijs qui infidias moliuntur. Ceruino, elephantinoq; perunctos, serpentes fugiunt. Adstringētiore est caprinus. Quæ ex causa decoctus cum pollenta, rhoe & caseo, dysētericis datur, & cū ptisanæ succo infunditur. Ius decocti phthiūcis in sorbitionibus prodest. Datur quoq; vtiliter hijs qui cantharidum venena hauserūt. Hircinus, vt qui validissime discutiat, podagricis auxiliatur cum fimo capræ & croco impositus. Huic proportionē respōdet ouillus. Suillus vero contra vuluæ & sedis vitia idoneus est. Ambustis igni medet̃. E sue vetustissimus quisq; sale conditus excalfacit, & emollit. Elorus vino pleuriticis prodest. Cinere aut calce exceptus, inflammationibus, fistulis, ac tumoribus succurrit. A fininum tradunt, cicatrices corpori concolores reddere. Anserinus gallinaceusq; conueniunt muliebribus malis, & ad labiorum rimas, ad mangonizandam faciem, & contra aurium dolores. Vrsinū cōstat raptos vitio alopecie capillos restituere. Pernionib⁹ subuenire. Vulpinus medetur auriū doloribus. Flumiatiū piscium pingua perunctis ocālis claritatem afferunt, si in sole liquescant, & melli ammisceantur. Viperæ adeps cōtra oculōrum hebetudines suffusionesq; efficax est, addita cedria, melle attico, & pari oleo vetere. Pilos alis euulsos perunctis radicibus obliterat.

De Medullarum ratione. CAP. LXXVIII.

Audatissima est ceruina. Mox vitulina. Post hanc taurina.

I Dein caprina, & ouilla. Colliguntur æstatis exitu, cum appes

DE MEDICINALI MATERIA

tit autumnus. Quippe cum alijs anni temporibus concrementū sanguinis, & veluti caro friabilis in ossibus inueniatur. Nec facile cognosci potest ni quis eam ossibus extrahat & recondat. Omnes medullæ molliunt, sedant, rarefaciunt. Vlcera explent. Ceruina perunctos venena fugiunt. Curantur recentes aquæ resparfu mollitæ, selectisq; ossibus elotæ, donec aqua syncæra emanet, & deterfa sorde pîna, si qua innatet, liquatæ per duplicatū linteam in pillam exprimuntur. Et vbi coiere, omni facie quæ ad ima sedit derafa, fictili nouo reponuntur. q; si libet incuratas reponere, facito omnia quæ de anserum & gallinarum adipe demonstrauimus.

De Felle.

CAP. LXXXVIII.

El omne curatur hoc modo. Recens præligato ore folliculi
f lino, demissum in feruētē aquam, spatio quo quis stadia tria percurfaret, mox exemptum ficcatur vmbroso loco asperginem non redolente. Sed quod ad oculorum medicamenta adijci solet, ligatum lino in vitreum vas quod mel habeat immittitur, circumuolutum ad os vasis lini principio, & operto vase reconditur. Est enim vis omnium acris & exalfaciens. Intensis tamen & remissis viribus differunt. Siquidem præstātius in effectu esse videtur fel marini scorpionis, & piscis qui callionius appellatur, marinæ testudinis, hyenæq;. Item perdicis, aquilæ, gallinæ candidæ, & syluestris capræ. Quod priuatim prodest contra suffusiones incipientes, & oculorum caligines, albuginesq;, & genarū scabrias. Ouillo, suillo, hircino, atq; vrsino, taurinū multo efficacius. Felle omni perfacile præsertim infantibus deiectionem quis molietur, si intinctum eo tomentum sedi subijciat. Priuatim taurino anginae cum melle perunguntur. Sedis vlcera sanat, & ad cicatricem vsq; perducit. Idem auribus fractis, & purulentis, cum muliebri lacte aut caprino instillatum, medetur. Et sibillo earum dē ex porrisucco. Admisceri insuevit vulnerarijs emplastris, & circumlinationibus quæ contra venenata parantur. Phagedænicis vlceribus, colicis & scroti doloribus, ex melle prodest. Lepras, surfures cum nitro & terra cimolia q̄ optime purgat. Ouillum & vrsinum contra eadem pollent. Verum inefficacius hæc præstant. Vrsinū eclegmate comitiales adiuvat. Fel testudinum anginis, & in ore infantium nomis, prodest. Naribus inditum comitiales erigit. Syluestrium caprarum felle peculiari ter peruncti lusciosi sanantur. Hircinum idem obit munus. Thymia abolet. Et luxuriantes elephanticorum extuberationes illitu reprimunt. Suillum autem contra auriū vlcera, reliquaq; omnia, magno vsu assumitur.

f Anguis anseris, agni & hædi, vtilissime in antidota miscetur. Palumbi autem turturis & columbæ, necnon perdicis, oculis cruore suffusis, & recentibus eorum vulneribus, luscio fuscq; illinuntur. Peculiariter columbæ sanguis, cruorem membranæ cerebri erumpentem inhibet. Hirco, capræ, cerui & leporis sanguis parinis inassatus, dysenterias & celiacorum profluuia sistit. In vino potus contra toxica efficax est. Leporinus sanguis ita vt repet illitus, vitia cutis in facie, lētiginēq; emaculat. Caninus commode ab his bibitur quos efferata in rabiem bestia momorderit. Contra epotum toxicū auxilio est. Testudinis terrestris sanguinem epotum tradunt prodesse comitialibus. Marinæ autem testudinis cum vino & leporis coagulo cuminoq; contra serpentium morsus, & hausta rubetæ venena, conuenienter bibitur. Taurinus cū polenta illitus, duricias discutit, emolliq;. Sanguis equarum quæ admissuræ expertæ sunt, in medicamenta additur quæ erodūt, septica vocant. Sanguine chamæleonis genarū palpebras euelli creditum est. Hoc idē viridium ranarū sanguine præstat. Menstruus sanguis fœminarum, circumlito conceptionem inhibere existimatur, aut si omnino mulier mēstrua supergrediatur. Leuat podagras muliebres & ignem sacrum illitus.

a Rmentarij bouis finum si recens admoueatur, vulnerum inflammationes mitigat. Folijs autem inuoluitur, & calfactum cinere feruenti superponitur. Coxendicis cruciatus tali impostu compescit. Illitū ex aceto duricias, panos, & strumas discutit. Priuatim suffitu fimi, quod a masculo boue redditum est, procidētes vuluæ reprimuntur. Accensi nidore culices abiguntur. Fimum caprarum præsertim quæ in montibus errant, potum in vino regium morbum emēdat. Menses cit cum odoramētis haustum. Et partus euocat. Tritum in farinam, & impositum lanis cū thure; fœminarum profluuia sistit. Cæterosq; sanguinis ipetus ex aceto cohibet. Medetur alopecij exustum, & cum aceto mulso illitum. Cum axungia vero impositum, his qui podagra tentantur auxilio est. Caprillum in aceto decoctum imponitur serpētium moribus, vlceribus quæ serpunt, igni sacro, & parotidibus. Vtilem ischiadici vñionem hunc in modum accipiunt. In interstitio pollicis qua parte brachio committitur, caua veluti lacuna subsidet, in qua lana oleo imbuta substernitur, deinde sigillatim feruientes stercoreis caprini pilulæ imponuntur, dum vapor per brachiū ad coxam sentiat peruenire, & coxendicis dolorem mitigare. Adustio id genus arabica appellatur. Fimum pecudum ex aceto illitum sa-

DE MEDICINALI MATERIA

natepinydidas, clauos, pēfiles verrucas, thymos, & ambusta igni ro-
fáceo carato exceptum. Fimum suis syluestris aridum, in aqua aut vi-
no potum, reiectiones sanguinis sistit. Vetusum lateris dolorem mul-
cet. Ad rupta & conuulsa ex aceto bibitur. Luxatis cum carato rosa-
ceo medetur. Tam asinorum q̄ equorum fimum, siue crudū siue crema-
tum addito aceto, sanguinis eruptiones cohibet. Armentarij qui hær-
ba pascitur siccum fimum liquatum in vino, mox potum, contra scor-
pionū ictus magnopere auxiliatur. Columbinum vehemētius exal-
facit & vrit cum hordeacea farina mixtum. Strumas ex aceto discutit.
Carbunculos emarginat, tritum cum lini semine & oleo. Ambustis
igni medetur. Gallinaceum vero omnia eadē, sed inefficacius præstat.
Priuatim tamē contra venena fungorū, & coli cruciatus ex aceto aut
vino bibitur. Ciconiæ fimum si ex aqua hauriatur, comitialibus pro-
desse credunt. Vulturini fimi nidore partus excuti produntur. Muri-
num detritum cum aceto & illitum alopecijs medetur. Cum thure &
mulso calculos expellit. Subditæ infantibz muscerdæ alui deiectio-
nem promouēt. Caninum quod flagrantissimo canis sydere fuerit ex-
ceptum, cum vino aut aqua potum, sistit aluū. Humanum stercus illi-
tum, vulnera inflammationem minantia intumescere nō patitur. Sed
ea statim glutinat. Sicco ex melle angina perungi commodissime tra-
duntur. Terrestris crocodili fimum crocodileam vocant, quæ mulieri-
bus colorem nutrit in facie, nitoremq; seruat. Optima est tenuissima
& friabilis, amyli modo minime ponderosa, in humore statim elique-
scens, quæ cum teritur fermenti acorem quadamtenus refert. Adulte-
rant eam sturnorum fimo, quos captos oryza pascunt. Ipsumq; non
dissimile vāndunt. Alij Amylū aut Cimoliam miscent, & adscito co-
lore per rarum cribrum paulatim exprimunt, vt se cōtrahat in vermi-
culorum speciem. Qui siccati pro crocodilea vaneūt. Inter omnes cō-
uenire inuenio humanum stercus caninumq; gutturi impositum, an-
ginis auxiliari.

De Vrina.

CAP. XCI.

Vmanam vrinam suam cuiq; bibere, contra viperæ morsus
h ac venena, incipientemq; aquam intercutem proderit. Mari-
ni scorpionis, viperæ, dīaconisq; morsus ea cōuenientissime
fouētur. Canina ad perfundēdos canis morsus idonea est. Pruritus &
lepras nitro addito expurgat. Sed vetus vlcera capitis manātia, fur-
fures, psoras, & feruidas eruptiones, multo magis abstergit. Nomas &
præcipue genitaliū cohibet. Auribus infusa manans pus supprimit.
Decoq; in calice mali punici, earum vermiculos abigit. Pueri im-
pubis resorbt vrina, orthopnoicis auxiliatur. Decoq; in æreo vase

cum melle emendat cicatrices, argema, caliginēq;. Ex ea & cupro idoneum auri ferrumen conficiunt. Lutum quod in vrina subfidit, illitum ignem sacrū mitigat. Feruefactum cū cyprino, inditumq;, vuluæ dolores mulcet. Strāgulatus leuat. Genas deterget. Oculorū cicatrices expurgat. Taurina si cum myrrha instilletur, aurīū dolores lenit. Apri-
na viribus eisdem prædita est. Priuatim comminuit vesicæ calculos, & potu expellit. Ad aquam quæ cutem subiit, cum nardi spica cotidie binis cyathis cum aqua bibitur, vrinamq; per aluum extrahit. Aurium doloribus instillata medetur. A finina traditur renum vitijs mederi. Lyncis vrinam quam lyncurium appellant, simulac excernitur, glaciari coire ve in calculi duriciam, vulgo creditum est. Quare quod de ea proditum est, vanum esse conuincitur. Est enim quod a nonnullis vocatur succinum pterygophoron. Id potum ex aqua stomacho aluoq; fluctione laboranti conuenit. A fininæ vrinæ potu renum vitia sanari traduntur.

De Melle.

CAP.

XCII.

Rincipem locum obrinet mel, quod atticæ regionis est, præcipue ex hymeto, mox cycladibus insulis, & e sicilia cognomine simblion. Maxime probatur dulcius & acre, odoratū, sufflauum, nec humectum, graue, & minime fluxum, quod ob sequacem lenticiam non facile abrumpitur, tractumq; resilit in digitos. Mel abstergēdi vim habet. Ora venarum apperit. Humores euocat. Quæ ratione in sordida vlcera sinusq;, commodissime infunditur. Decoctū atq; impositum abscedētem carnem glutinat. Medetur impetigini coctum cum liquido alumine & illitum. Item aurium sonitui & dolori cum fossili sale tepido instillatum. Lendes & sæda capitis animalia illitum necat. Nudam glandem recutitis operit, præsertim quæ circūscissione aperta non est, si melle coles a balineo triginta diebus emolliat. Oculorum caliginem discutit. Faucibus, tonsillis, anginae illitum gargarisatū ve medetur. Vrinam ciet. Auxiliatur tussi, & a serpente percussis. Contra haustum meconium, cum rosaceo calidum assumitur. Aduersus venena fungorum, & rabiosi canis morsus linctum aut potum proficit. Crudum tamen aluum inflat. Tussim lacescit. Et ea de re despumati vsus aptior est. Primatū tenet in mellis genere vernum, deinde æstiuum. Hybernum vero utpote quod crassius consistet, deterimum reputatur. Siccas eruptiones excitat. Quod in Sardonia gignitur mel, amarū est. Quoniā apes inibi absinthio vescantur, quo vitia cutis in facie & maculæ aptissime perunguntur. Heraclia in pōto quibusdam anni tēporibus, propria quorūdam florū dote, mel conflat, quod qui edere, mente ab alienantur, ac sudore diffluunt. Remedio sunt

DE MEDICINALI MATERIA

estata ruta, & balsamēta, aut e potū multum, resūpta quoties vomitio-
ne reijciūtur. Acre autē est. Et olfa & u sternutamēta mouet. Quod cū
costo illitū fœminarū cutē emēdat, & cū sale sugillationes rapit. Est et
aliud cōcreti mellis genus, quod saccharon nominatur. In India vero
& fœlici Arabia in arūdīnibus iueniē. Salis modo coactū est, dēribus
vt sal fragile. Aluo idoneū, & stomacho vtile. Si aqua dilutū bibatur,
vexatā vesicā, renibusq; auxiliat. Illitū ea discutit, quæ tenebras oculo-
lorū pupillis offundūt.

De Cera, CAP. XCIII.

Aera optima est subfulua, odorata, suppiguis, pura, odorifq;
c quadātenus mellei, natione pontica, aut cretica. Secūdū locū
obtinēt cādida, & suapte natura pinguis. Cādida fit hoc mo-
do. Ex ea radunt album syncerūq; atq; transtundunt in vas, quod sa-
tis habeat marinæ ex alto petitiæ, insparsoq; nitri momēto, decoquunt.
Cūq; iterū tertiove inferbuit, separatū vas refrigerant, ac cæræ pastila
lum exinūt, deterfa sorde, siqua forte adhæsit. Tū denuo indita noua
maris aqua feruet, vti retulimus. & vase dēpto ex igne, basin ollulæ no-
uæ aqua frigida madefactā, in cærā summā suspēsa manu intingūt, quo
celerius cōcrescat, & q̄ minima portio extrahatur. Suscepto primo cæ-
ræ orbiculo, iterū vas inum aqua refrigeratū, tantisper immitti debet,
dū tota excipiat. Orbiculi lino cōfuti, ita vt intercedat spatiū, suspen-
dūtur. Et interdū, cōtinuo sub sole, noctu sub luna aspergūtur, vsq; dū
perfecte albescant. Verū si eximius ille candor desyderetur, eadē factita-
ri, & identidē recoqui, operæ precii est. Nec desunt qui pro marina, in
muria q̄acerrima, semel aut iterū excoquant. Dein languncula, tenui,
rotunda, ansam habente, extrahunt. Postea orbiculos, substrato celsi-
te hærbofo insolāt, donec candorē summū cōtraxerit. Præcipiūt hoc
obeūdū munus vere, cū sol remissa vehemētia humorē pariat, vt nō fa-
cile liquetur. Cera omnis mollit, calfacit, modice explet corpora. Da-
tur in sorbitione dysentericis. Ac milij magnitudine decē grana cæræ
hausta, lac in laetantibus non patiuntur coagulari.

De Propoli.

CAP. XCIIII.

Ropolis eligi debet flaua, odorata, styracē referēs, in vehemē-
ti ariditate mollis, & mastiches more ductilis. Magnopere
calfacit & euocat. A culeos & omnia infixa corpori extrahit.
In veterē tussī suffita proficit. Impetigines admota tollit. Ea i alueariū
foribus, cærosæ naturæ iueniē.

De Tritico.

CAP. XCV.

Prima tritici generibus ad secūdā valitudinis vsus habent,
o quæ recētia & iā perfecte adulta, colorē mali referūt. Dein se-
quūtur trimestria, quæ nōnullis Sitania nominant. Itaq; cruda i cibis

teretes tineas gignūt. Canū morib⁹ profūt māsa & iposita. Cōfectus eorū similagine panis, plus alit q̄ cibarius. E trimestriū farina panis leuiorē cibū præbet, & qui facile in mēbra demādet. Farina eorū cū hyoscyami succo illiniē aduersus neruorū fluxiones, quas Græci rheumatismos vocant. Irē cōtra interaneorū inflationes. Lentigines ex aceto mulso tollit. Furfures autem in acri aceto decocti, turgētes māmas sedant. Viperarum idibus auxiliantur. Et torminosis profunt. Farina cū fermetum calfaciendi extrahendiq; vim habet. Priuatim callos pedum, clauosq; extenuat. Cætera tubercula furunculosq; ex sale concoquit, & aperit. Sitaniorum farina, contra venenatos ictus cū aceto aut vino cōmodissime illinitur. Eadem si decocta in glutini modum delingatur, cruētis excreationibus proderit. Contra tussim & exasperatas fauces, cum menta & butyro decocta efficax est. Tritici pollen si ex aqua mulsa, aut hydræleo decoquat, omnē discutit inflāmationē. Panis & crudus & coctus inflāmationes omneis illitu mulcet, cū emolliat & quadamtenus refrigeret. Sed hærbis succisve huic rei accōmodatis ammisceatur. Vetus panis aridus, adiectis cōueniētibus, citā aluū cohibet. Recēs muria maceratus illitu, vetustas impetigines sanat. Glutinū ex similagine & polline, quo chartæ glutinātur, sanguinē excreātibus prodest, si liquidius ac tepidū cochlearis mensura detur forbandum.

De Hordeo.

CAP. XCVI.

Ordeū optimū est candidū purūq;. Id minus q̄ triticū alit. h Prisana tamen ob cremorē in decoctione redditū, plus alimēti præbet q̄ pollenta ex hordeofacta. Cōtra acrimonias atq; fauciu scabrias, exulcerationesq; pollet. Quibus etiā triticea prisana præsidio est. Sed plus alit magisq; vrinam mouet. Lac abunde supeditat, si cum fœniculi semine decocta sorbeatur. Hordeū abstergit. Vrinā ciet. Inflationē parit. Stomacho aduersatur. Tumores concoquit. Farina hordeacea decoquitur in mulsa aqua cū fico, vt inflammationes collectionesq; discutiat. Duricias cū Rhina & fimo columbarū cōcoquit. Cū meliloto autē et papaueris calyce dolores finit, qui latus excruciat. Aduersus intestinorū inflationes cū lini semine, fœnogræco, & ruta, illini iuuat. Strumas cū pice liquida, cera, oleo, & impubis pueri vrina, ad cōcoctionē perducit. Et cū myrto, vino, malicorio, syluestribus pyris, & rubo, alui profluvia sistit. Podagricis inflāmationibus, cū cotoneis aut aceto prodest. Decocta in acri aceto, modo quo hordeaceū cataplasma, & calida imposita, lepris medetur. Liguata eadem cū aqua, atq; cum pice decocta, pus excitat. Cum aceto liguata interdum contra articulorum fluxiones prodest. Farina ex his aluum cohibet, inflammationesq; mitigat.

base.

CAP.

XCVII.

21/10/19

Concord

CAP.

XCVIII.

f

Буде ли ^{гла.}
ако ли

CAP.

XCIX.

2

De Craffiore farina. CAP. C.

CAP. C.

C

CAP.

CI.

c

CAP.

CII.

a

De Trago.

CAP.

CIII.

C

De Bromo. CAP. CIII.

CIII.

b

De Oryza. CAP. CV.

CAP.

CV

o

De Halica

CAP.

CLVI.

halica similis est
pith. f. m. p. a.
duobus apud a.
orig. m. d.

Alica fit ex zea, quam dteoccon appellauimus. Plus alit q̄
oryza. Alium magis cohibet. Stomacho longe utilior. De

cocta in aceto illitaq; lepras tollit. Vnguium scabrias extricat. Incipientibus ægylopijs medetur. Decoctum dysentericis quos excruciat dolor, infusum idoneum est.

De Milio.

CAP. CVII.

m Ilum in panes coactum, minus cæteris frugibus alit. Silit pulte sua aluum. Vrinam cit. Torretur milium; feruensq; in sacco ponitur, vt torminibus, reliquisq; doloribus, auxilio sit.

De Panico.

CAP. CVIII.

p Anicum frumentaceis seminibus annumeratur, milio simile. Eodemq; modo in panes subigitur. Eisdem habet vsus. Minus tamen & nutrit & stringit.

De Sesama.

CAP. CIX.

f Sesama stomacho inutilis cibus. Halitus grauitatē facit, quoties inter mandendū, commissuris dentium inhæsit. Nervorum crassitiē illitu discutit. Medetur auribus fractis, ambustis, inflammationibus, coli doloribus, & cerastæ moribus. Capitis dolores qui æstuatione concitantur, ex rosaceo lenit. Eadē efficit hæba decocta in vino. Præsertim inflammationibus oculorum, doloribusq; prodest. Ex ea fit oleum quo ægyptij vtuntur.

De Lolio.

CAP. CX.

l Olum quod inter segetes nascitur, molitum, illitu nomas, vetera vlcera, gangrænaq; emarginat. Sanat cum raphanis, sale & aceto, feros lichenas. Et ex aceto & sulphure viuo, lepras. Strumas quoq; discutit, cum fimo columbino & lini semine decoctum in vino. Abscessus etiam rumpit, qui ægrius ad coctionem perducuntur. Decoctum ex aqua mulla vtilissime ischiadicis illinitur. Si cum polenta, thure, myrrha, aut croco suffiatur, conceptionem adiuuat.

De Amylo.

CAP. CXI.

a Mylum ex eo appellatum est q; sine mola fiat. Optimum ex trimestri, natione creticum aut ægyptium. Ratio faciendi amyli hæc est. Purgatum trimestre triticum madescit quinque dies in die, & si fieri potest nocte. Cum emollitum fuerit, effunditur sensim sine agitatione aqua, quo minus cremoris dulcedo vna excludatur. Vbi mollissimum esse videtur, mutata aqua pedibus calcari oportet. Rursus infusa, teri. Tum demum enatantes ibi fursures incerniculo eximedi. Reliquūq; quallo sportisq; siccatur tegulis nouis coctum torreatur fragrantissimo in sole. Nāq; si paulisper vdu maneat, acorē concipit. Cōtra fluxiones oculorū, pustulas, cauaq; efficax est.

DE MEDICINALI MATERIA

Sanguinis reiectiones potu cōhibet. Exasperatas fauces lenit. Laetū atq; obsonijs amimiscetur. Fit etiam amyllum ex zea, quæ maceratur, ac eluitur vno aut altero die, & farinæ modo manibus subigitur. Prefa q; feruentissimo in sole, vt ante retulimus, exiccatur. Nullius in medicina vsus. Ad alia tamen conueniens.

De Fœni græci farina. CAP. CXII.

8. Ræci Telin, alij Carpon, alij Buceras, alij Aegoceras. Latini fœnum græcū appellant, Aegyptij itasin. Vis farinæ est mollire, dissipare. In aqua mulla decocta aduersus tam internas, quam externas inflammationes, efficaciter illinitur. Lienem cum aceto & nitro trita extenuat. Succus decocti eius fœminarum malis subuenit, & siue tumor, siue præclusio sit vuluæ, fouentur, & insident. Decocti cremor, capillos, furfures, & manantia capitis vlcera purgat. Locos laxat & emollit, si cum anserino adipe pessi vice subijciatur. Viride cum aceto vtilissimum imbecillis partibus, & vlcera sentientibus. Decoctum eius prodest aduersus tenesmos fœtidamq; dysentericorum proluuiem. Oleum quod ex eo exprimitur, ex myrto, capillos et genitalium cicatrices absterget.

De Lino. CAP. CXIII.

1. Inum aliqui linocalamin vocant, alij annon, alij linon agrion, Romani linum, Pœni zeraphoes. Vulgo notum est. Cuius semen easdem quas fœnum græcum vires habet. Discutit & emollit omnem intus forisq; inflammationem, cum melle, oleo, exiguaq; aqua decoctum, aut melle cocto exceptum. Vitia cutis in facie varosq; crudum tollit. Illitum cum nitro & ficulneo cinere, paronidas duriciasq; discutit. Vlcerata quæ serpunt, sauosq; cum vino decoctum expurgat. Vngues scabros eximit, cum pari modo nasturcij & mellis. Vitia pectoris extrahit, si ex melle ista eclegmatidis vicem substituatur. Tussim lenit. Venerem stimulat, si farina piperis & melle exceptum, pro placenta largius adsumatur. Huius decoctum interaneorum vuluæq; erosionibus immittitur. Alui excrementa euocat. Ad vuluæ inflammationes in defensionibus perquam vtile.

De Cicere. CAP. CXIII.

c. Icer satium aluo idoneum est. Vrinam ciet. Inflationē parit. Colorem commendat. Menses ac partus expellit. Lac auget. Cum ruo decoctum illinitur ad inflammationes testis

um, verrucosās informicationes, ad scabiem, vlcera capitis manantia, impetiginesq;. Contra carcinomata, & vlcera quæ cacoethe vocantur, cum melle & hordeo prodest. Alterum genus arietinum nominatur. Vtrumq; cit vrinas, dato cum rore marino, hydropicis aut regio morbo laborantibus eorum decocto. Lædunt ea exulceratam vesicam & renes. In verrucarum formicantium pensiliumq; genere, prima luna singulis granis singulas tangunt, eaq; grana lintheolo deligata abijci post se præcipiunt. Ita decidere eas arbitrantur. Sylvestre cicer, folijs satiuo simile est, odore acris. Sed semine discrepat. Idē quod satium præstat.

De Faba.

CAP.

CXV.

f Aba inflationē excitat. Aegre cōcoquitur. Tumultuosa somnia facit. Tussi cōfert. Carnem gignit, media calidi frigidiq; natura. Decocta in posca, & cum suo cortice esitata, dysenterias & celiacorum profluvia fistit. Contra vomitiones conuenienter manditur. Inflatio leuior contrahitur, si aqua prior inter coquendum abijciatur. Viridis plus negocij stomacho exhibet, maioremq; flatum parit. Lomentū eius & per se, & cū polēta illitū, inflammationes quas vulnus excitauit, mitigat. Cicatrices concolores facit. Turgentes prædurasq; mammas, etiam si inflammatione tētentur, adiuvat. Lac restinguat. Furunculos, sugillata, parotidasq;, cum sœnigræci farina & melle discutit. Cum rosa autem, thure & oui candido, procidētes oculos, tumores, vusq;, reprimat. Subactū vino, suffusos idu oculos recreat. Manducata sine cortice faba, ad auertēdas fluctiones, fronti illinitur. Decocta in vino testium collectiones sanat. Quo tardius pubes erumpat, pueris imo ventri illinitur. Vitiliginem purgat. Fabarum cortice illiti capilli, qui post euulsionem renascūtur, gracilescūt, & minus alimenti capeſcunt. Cum polenta scisso alumine & vetere oleo impositi cortices, strumas discutunt. Decocto earum lanæ inficiūtur. Faba dempto cortice in illas parteis diuisa, in quas suapte natura scinditur, imponi solet sanguinis defluentionibus ab hirudine concitatis. Namq; eas supprimit, si semisecta apprimatur.

De Faba ægyptia.

CAP.

CXVI.

a Egyptia faba, quam aliqui ponticam vocant, in ægypto plerumq; prouenit. In Asiæ etiā Siciliaeqlacubus, iuenitur. Folia habet ampla, etiam si ad arborum frondes comparentur, caulem cubitalem, digiti crassitudine, florem roseum, dupla papaueris apitudine. Et vbi flore exuitur, fert folliculos oculis firmes, in quibus faba supra operculū bullæ modo prominet. Cibotio ideo nominant, id est arculam, quoniam seratur ipsa, humenti glebæ mandata, &

DE MEDICINALI MATERIA

ita in aquam demissa. Radice firmatur harundine crassiore, quæ cruda coctave estur. Ei collocasie nomē est. Faba virens manditur, & excicata nigrescit. Græcam magnitudine superat. Adstringendi facultatem obtinet, & stomacho vtilem. Dysentericis celiacisq; prodest, insparso polentæ vici lomento. Datur quoq; in pulste. Cortices in vino mulso decocti, si terniq; inde cyathi bibantur, magis proficiunt. Facit ad aurium dolorem, quod in earum medio viride spectatur, gustu amarum, si tritum & cum rosaceo coctum instilletur.

De Lente.

CAP. CXVII.

Ens suo cibo aciem oculorū obtundit. Aegre concoquitur.
I Stomachū male habet. Eūq; & intestina inflat. Sed aluū cū cortice cocta sistit. Præstat in cibo, quæ facillime coquitur,

nihil atri in maceratione reddens. Vim habet adstringendi. Quæ ex causa aluū cohibet, si detracto antea cortice discoquatur accurate, priusq; aqua inter coquendū effundatur. Quippe primū id decoctū ventrem resoluit. Somnia tumultuosa excitat. Capiti, nervis, ac pulmōni inutilis. Melius suo fungetur munere cōtra alui fluxiones, addito cū aceto intybo, aut portulaca, aut beta nigra, aut baccis myrti, aut putamine punici, aut aridis rosis, aut mēspilis, sorbisve, pyris thebanis, aut malis cotoneis, aut cichorio, aut plātagine, aut gallis itegris, quæ post decoctionem abijciuntur, vel vuarum rhois quæ obsonijs insparguntur. Verum acetum cum eo diligenter percoqui debet, alias aluum conturbat. Contra subuersionem stomachi, triginta grana lētis delibrata deuorari proderit. Decocta cum polēta & illita podagras lenit. Sinus cum melle glutinat. Crustas rumpit. Vlcera purgat. Decocta in aceto duricias & strumas discutit. Cum cotoneo aut meliloto medetur inflammationibus oculorum, sedisq; addito rosaceo. Sed in amplo sinu aut inflammationibus sedis, quæ maius remedium exigūt, cum putamine punici ac ficcis rosis, adiecto melle decoquitur. Nomis quæ in gangranam euaserunt, cū dā maris aqua, pustulis, & his quæ serpūt, igni sacro, pernionibusq; vt antea dictum est. Contra, turgentes māsas & vsq; eo duras vt quamdam cartilaginis speciem referant, cocta in aqua maris & illita auxiliatur.

De Phasiolē.

CAP. CXVIII.

Phasiolē inflant. Spiritus ciēt. Aegre coquuntur. Virides cibo aluum emolliunt, ad vomitiones idonei.

De Eruo.

CAP. CXIX.

Ruū paruus frutex omnibus cognitus, angusto folio, tenuis, semina in valvulis habēs, e quibus farina fit nomine eruina, ad multos medēdi vsus conueniens. Eruium capiti onerosum

est. Aluum esu turbat. Sanguinem per vrinam extrahit. Elixo boues fa-
ginantur. Parandæ farinæ ratio hæc est. Vberiora grana cādidāq; dea-
liguntur, permiscendoq; aqua resperguntur, donec sufficienter combi-
bant. Postea torrentur, vīq; dū hians cortex disrumpatur. Molitaq;
farinario cribro incernuntur. Postremo farina reconditur. Hæc aluo
utilis est. Vrinam ciet. Meliorem colorem efficit. Sāguinem per vesi-
cam aut aluū cū torminibus elicit, si largius in cibo aut potu assuma-
tur. Vlcera cum melle purgat. Lentigines & vitia cutis in facie, & ma-
culas, totumq; corpus emēdat. Nomas, gangrænas, duriciasq; serpe-
re non patitur. Mammarum duricias emollit. Atra vlcera quæ therio-
mata vocant, fauosq; emarginat. Carbunculos rumpit. Cum vino illi-
tum moribus viperarum, canum, hominumq; medetur. Vrinæ diffi-
cultates, tenesmosq; ex aceto mitigat. Tabidis, qui alimentum non sen-
riunt, tostum, & in nucis magnitudinem melle collectum, conuenit.
Eius decoctum perniones, & pruritus in toto corpore, sanat fouens
do.

De Lupinis

CAP.

CXX.

Atius lupinus notus est. Cuius farina cum melle delinctu.

f aut potu, vētris animalia expellit. Ipsi quoq; macerari, & cū
sua amaritudine esitari eadē efficiunt. Decoctū eorū idē mu-
nus præstat, cū ruta & pipere potū. Quare lienosis prodest. Eodē vlc-
cera tetra quæ theriomata vocant, gangrænas, incipientē scabiē, eru-
ptiones pustularū, vlcera in capite manātia, vitiligines, maculasq; fo-
uere vtilissimū. Menses & partus extrahit, cū myrrha & melle subdi-
rum in vellere. Eorum farina cutem liuoresq; corrigit. Inflammatio-
nes cū polenta & aqua mitigat. Tubercula, & coxendicū cruciatus, ex
aceto lenit. Strumas in aceto cocta illitaq; dissipat. Carbunculos rum-
pit. Decocti cœlesti aqua, donec in liquamenti crassiciem redigantur,
faciē abstergunt. Medentur pecorum scabiei, cum radice nigri cha-
mæleontis, ita vt tepēte decocto abluantur. Cir vrinam radix cū aqua
cocta, Lupini triti, vbi maceratu dulcescere cœperit, cū aceto poti, fasti-
dium detrahunt, & cibi auiditatē faciūt. Gignuntur & syluestres lupi-
ni satiuus similes, sed omnino minores, qui eadem quæ satiuus possunt.

De Rapo.

CAP.

CXXI.

Ecocta rapi radix alit. Inflationem parit. Mollesq; spongio

d fasq; carnes creat. Venerem stimulat. Decocto podagræ, per-
nionesq; fouentur. Contritoq; rapo atq; imposito iuuantur.
Si excauatæ radici rosaceum cæratum adigatur, & feruenti cinere eli-
quescat, exulceratis, pernionibus proficiet. Asparagii eius decocti esu,

DE MEDICINALI MATERIA

vrinam ciunt. Semen antidotis & theriacis, præsertim quæ sensum doloris auferunt, anodyna vocant, idoneum est. Potum contra venena salutare est. Venerem concitat. Muria conditum, minus alimenti sufficit. Sed multo magis appetentiam recreat. Sylvestre rapū in aruis nascitur, fruticosum, in cubiti altitudinē assurgēs, ramosum, læue. In cacumine folia fert læuia, digitali latitudine, aut maiora, & fructū in filiquis calycularis. Cumq; pulpæ aperiūtur, alia intus filiqua spectatur, quæ quandā capitis speciem præbet. In qua semina paruula concipiuntur, foris nigra, intus alba. Additur in medicamenta quibus ad detergendam cutem in facie, totoq; corpore, vtimur, præsertim quæ ex lupini aut erui, tritici aut lolij farina, fieri solent.

De Buniadenapo. CAP. XXII.

numcul
c Osta buniadis napi radix inflat. Modicum alit. Semen eius potum venenorū vires hebetat. Antidotis ammiscetur. Conditur sale radix.

De Radice. CAP. CXXIII.

118
r Aphanus latine radix dicitur. Excalfacit. Flatus gignit. Ori suavis est. Sed stomacho aduersatur. Ruētus ciēt. Vrinā pellit. Aluo aptior. Summo tamen cibo sumi debet, quo magis eius distributionem adiuuet. Cum autem præsumitur, cibum subleuat. Quare vomituris cōmodissime datur, ante cibum. Sensuum aciem excitat. Decocta contra veterem tussim, & pituitæ crassitiem in pectore, efficax est. Cortex ex aceto mulso, celerius vomitiones mouet. Hydropicis commodissime illinitur. Lienosis utilis. Sugillata cum melle tollit. Contra viperarum iētus auxiliatur. Alopecias ad pilum reducit. Lentigines cum loliacea farina emendat. His qui fungis strangulantur, tam cibo q̄ potu salutaris est. Semē vomitiones facit. Vrinam mouet. Menfes ciēt. Lienem extenuat. Cum aceto potū gangranas validissime emerginat. Coctum cum aceto mulso, anginis perq̄ vtiliter gargarizatur. Cōtra certis morfus, potum ex vino auxiliō est. Sylvestris raphanus quam Romani Armoraciam vocāt, alij montanum raphanum, alij apium, alij iscada, alij chamæbalanum, Romani etiam radicem sylvestrē, ramulos tenues iunceos duos siue tres spargit, rubentes, folijs rutæ, sylvestris, oblongioribus, & angustioribus, semine paruo, radice albuci, rotundiore, turbinatiore pyri figura, candido cortice. Ea lacteo succo madet. Pars radice superior vomitione. bilē pituitamq; extrahit, inferior per aluum. Tota susq; deq; purgationes mouet. Quod si tibi in animo est succū extrahere, radix tuā in fistili mergitur, & qui supernatat succus pinna eximitur. Is sesquiobolo potus, vtraq; parte purgat.

LIBER SECVNDVS

46

De Syluestri raphano. CAP. CXXIIII.

f Syluestris raphani quam Romani Armoraciam vocant, folia satiuo similia, & quadamtenus lampfanam imitantur. Radix gracilis, tenera, subacris. Tam folium quā radix in olera recipitur, Excalfacit. Vrinam concitat, æstuosus.

De Sisaro. CAP. CXXV.

f Isarum vulgo cognitum, Cuius radix decocta ori grata est, & stomacho utilis. Vrinam ciet. Et appetentiam inuitat.

De Lapatho et rumice CAP. CXXVI.

e X generibus lapathi, oxylapathum vocant quod in acutum tendit, prædura habens extrema, non nisi in palustribus nascens. Aliud est satiuum, illi dissimile. Tertium syluestre, paruum, plantagini proximum, humile & tenerum. Quartum genus est quod alij oxalida, alij anaxyrida, aut lapathon vocant, syluestri ac exiguorum rumici simile, caule non magno, semine subacuto, rubente, acri, in caule, & agnatis appendicibus, emicante. Omnium decocto olere alius emollitur. Crudi illitu, melicerides temporis tractu discutiuntur. Syluestris & oxilapathi, & eius quā oxalida nomināt, semen ex aqua aut vino utiliter bibitur, contra dysenterias, & celiacorum affectus, stomachi fastidia, scorpionum ictus. Quod si quis in potu præsumat, nihil molesti ex ictu patietur. Radices ex aceto coctæ, aut illitæ crudæ, lepras, impetigines, & scabrosos vngues periciant. Sed antea locus aceto & nitro in sole perfricandus est. Pruritus corporis, decoctum earū ledat, si foueatur, aut in solijs balnearum cōfricetur. Coctæ in vino & instillatæ, aurium dentiumque dolorem mulcent. Strumas parotidasque discutiunt. Lienem cum aceto extenuant. Aliqui amoliendis strumis radicum gestamine vtuntur, eas collo appendentes. Tritæ & inditæ foeminarum profluvia sistūt. Cum vino autem potæ, regio morbo medentur. Calculos vesicæ cōminuunt. Menses cient. Scorpionum ictibus auxiliantur.

De Lampfana. CAP. CXXVII

1 Ampfana quod Romani napiū vocant, syluestre olus est. Plus alit quā rumex, et stomacho utilius. Cuius folia caulesque coquuntur in cibo.

De Hyppolapatho. CAP. CXXVIII.

h yppolapathon olus est magnum, in paludibus nascens. Eadem habet vires quas supradicta rumicis genera.

De Bunio napi genere. CAP. CXXIX.

b Vnion aliqui adiuam vocant, alij Anemosphoron, magi paradachry, Aegyptij erxonē, Romani Scopā regiam, Aphri

DE MEDICINALI MATERIA

zigar, aut templo. Caulē emittit quadrangulū & in eo foliosos ramulos, tenues, prætenuibus foliolis & flosculis scatentes, longitudine digitali, folia propter radicē, apio similia, sed multo tenuiora, & quæ modo quodam folia tribuli imitentur. Flores anethi, semen odoratum, minus Hyoscyamo. Excalfacit bunion. Vrinam ciet. Secundas detrahīt. Lienī, renibus, & vesicæ vtile. Eo humenti aridove vtuntur, exempto radice & caulibus succo, ex aqua mullā.

De Blitto. CAP. CXXX.

Litton ægyptij echlotoripam appellāt, alij riplam. Romani blitū, Daci bles. Olus est aluo vtile, nullius in medicina momenti.

De Malua. CAP. CXXXI.

Aluam hortēsiā pythagoras Antema vocauit, zoroastres diadema, ægyptij cochortem, magi lienem capræ, aut muris vrinam. Satiua esui longe aprior syluestri. Stomacho aduersatur. Aluum iuuat, sed multo magis caules. Interaneis & vesicæ vtilis. Cruda folia cum salis exiguo māducata, ægylosas ex melle sanāt. Verum cum cicatricē trahere cœperint, ea demum citra salem vtēdum est. Contra aculeatos apium vesparrumq; ictus, illita efficax est. Ea demum cum oleo trita peruncti, non feriuntur. Vlcera manantia in capite, furefque cum vrina sanat. Sacris ignibus & ambustis decocta folia, triaqtq; vtilissimē ex oleo imponūtur. Eius decoctum vuluas in sessione mollit. Prodest erosionibus vesicæ, & intestinorū, vuluæ, sedisq; clystere infusum. Ius decoctæ cum radice sua contra omnia venena auxiliatur, si continuo a bibentibus reuomatur. Contra phalāgiorum morbus remedio est. Lac euocat. Semen in vino potum, addito loti syluestris semine, vesicæ cruciatus lenit.

De Attriplice. CAP. CXXXII.

Traphaxin aliqui Chrysolachanon vocant, Romani attriplicem, Aegyptij Ochi. Cognitum olus est. Duo eius genera. Syluestre & satium. Coctum estur vt olus. Aluū molit. Panos discutit, siue crudum siue coctum illinatur. Semen cum aqua mullā potum, regium morbum sanat.

De Brassica. CAP. CXXXIII.

Ramben Romani brassicā vocant, Ea aluo est idonea, si modoleuiter seruata edatur. Nam percocta aluum fistit. Sed multo magis bis cocta, aut quæ in lixiuio coquitur. Stomachum autem male habet. Acrior est æstiuā. In ægypto propter amaritudinem non estur. Cæcutientibus, & tremulis esse prodest. Summo cibo sumpta crapulam discutit, & vini noxam restinguit. Melior stoma-

macho cyma, sed acrior, & ad ciendum vrinam validior. Ea condita stomacho inimica est. Aluum conturbat. Crudus succus cum nitro & iri deuoratus, aluum emollit. Cum vino quoq; epotus viperarum moribus auxiliatur. Cum scæno græci farina, podagris & articulorum vijs illinitur. Prodest & fordidis vlceribus, & vetustis, illitus. Caput purgat naribus infusus. Menses extrahit cum loliacea farina inditus. Folia per sese aut cum polenta trita, conferunt inflammationibus, tumoribusq;. Epinyctidas, ignem sacrum, leprasq; sanant. Carbunculos ex sale rumpunt. Fluentes capillos retinent. Cocta addito melle aduersus depascentia vlcera, gangrænasq; valent. Lienosisq;, ex aceto cruda profunt. Mansa deuorato succo, retusam vocem instaurant. Decoctū eius potu, aluum & menses ciet. Flos post conceptionem in pello subditus, partus spem adimit. Semen eius præsertim, quæ in ægypto nascitur, potum tineas repellit. In antidota celiacorum additur. Faciei cutem lentiginisq; expurgat. Virentes cauliculi cum radice cremati, & adipe porci vetusto excepti, diuturnos laterum dolores mitigant.

De Syluestri brassica, CAP. CXXXIII.

fyluestris brassica, quam Romani rusticam appellant, maritimis præruptisq; locis, magna ex parte gignitur. Satiuæ similis, sed candidior, hispidiorq;, amara. Cuius cyma in lixiuio cocta, ori non insuauis. Folia illitu vulnera cōglutinant. Et inflammationes tumoresq; discutiant.

Ee Brassica marina. CAP. CXXXV.

mArina brassica a satiuâ prorsus abhorret, q; folia ferat rotundæ Aristolochiæ, prælonga, tenuia. Singula a ramulis rubentibus exeunt, singulari vt hædera stillo. Habet lacteum succum, sed paucum, salso gustu, & aliquantum amaro, pingui compage. Hæra in totum stomacho inimica, acris. Vehementissime aluū ciet, in cibo cocta. Coquitur propter acrimoniam cum pingui carne.

De Beta. CAP. CXXXVI.

bEta duorū generum est, e quibus nigra coquitur cū lentisula, vt vëtre m fistat. Quod magis radice eius præstatur. Candida aluo utilis est. Vtraq; tamen propter nitrosum humorem quem habet in se, noxij succi est. Vnde succus earum, cum melle naribus inditus, caput purgat. Aurium doloribus auxiliatur. Decoctum radicis & foliorum, surfures lētesq; deterget. Perniones fori mitigat. Crudis folijs vitilignes nitro antea perfritas, alopeciarum inanitates, atq; depascentia vlcera, illini prodest. Eruptionibus popularum, igni sacro, ambustisq;, cocta medetur.

DE MEDICINALI MATERIA

De Portulaca sylvestri. CAP. CXXXVII.

f yluestris portulaca quam aliqui Aizoon sylvestre vocāt, alij
Telephion, Romani illecebram, aliqui portulacam, Aphri
mœmoen, Daci lax, Aegyptij mochmurim, folijs pusillis,
ad satiuā accedētibus, hirsutis, lationibus. Nascitur in petrosis. Non
nunq̃ in hortis. Folia oleæ habet, minora multo, plura & tenera, rubē
tes cauliculos, ex vna radice multos, in terra sessiles, qui manducati
bonum succum pariunt, viscosi, & aliquantum salsi. Vis ei ex calfa & o
ria, acris, exulcerans. Discutit strumas cum axungia illita.

De Portulaca.

CAP. CXXXVIII.

*Dosifellam
Portulaca* *p* Ortulacæ vis adstringit. Capitis doloribus, inflammationi
bus oculorum, cæterisq̃, cum polēta imponitur. Ardoribus
stomachi, sacro igni, vesicæ doloribus, auxilio est. Comman
ducata, dentium stupores sedat. Stomachi & intestinorum æstuat
ionem, fluxionemq̃ mulcet. Renes & vesicā adiuuat, etiā si erosione sen
tiant. Veneris impetus exoluit. Succus epotus simili effectu prodest,
in febribus valens. Contra teretes ventris tineas, cruentā excreatio
nē, dysenteria, hæmorrhoidas, & profluvia sanguinis, percocta efficax
est. Item contra sepius morsus. Ocularibus medicamentis vtilissime
commiscetur. Interaneis fluxione laborantibus, atq̃ vuluarum erosio
nibus, infunditur. Contra dolores, quos æstus excitauit, caput ex ro
saceo & oleo fouetur. Eruptiones papularum in capite, cum vino emē
dat. Vulneribus quæ ad syderationem spectant, ex polenta illinitur.

De Asparagis.

CAP. CXXXIX.

a Sparagus, quem aliqui Petreon, alij Myacantham, alij My
on vocant, vulgo notus est. Huius cauliculi in cibo, vëtre
emolliunt. Vrinam cient. Radicis decoctū contra vrinæ dif
ficultatem, regiū morbum, renum vitia, & coxendicum cruciatus, in
potu proficit. Cum vino autem phalangiorum moribus auxiliatur.
Si decocti succus super dente contineatur, eius dolori medetur. Semen
ad eadem valet. Canes vt aiunt, si decoctum bibant, emoriuntur. Aspa
ragum etiam nasci prodiderunt, arietis cornibus cōtusis, atq̃ defossis.
Quod quantum equidem sentio, plane a veritate abhorret. Is tamen
Asparagus multis ramis fruticat, folijs fœniculi, numerosis, radice ro
tunda, grandi, tuber habēte. Huius teneri cauliculi triti in vino albo,
phærenitico renum dolores sedant. Assus autem coctusve, vrinæ stillicidium, diffi
cultatemq̃, ac dysenterias, mitigat. Radix cū vino aut aceto cocta, lu
xatos artus mulcet. Cum ficis aut ciceribus sumpta, regiū morbum
sanat. Coxēdicis cruciatus stranguriæq̃ leuat. Alligata radix, aut hau
stum eius decoctum, conceptum adimit, & sterilitatem adfert.

LIBER SECVNDVS

46

De Plantagine.

CAP.

CXL.

Rnoglosson alij Arnion vocant, alij Probaton, alij Cynoglosson, alij Heptapleuron, alij Polyneuron, Magi Eurchnemonia, Aegyptij Asonth, Romani plantaginē, Hispani thesariā, Pœni Atijrcon. Duo eius genera. Minor folia habet angustiora, minora, molliora, læuiora & tenuiora, caule anguloso, in terra sessili, floribus pallidis, semine summis caulibus emicante. Altera maior & virentior, latis constans folijs, olerum generis. Cuius caulibus cubiti altitudinem petit, angulosus, subruber, a medio ad verticem tenui semine circumdatus. Radicibus nititur teneris, hirsutis, candidis, digitum crassitudine æquantibus. Nascitur in lacunosis, sepibus, & locis humidis. Multo vrilior magna est. Vim habent folia exicatoriam, constringentem. Quare omnibus malignis vlceribus, & fluxioni oportunis atq; elephanticis, sordidisq; illita profunt. Profluvia sanguinis, vlcera quæ serpunt, epinyctidas, carbunculos, nomasq; cohibet. Vetera vlcera & inæqualia cicatrice obducunt. Chironia sanāt. Sinus conglutinant. Moribus canis, ambustis igni, inflammationibus, panis, parotidibus, strumis, ægylapijs, illita cū sale profunt. Coctum cum aceto & sale olus, dysentericis, cœliacisq; sumptum subuenit. Datur & in locum betæ cum lenticula coctum. In leucophlecmatia, inter aridas epulas, hærbæ decocta datur. Comitialibus & suspiriosis data proficit. Foliorum succus, colluta subinde oris vlcera, purgat. Cum cimolia aut cerufa igni sacro medetur. Fistulis infusus prodest. Lippitudinibus & aurium doloribus idem succus instillatur. Additur quoq; in oculorū collyria. Gingiuis cruore suffusus, & sanguinis reiectionibus, potu confert. Clystere dysentericis infunditur. Contra tabem datur in potu. Aduersus strāgulationes vuluæ, in vellere subijcitur, etiam si vulua fluxione laboret. Semen ex vino potum alui fluxiones & sanguinis excreationes sistit. Decocta radix & manducata, & collutione, dētium dolores sedat. Eadem cum folijs, vlceribus renū & vesicæ in passo datur. Ferūt treis radices cum tribus vini cyathis, & pari aquæ modo, tertianis auxiliari, & quattuor quaternis. Sūt qui radices gestamine, discutiendis strumis vtantur. Syrius plantaginis & calaminthæ, cum melle produnt ijs mederi, quos vires defecerūt, datum die secunda, & quarta, & parasceue, id est veneris die. Hoc autem veluti arcanum accipito, quod veraci experientia compertum est.

De Lauere seu fio.

CAP.

CXLI.

Ion quod in aquis est, aliqui aquatilem anagalida, alij Darenion, alij lauer, alij Schinon aromaticum vocant. In aquis inuenitur, frutice pingui, recto, folijs latis, holusatro similibus,

Erythron

DE MEDICINALI MATERIA

sed minoribus, & odoratis. Quæ cruda coctaq; esu, calculos rumpunt, atq; excernunt. Vrinæ cient. Menses & partus extrahunt. Dysentericis in cibo auxiliantur. De Sio Crateuas tradit, hærbam esse fruticis specie, pauca folia ferentem, rotunda, maiora q̄ mentæ, nigra & ad crucem accedentia.

De Sisymbrio. CAP. CXLII.

inter a frigida

f Ifymbrium alij serpyllum vocant, alij veneris coronam, Romani veneriam, aut eusteralem. In solo inculto nascitur, mentæ hortensis similitudine, odoratus, latiore folio. Inferitur coronis. Calfaciendi vim habet. Contra stillicidia vrinæ, calculosq; semen ex vino bibitur. Tormina & singultus sedat. Folia in capitis dolore, fronti aut temporibus illinuntur. Item cōtra vesparum apiumq; ictus. Vomitiones potu cohibet.

Crocydum

De Altero Sisymbrio. CAP. CXLIII.

inter a frigida

a

Lterum sisymbrij genus, quod aliqui cardaminam, alij Sion appellât. Ea hærbæ riguis gaudet, & eisdem in locis, quibus sion, provenit. Quæ ideo nonnullis cardamina nominatur, q̄ gustu cardamum, idest nasturcium repræsentet. Folia primum rotunda prodeunt. A dulci erucæ modo finduntur. Id exalfacit. Vrinæ mouet. Crudû estur. Purgat lentigines, cutisq; vitia in facie, noctibus impositum, matutinisq; detractum.

Romana

De Crithmo. CAP. CXLIII.

c

Rithmum, seu potius vt aliqui Crithamon, fruticosa hærbula est, cubiti altitudinem petens. Nascitur in maritimis, & petrosis, folijs pinguibus, numerosis, albicantibus, veluti portulacæ, crassioribus, & longioribus, salso gustu. Flores candidi sunt. & semen ceu rorismarini, odoratû, molle, rotundum, quod siccâtû rumpitur. Habet intus semē rufum, radices digiti crassitudine, tres aut quatuor, grati odoris & iucundi. Radix, semen, & folia incocta vino, potu vrinæ difficultati & regio morbo auxiliantur. Menses cient. Estur crudum coctumve in holere. Seruatur etiam in muria.

De Coronopo. CAP. CXLV.

Sanguinaria

c

Oronopus aliquibus Ammonos, alijs Astriō, Pœnis Atir fitte, Romanis Caciatrix, alijs Stilago, alijs Sanguinaria dicitur. Oblonga hærbula est per terram repēs, fissis folijs. Coquitur in holere. Radicem habet tenuem, adstringentem, quæ in cibo cœliacis facit. Prouenit in semitis, iuxta domicilia, & locis incultis.

De Cicerbita seu Soncho. CAP. CXLVI.

Sancti

f

Onchon asperum aliqui Cichorium vocant, Romani Cicerbitam asperam, Aphri gathonem. Huius duo genera. Sylue-

strior magis spinis horret. Alter teneritate quadā mollescit, cibus ex-
 petitus, anguloso caule, interdum rubicante, folijs in ambitu per inter-
 ualla dissectis. Vtriusq; vis refrigerat. Modice adstringit. Vnde æstu-
 anti stomacho & inflammationibus illiti profunt. Succus eorum sto-
 machi rosiones sorbitione mitigat. Lac elicit. In vellere appositus, se-
 dis ac vuluæ collectionibus opitulatur. Tam hærba quam radix illi-
 ra vibratis a scorpione & tribus subuenit. Alter sonchus tenerior, arbo-
 ris instar, latis constans folijs. Eum qui ramos habet, folia distinguunt.
 Sed ad eadem pollet.

De Intubo & feri. CAP. CXLVII.

Atiuam Serin alij Picrida appellant, Aegyptij Agon, Ro-
 mani intubum. Duum generum est. Altera syluestris, quæ pi-
 cris & cichorion vocatur. Altera latioribus folijs constar.
 Stomacho q̄ hortētia vtilior. Quæ iterū in duas species digeritur. Vna
 folio latiore prodit, lactucarū simillima. Altera angustiore est folio, &
 gustu amara. Vtraq; refrigerat & adstringit. Stomacho vtilissima. Al-
 uum sistit cocta, si cū aceto adsumatur. Syluestres stomacho meliores.
 Quandoquidē æstuante ipsū, & quē imbecillitas vexet, leniūt. Car-
 diacis per se, aut cū polenta, vtiliter illinuntur. Podagris & oculorū
 inflammationibus auxilio sunt. Hærba cum radice illita, percussis a
 scorpione subuenit. Igni sacro cum polenta medetur. Succus cum ce-
 rusa & aceto valet ad illitus eorum quæ refrigerationem desiderant.

De Condrilla. CAP. CXLVIII.

Ondrilla, quam aliqui cichorion, alij Serin appellant, cau-
 lem, flores, & folia habet cichorio similia. Qua ex causa non-
 nulli syluestris intubi speciē esse pronunciant. Verū tenuior
 tota est, in cuius ramulis, gummi mastices simillimū, tuberculosa bæ
 inueniri solet. Quod cum myrrha tritum, & linteo appositum instar
 oliuæ, fœminarum menses trahit. Tusa cum radicibus tota, adiecto
 melle, diuiditur in pastillos, qui nitro ammissi vitilignes emaculant.
 Gummi inordinatos pilos replicat. Quod item tenera radix efficit,
 si intincta succo acus, pilis admoueatur. Contra vipersas in vino pota
 proficit. Succus decoctæ, in vino, aut per sese potus, aluum sistit. Ali-
 ud habetur condrillæ genus, folium ferens oblongum, circumrosū,
 humi sparsum, caulem succo madentem lacteo. Radice tenui, rotun-
 da, leui, vegeta, flauescēte, succosa. Cuius & caulis & folia cōcoquen-
 di vim habent. Succus incommodos palpebrarum pilos reflectit. Na-
 scitur in lætis & cultis.

DE MEDICINALI MATERIA

De Cucurbita.

CAP. CXLIX.

Vcurbita esui apta. Cruda illitu tumores & abscessus mitigat. Ramenta eius infantibus cōtra capitis ardorē, quā syria-
fin vocant, in fincipite illinūtur. Oculorū inflāmationes po-
dagrasq; refrigerant. Succus e ramentis tuis per se, aut cū rosaceo infu-
sus, auriū doloribus auxiliatur. Adustiones cutis illitu adiuuat. To-
tius feruescētis & expressæ succus, cum melle exiguo & nitro potus, al-
uū leniter resoluit. Vinū in cucurbitam recentē excavatam infusum, si
mistum sub diuo teneatur, potu aluum læuigabit.

De Cucumere satiuo.

CAP.

CL.

Atius cucumis aluo & stomacho perq; vtilis habetur. Re-
frigerat, qui corruptionē nō sentit. Vescicæ prodest. Olfactu
reuocat, quos animus liquerit. Semē modice vrinam mouet.
Cū lacte aut passo vescicæ exulcerationibus subuenit. Illita cū vino so-
lia morsus canum sanant, & epinyctidas cum melle.

De Pepone.

CAP.

CLI.

Eponis caro in cibis, vrinā cit. Inflāmationes oculorū illita
sedat. Ramēta eius cōtra adustionē infantīū, quā syria-
fin vocāt, fincipiti imponūtur. Fronti admota oculorū fluxiones
auertunt. Succus cum semine, adiecta farina, ficcatus in sole cogitur in
sinegmata, quæ faciē repurgāt & nitorē afferūt. Radix ficca, & ex hy-
dromelite pota drachmæ pōdere, vomitionē mouet. Si quisq; modera-
te secūdam cēnam vomere cupiat, geminis obolis fit contētus. Sanat
quoq; illita cum melle, vlcera cōcreta in modū faui quæ cæria vocāt.

De Lactucis.

CAP.

CLII.

Aſtucæ satiuæ, quibus natura refrigeratrix inest, stomacho
gratæ habētur. Somnū cōciliāt. Aluū emolliūt. Lac euocāt.
Verū decoctæ magis alūt. Stomachicis illotas esse prodest.
Epotū semen, assiduas libidinum imaginationes in somno, compescit.
Et veneri refragatur. Frequentiores tamē in cibo, claritati oculorū offi-
ciunt. Muria condiūtur. Cū in caulē exierunt, vim quādā nanciscun-
tur, succo aut lacti syluestris lactucæ similem.

De Lactuca syluestri.

CAP.

CLIII.

yluestris lactuca, quā magis sanguinē Titani, Zoroastres Phe-
rombion, Romani Lactucā syluestre appellāt. Satiuæ similis
est, sed lōgior caulis, & cādidiōra folia, graciliōra, & asperio-
ra. Amaro gustu est, & viribus aliquātū papaueri similis. Vnde lacteū
eius succū aliqui meconio permiscuerūt. Aquā per aluū elicit, potus
in aceto mulso succus ad duos obolos. Argema caliginemq; repurgat.

LIBER SECVNDVS

50

Contra aduersiones efficaciter illinitur, cum lacte mulierum. In summa somnum allicit. Doloris leuamentum præstat. Menses trahit. Contra scorpionū & phalāgiorum ictus bibitur. Semē nō aliter q̄ fatiua, libidinum imaginationes in somno amolitur, ac venerē arcet. Succus ad eadem valet, sed viribus infirmior. Reponitur in fistili nouo laceius, antea, vt in alijs liquaminibus moris est, insolutum.

De Gingidio. CAP. CLIIII.

Ingidiū aliqui lepidion, Romani bisacutū, Aegyptij dorysa
g trū, Syri Adoriū, Aphri Tiriā appellāt. In Syria & Cili-
cia plerūq; nascitur. Hærbula syluestri pastinacæ similis, te-
nuior, & amarior, radice parua, cādicāte, subamara. Olus hoc crudū,
coctū, cōditūve estur magna stomachi vtilitate. Vrinā cit. Decoctū ex
vino potū veficæ prodest.

De Scādice. CAP. CLV.

Candix, quā Romani hærbā scanariā, aut aculā nominār, syl-
f uestre olus est, amarū, subacre. Quod crudū coctūve māditur.
Stomacho & ventri vtile, Decoctū in potu, veficæ, renibus
& iocineri confert.

De Gallinaceo pede ceu caucalide. CAP. CLVI.

c Aucalis quam alij Caucū, alij syluestre daucun, alij myitin,
Democritus Brion, Romani pedē gallinacē, aut pedē pulli,
ægyptij sefelin vocant, cauliculo est dodrantali, aut maiore,
hirsuto, folijs apio similibus, sæniculi modo per extrema multifidis,
hispidisq; candida in cacumine vmbella, suauiter olente. Crudum co-
ctūve olus estur. Vrinā mouet.

De Eruca CAP. CLVII.

Vzomon Romani Erucam vocant, ægyptij Ethericē, pœni
e asuric. Cruda eruca venerē largiore cibo concitat. Semen eo-
dem effectu prodest. Vrinā cit. Aluo perq; cōmodata. Semine
ad condimēta vtuntur, quod vti in longū tēpus asseruetur, adiecto la-
cte aut aceto, digerunt in pastillos. Gignitur etiāmnū syluestris eruca,
maxime in iberia, quæ occidentē spectat. Cuius semine pro snapi in-
colæ vtuntur. Vrinam vehementius pellit, multo fatiua acrior.

De Ocimo. CAP. CLVIII.

Cimū vulgo cognitū. Id copiosiore cibo oculorū acie hebe-
o tat. Aluū mollit. Spiritum mouet. Vrinā pellit. Lacuocat.
Aegre tamē cōficitur. Illitū cū polline polentæ, aceto & ro-
faceo, pulmonū inflāmationibus auxilio est. Draconis marini et scor-
pionis ictibus per se prodest, & cū vino chio oculorū doloribus. Suc-
cus visus caliginē abstergit. Destillationes exiccat. Semē potū cōue-
nit infantiētibus, difficili vrinæ, inflatisq; Naribus haustū subinde mo-
uet sternutamēta. Quod idē hærbā efficit. Sed oculos premi necessum

DE MEDICINALI MATERIA

est, cū sternutamētū vrget. Sūt qui in cibis abdicādū cēseāt. Quādoquī dē māducatū, & in sole positū, vermiculos gignat. Aphri autē adijciunt, si feriātur a scorpione, qui Ocymū ederit, nullo cōfistari dolore.

De Orobanche. CAP. CLIX.

Robanchen, alij Cynomorion appellāt, a similitudine canis nigenitalis, Cyprij tyrsinen, cōmuniter lycon. Cauliculus est sesquipedalis & iterdū maior, sububer, hirsutus, tener, folio pingui, flore luteo, aut cādicāte, radice digiti crassitudine, & cum ariditate flaccescit caulis, fistulosa. Hāc inter legumina nasci cōstat, & ea strangulare. Vnde Orobanche sibi cognomētum vsurpauit. Estur vt olus cruda, & in patinis asparagi modo decocta. Legumentis addita, cōtionē accelerare creditur.

De Barbula hirci. CAP. CLX.

Arbula hirci quæ ab alijs come vocatur, breui est caule, folijs croci, radice lōga, dulci, supina, magno super caulē calyce, cuius summo semen nigrū depēdet. Vnde nomē inditū est.

Hærbæ eius apta est. De Ornithogalo. CAP. CLXI.

Ornithogalū cauliculus est tener, cādicās, tenuis, sesquipedalis, tribus aut quattuor in cacumine mollibus agnatis, a quibus flores prodeunt, foris hærbacei, & cū hiantes se pandunt laetè visuntur. Inter quos disectum vt milio capitulū emicat. Coquitur cū pane vt melanthiū. Radix bulbosa, cruda & cocta manditur.

De Tuberibus. CAP. CLXII.

Vbera rotundæ radices sunt, sine caule, sine folijs, flauescētes. Vere fodiuntur. Cruda & cocta eduntur.

De Smilace. CAP. CLXIII.

Ortenia smilax frutex, cuius semen a nonnullis lobia vocatur. Folia habet hederæ, molliora tamen, tenues caules, & capriolos vicinis fruticibus circumuolutos, qui tantum adulescunt, vt topiarum quoddam tabernaculū effingere videatur. Fructū foenigraci profert longiorē, & corpulentū, in quo semina renū similia sed inæquali colore recludūtur, quæ quadā ex parte fuluescūt. Fructus cū semine in oleribus asparagi modo māditur. Vrinā ciet, & tumultuosa somnia facit.

De Medica. CAP. CLXIII.

Medica cum recenter prodiit, folijs & caule trifolio pratensi similis est. Procedens vero folia contrahit, caules edens trifolij, in quibus semen lendis magnitudine dependet. Quod in cornicula incuruatur. Id ficcatum iucundi saporis gratia, condimento salī ammiscetur. Viride semē quibus refrigeratione opus est illitu suffragatur. Hærbæ tota pro gramine vtuntur, qui pecora alunt.

LIBER SECVNDVS

De Aphaca.

CAP.

CLXV.

Phaca in aruis nascitur, altior lenticula, tenuioribus folijs.
 a Siliquas maiores fert, in quibus terna quaternave semina, le-
 te minora, continetur. Quæ adstringendi vim habet. Quare
 torrefacta, stomachi aluiq; fluctiones sistunt, si fresa lentis more deco-
 quantur.

De Porro capitato. CAP. CLXVI.

Apitatū porrū inflationē facit. Noxiū succū creat. Tumul-
 c tuosum somnū parit. Vrinā ciet. Aluo accōmodatur. Exte-
 nuat. Oculorū aciē hebetat. Menses pellit. Sed lædit exulce-
 ratam vesicā reneq; . Cū prisana vero coctū esu peccoris vitia extra-
 hit. Coma eius in aqua maris & aceto cocta, in desessioibus, ad præ-
 clusiones vuluæ & duriciās, vtilis habetur. Porrū bis aqua mutata co-
 ctū, aut frigida maceratū, dulcescit, & multo minus inflat. Semē acrius
 est, & quādam adstrictoriā vim habet. Quare succus cū aceto, addito
 thure aut manna, sanguinis profluvia sistit, maxime si naribus erum-
 pat. Venerē stimulat. Contra omnia thoracis vitia tabēq; , pro delin-
 ctu efficax est. Arteriā esu purgat. Sed si assidue estur, visus obscurita-
 tem inducit. Stomacho aduersatur. Succus ex melle potus, aut illitus,
 cōtra bestiarū morsus auxilio est. Cū aceto & thuris polline, lacte aut
 rosaceo, vtiliter aurīū doloribus & sonitui instillatur. Varos tollunt
 folia illita cū vua rhois, quā ad obsonia vtuntur. Epinyctidi medētur.
 Crustas ex sale illita rūpunt. Veteres sanguinis reiectiones cohibent,
 si binis drachmis & æquali baccharum myrti pondere bibantur.

De Ampeloprasso. CAP. CLXVII.

Mpeloprassum stomacho magis aduersatur. Et plus porro
 a excalfacit. Vrinam & menses vehemētius ciet. Id contra ser-
 pentium morsus esse conuenit.

De Cepa.

CAP. CLXVIII.

Rommyon aliqui Polijdos vocāt, magi calaborim, Roma-
 c nā Cepam. Cepa lōga acrior est q̄ iētūda, Itē flaua q̄ candi-
 da, & sicca q̄ viridis, & cruda q̄ cocta, aut condita. Omnes ta-
 men mordent. Flatus gignūt. Appetentiam inuitant. Sitim mouēt. Et
 extenuant. Fastidiū pariunt, & expurgāt. Aluo vtilis sunt. Ex detra-
 ctis purgamētis in oleū coniectæ, hæmorrhoidas, reliquosq; excretio-
 num exitus laxāt, subditæ pro balanis. Succus cū melle illitus oculo-
 rū hebetudinibus, argemis, nubeculis, & icipiētibus suffusionibus au-
 xiliat. Anginæ eodē perungūtur. Suppressos menses pellit. Caput pur-
 gat naribus infusus. Canis moribus cū aceto ruta & melle illinif. Cū
 aceto autē perūctas in sole vitilignes sanat. Et cū pari spodio scabras
 lippitudines sedat. Varos cū sale reprimat. Contra calceamētōrū attri-

DE MEDICINALI MATERIA

tus, cū gallinaceo adipe vtilis est. Citæ aluo prodest. In auribus sonitū ac grauitatē emēdat. Ad purulētas aureis & eliciēdā earūdem aquā valet. Alopeciae earū succo perfricantur, qui celerius q̄ alcyonium, pilos euocat. Largiore cibo cepa capitis dolores ciet. Coctaq; vehemētius vrinā pellit. Eos lethargicos efficit, qui valetudinibus aduersis, ea etiā cocta, plus æquo vescātur. Cum passis vuis & fico illita, tubercula concoquit, & celerrime rumpit.

De Allio.

CAP. CLXIX.

a Llium græci Scorodon, alij Geboscon, alij Elaphoboscon vocāt. Quoddam satiuū atq; hortensium habetur. Quod in ægypto, singulari vt porrū capite cōstat, dulce, in purpureū vergēs, paruū. Reliqua vero magna & cādida, ex pluribus coagmentātur nucleis, quos aglithas græci nomināt. Aliud est syluestre quod opioscorodon id est anguinū vocāt. Vis alij acris est. Excalfacit. Mor det. Excernit. Aluū turbat. Inflationes facit. Stomachū exiccat. Sirim gignit. Flatū permouet. Acie oculorū esu hebetat. Eosdē effectus præbet anguinū, quod & elaphoscorodon dicitur. Latas ventris tineas in cibo sumptū abigit. Vrinās detrahit. Contra viperarū ictus, & priuatim hæmorrhoidū prodest, ita vt non aliud magis, si cum vino iugiter adsumatur, aut tritū in eodē ebibatur. Cōtra rabiosorū morsus & illitu & cibo valet. Magnæ & allio vtilitates contra aquarū mutationes. Vocē clarificat. Veterē tussim crudū coctū ue lenit. Potū autē cū origani decocto, pediculos & lendes enecat. Cremati cinis illitus suagillationibus cū melle, & alopecijs cū nardino vngvine, medetur. Eruptiones popularū cū oleo & sale sanat. Vitiliginēs, lichenas, lētiginēs, vlcera capitis manātia, lepras, & furfures, eximit. Cum thure et tēda decoctū, dentiū dolorē leuat, si in ore cōtineatur. Cōtra venenatos muris aranei morsus, cū ficulneis frondibus & cumino illinitur. Feruescētæ comæ ius, forminarū deflectionibus additū, menses & secūdos partus extrahit. Alliu eiūsdē grana suffitur. Factū ex eo & nigra oliua intritū, esu cit vrinā. Laxat venarū spiracula. Hydropicis vtile.

De Scordoprasso.

CAP. CLXX.

f Cordoprassum magnitudine porrū æquat, qualitātū porri & allij particeps. Vnde promiscuas sibi vires ex vtroq; vendicauit, effectus allij & porri præbēs, inefficacius tamē. Coctum porri modo dulcescit, & in olerum vicem transit.

De Sinapi.

CAP. CLXXI.

f Inapi hortensiu, aliqui napi, Romani Sinapi vocāt. Eligidebet maturū, valde ruffū, nō magnopere ficcū, sed quod fractū interne virescat, & quoddā succo madeat, cæsum colore.

LIBER SECVNDVS

52

Siquidē recēs id genus adultūq; habetur. Ad calfaciendū it, extenuandū, extrahendū, efficax est. Ad eliciendā capitis puritā manditur. Cōtrapræduros tōfillarū tumores, ac veterē callosāq; arteriā scabrie, succus ex aqua & melle, conuenienter gargarizatur. Sternutamenta ciet, tritum & naribus admotum. Comitialibus quoq; auxiliatur. Fœminas vuluæ strangulatu oppressas excitat. Lethargicis, derafo capite, illinitur cum ficis amistum, donec rubescat locus. Ad coxendicum cruciatus, lienes, & omne genus dolores confert, cū permutedæ valetudinis causa, ex alto vitia extrahenda sunt. Alopecij illitum medetur. Faciem purgat. Sugillata cū melle adipe aut cærato rapit. Ferræ impetigines, & lepræ, eo cum aceto perunguntur. Contra febrium circuitus aridum bibitur, aut potui polētæ modo inspargitur. Extrahētib; emplastris, scabiēq; extenuantibus, vtiliter ammisceri solet. Grauitati aurium & sonitui, cum fico impositum prodest. Succus ad hebetudines oculorum & genarum scabrias magna vtilitate illinitur. Expressus recentī semine succus in sole siccatur.

De Nasturcio.

CAP. CLXXII.

Ardamon alijs Cynocardamon, alijs iberis, alijs Cardaminaca, Aegyptijs Semieth, Romanis Nasturcium dicitur.

Optimū cōstat esse Babilonicū. Omniū semen est acre. Excalfacit. Stomacho aduersatur. Aluum turbat. Tineas excutit. Lienē imminuit. Partus exanimat. Vrinā cit. Venerē stimulat. Sinapis & Erucae simile intelligitur. Lepras & impetigines absterget. Illitū cum melle lienē extenuat. Fauos expurgat. Pulmonū vitia extrahit, sorbitionibus incoctū. Serpentiū venenis potū resistit, atq; eas suffitu fugat. Capillorū defluuia cohibet. Carbūculos ad suppurationē perducit & rumpit. Coxendicibus cum polēta commode ex aceto illinitur. Tumores collectionesq; discutit. Emitterit furunculos, illitum cum muria. Hærbæ ad omnia eadem effectus, licet minor.

De Thlaspe.

CAP. CLXXIII.

Thlaspi aliqui Thlaspidion, alij Sinapi perficū, alij Myiten, alij syluestre sinapi, alij Dasmophon, alij Myopterō, alij Biron, Egyptij Sintēpsum. Romani Scādulatū, alij Capsellam, aut pedē gallinacē vocant. Hærbula angustis folijs, digitali longitudine, in terram versis, suppinguibus, in cacumine diuisis, sesquipedali cauliculo, tenui, non sine adnascentibus ramis, fructu circa ipsum totū, ab extremo in latius se pandēte, semine nasturcij incluso, lenticulæ effigiē, nisi quod infringitur. Vnde nomē accēpit. Flos albicat. Nasctur in semitis, & sepibus, fossisq;. Semen asperi gustus, excalfaciens. Bilem & pituitam vtrinq; extrahit, potum acerbūli mensura. Pro-

DE MEDICINALI MATERIA

dest ischiadicis infusum. Sanguinem potu educit. Internas suppurationes rumpit. Menses ciet. Sed partus enecat. Alterum Thlaspi tradit Crateuas, quod aliqui periconapi vocant, latis folijs, radicibus magnis, vtile ischiadicorum infusioni.

De Arabide.

CAP. CLXXIII.

Arabide

Rabis hærba ad cubiti altitudinē assurgit, tenues spargēs ramos, et ex vtroq; latere folia, ceu lepidij, sed molliora, et cãdidiora. In cacumine vero sabuci vmbellã gerit, cãdidos flores habentem. Hærba hæc cum ptisana coquitur, in cappadocia maxime. Semen aridũ pro pipere obsonijs ammiscetur.

De Irione.

CAP. CLXXV.

Irione

Rysimon aliqui chamæplion, Latini irionem vocãt, magi herculis alphita, Aegyptij erethimon. Iuxta vrbes, domicilia hortosq; nascitur, folijs erucae sylvestris, cauliculis in lori modũ lentis, floribus luteis, siliquis in cacumine gracilibus, vt fœnograeco cornicularis, semine nasturcij, exiguo, vrentis gustus. Contra thoracis fluxiones efficax est, & si purulenta extussiuntur. Regio morbo & lumborum vitijs prodest. Cõtra venena in delinctu cum melle datur. Illinitur ex aqua aut melle vtiliter cæcis carcinomatibus, parotidibus, duricijs mammarum, & testium inflammationibus. In totum extenuat, & calfacit. Mitius multo ad clysteres fiet, si aqua madescat atq; torreatur, vel linteo illigatum, oblito adipe perassetur.

De Pipere.

CAP. CLXXVI.

Iper in India nasci, breui arbore traditur. Quæ inter iniãia, prælongum fructum, veluti filiquam promit. Quod longũ piper est. Habet intus aliquid tenui milio simile, quod tandẽ in perfectum piper euadit. Id autẽ suis temporibus adultum, racemos emittit grana ferentes, quæ noscimus. Ea acerba candidum piper faciunt, aptum ocularibus remedijs, antidotis, & medicaminibus, quæ cõtra venenata parantur, theriaca vocãt. Longũ vero vehementius mordet. Et quoniam priusq; ematurescat decerptum est, subamarum relinquitur. Antidotis & theriacis medicaminibus expetitur. Nigrũ vero, vtpote quod tempestiua maturitate collectum sit, odoratum esse cõstat, candido suauius, acrius & ori gratius, necnon ad condimẽta vtilius. Sed cãdidum, adhuc in acerbum vergens, prædiãtis infirmius est. Eligi oportet grauissimum, plenum, nigrum, sine multis rugis, recens, minime fursurosum. Inueniuntur etiãmnũ in genere nigri semina macie confecta, cassa & inania, quod vocant brasma, Indorum lingua, sic significante abortum. Vis omnium excalfacit. Vrinam ciet. Cõcoquit. Extrahit. Discutit. Absterget caliginem quæ oculis obuersatur.

Piper februm rigoribus siue potu, siue illitu, subuenit. Serpentiū mor-
 fibus auxiliatur. Partus extrahit. Conceptum adimere creditur, statim
 ab initu suppositum. Tussi omnibusq; pectoris vitijs siue eclegmate,
 siue potu, succurrit. Anginæ eo & melle conuenienter perungūtur. Po-
 rum cum recentibus lauri folijs, tormina discutit. Cum vua passa man-
 ducatum pituitam a capite elicit. Valitudinem tuetur. Dolores finit.
 Appetentiam mouet. Concoctionem adiuuat, in embammata addi-
 tum. Strumas cum pice discutit. Vitilignes ex nitro emaculat. Fi-
 gili nouo, vt aiunt, motum torretur. Non est huius arboris radix gin-
 giber, vt aliqui existimauere, sicuti paulo post ostendemus. Namq; pi-
 peris radix costo similis est, gustum calfaciens, eiq; hygræ cognomen
 est. Hæc lienem reprimat, cum aceto illita aut pota. Caput etiam
 purgat, manducata cum vua taminia quam staphidem agriam vo-
 cant.

De Gingiberi.

CAP. CLXXVII.

Ingiberis sui generis plāta est, in troglodytica Arabia ma-
 gna ex parte nascens. Qua virente ad multa, perinde ad quæ
 nos ruta, vtuntur. Et primis potibus & eduljjs ammiscent.
 Huius radices cyperi modo paruæ sunt, candicantes, & odoratæ, atq;
 piper sapore imitantur. Eligi debent quæ teredines non nouerunt. A
 multis tamen ob id condiuntur, q; celeriter cariem sentiant. Fictili-
 bus in italiā asportātur. Gingiberis cibo cōueniens est. Et cū condi-
 mento assumitur. Excalfactoriam vim & excoquentem habet. Aluum
 leniter emollit. Stomacho vtile est. Efficax aduersus ea quæ oculis cali-
 ginem offundunt. In antidota addi solet. In totum piperi viribus nō
 dissimile.

De hydropipere.

CAP. CLXXVIII.

Hydropiper apud aquas nascitur, quæ stagnant, aut pigro la-
 psu repunt. Caulem ædit angulosum, prædurum, multis alis
 concauum, folia mentæ, maiora, melliora, candidioraq; gu-
 stu piperis, acri, citra tamen illam odoris gratiam. Fructum acrem in
 surculis paruis, prope folia racematim cohærentem. Folia cum semine
 illita tumores veteresq; duricias discutiūt. Sugillata delēt. Quæ postq;
 inaruerūt, tusa pro pipere in obsonijs ammiscentur. Radix parua, nul-
 lius in medicina momenti.

De Parmica.

CAP. CLXXIX.

Parmica frutex est, surculos habens paruos, multos, & rotū-
 dos, abrotono non dissimiles, & circa eos folia oleæ, lōga, &
 in cacumine capitulū vti anthemidis, paruū, rotundū. Quod
 suo acri odore sternutamentum excitat. Vnde nomē accēpit. Folia cū

DE MEDICINALI MATERIA

floribus illita fugillationes rapiunt. Flores sternumenta efficacissime mouent. Nasцитur in montibus & petrosis.

*herba
fistula*

De Radicula seu lanaria herba. CAP. CLXXX.

Truthium ab aliquibus Cerdon, ab alijs Catharis, ab alijs f Struthocamelus, a quibusdā chamærrhyton, a magis Caly rhyton, a Latinis lanaria herba aut radícula appellatur. No ta est herba, qua purgādis lanis vtuntur, qui eas eluunt. Huius radix est acris. Vrinam ciet. Prodest tussi, quam iecur excitauit, & ortho pnoæ ex melle sumpta cochlearis mēsurā. Aluū soluit. Eadem cū pa nace & capparis radice, calculos frāgit, & cum vrina exturbat. Duri ciem lienis absorbit. Menses imposita trahit. Partus enecat. Cum polē ta autem & aceto illita, lepras tollit. Tubercula discutit, cū farina hor deacea & vino decocta. Miscetur & malagmatis & colyrijs clarita tis causa. Sternutamenta mouet. Per os purgat, trita cū melle & nari bus infusa.

*herba
fistula*

De Cyclamino. CAP. CLXXXI.

cyclaminus a quibusdā Cysanthenon, ab alijs Cyssophyl lon, ab alijs Chelonion, alijs idyopheron, ab alijs Silene, a Zoroastre Triphalites, ab Osthane Aspho, a Magis Mia spho, Aegyptijs Thefce, a Romanis rapū terræ aut terræ vmbilicis vocatur. Folia habet hæderæ, purpurea, varia, in quibus suspēdēq; albī cāt maculæ, caule nudo, quaternos digitos æquāte, floribus in eo pur pureis, rosarum effigie, radice nigra & aliquantum lata, vt rapum vide ri possit. Quæ cum hydromelite pota, pituitam aquamq; detrahit. Mē ses potu appositurue ciet. Tradunt, si prægnans radicem transgredia tur, abortum fieri. Partū appensa accelerat. Contra venena præsertim leporis marini, ex vino bibitur. Illita cōtra serpentium ictus remedio est. Radix immista vino inebriat. Regium morbum discutit, tribus drachmis pota, cum passo aut diluto mulso. Sed oportet eum qui ebi bit, multis vestibus contextum, loco calido, & perfrictionibus tuto, re cumbere, quo facilius exudet. Eiecti autem sudores fellei colore inue niuntur. Succus eius ad purgandum caput, naribus infunditur. Ad deiicienda quoq; alui excrementa, in vellere sedi subiicitur. Illito vmbilico & imo ventre coxarum tenuis, aluum emollit. Sed abortum effi cit. Suffusionibus, & retusæ oculorum aciei, oblitus cum melle succus prodest. Medicamentis abortum inferentibus, ammiscetur. Succus cū aceto illitus, prociduā sedem restituit. Exprimitur tusa radice succus, & ad mellis crassitudinem decoquitur. Radix cutem purgat. Eruptio nes papularum reprimat. Vulneribus ex aceto aut melle medetur. Lie nem absorbit. Viria cutis in facie, & alopecias emendat. Eius decocto

luxata, podagras, & capitis vlcuscula, pernionesq; feueri congruum est. Ipsaq; in oleo vetere seruata, illito oleo, vlcera ad cicatricē perducit. Cauata radix oleo expletur, & cinere feruenti imponitur, adiecto interdū tyrrhenicā cārā momēto, vt *stigmētī* crassitudinē vnguētum cōtrahat, cum primis vtile pernionibus. Radix scyllæ modo cōcisa reponitur. Narrant ad amatoria assumi contusam, & in pastillos diuisam. Nascitur in vmbrosis, maxime sub arboribus.

De Altera Ciclamino. CAP. CLXXXII.

St & altera Cyclaminus, quam Cissanthemon, aut Cissophyllon vocant, minoribus q̄ hedera folijs, geniculatis caulibus, crassissq; circa vicinas arbores capriolorū modo sevo luētibus, flore cādido, odorato, acinis hederæ mollibus, leni gustus, aliquantulum acris, radice superuacua. Nascitur in asperis. Huius acini, drachmæ vnius pondere poti cum vini albi cyathus duobus triginta diebus, lienem per vrinam & aluum absumunt. Ad orthopnœam bibitur. Reliquias a partu purgat.

De Dracunculo. CAP. CLXXXIII.

Raguntium magnū aliqui Aron, alij Isaron, alij Iaron, alij Geracicon, alij Biaron, alij Armigrion, alij Cyperida vocant. In vmbrosis sepibus gignitur. Caulem habet rectum, læuem, duum cubitorum, baculi crassitudine, versicoloribus draconū maculis, purpureis tamen euidentibus. Folia rumicis, inflexa. Fructū summo caule facit, racemosum, coloris primum cineracei, mox per maturitatem in crocum & purpuram vergentis, radicem prægrandem, rotundam, candidam, cortice tenui vestitam. Colligitur, & dum maturus rescit succus exprimitur, siccaturq; in vmbra. Radix quoq; messibus effoditur. Elotaq; particulatim cōciditur, & funiculo transfixa siccatur in vmbra. Cum diluta portione crudam coctamve, cum melle delingi prodest, contra orthopnœas, rupta, cōuulsa, tussim, & destillationes. Pota cum vino venerem stimulat. Vlcerā quæ cacoethe vocantur, atq; phagedanica expurgat, Præsertim cum vite alba. Ex ea & melle collyria ad fistulas et partus euocādos cōponūtur. Ad vitilignes cū melle, efficaciter illinitur. Polipos & carcinomata absumit. Succus ad oculorum medicamenta, item contra nubeculas, caliginem, albuginesq; effectum præbet. Herbarū radicisq; odor, teneros cōceptus abortu vitiāt. Item si triginta grana eius in posca bibantur. Sunt qui eius succum cum oleo, aurium doloribus infudere. Quinetiam folia, vtpote quæ adstringant, vulneribus recentibus imposuere, & cocta in vino pernionibus. Qui folia manibus affricuerit, aut radicē exemerit posse a vipera feriri, inficiantur.

DE MEDICINALI MATERIA

De Dracunculo paruo. CAP. CLXXXIII.

Racūculus paruus folio cōstat hederaceo, magno, cādidi
 d notis infigni, caule recto, bicubitali, verficolore, maculis re-
 sperfo purpureis, ita vt anguē plane referat, baculi crassitudi-
 ne. Fructus sūmo caule racematim cohæret, colore primū felleo, & cū
 ematuruit, croceo, gustu feruēs, mordaxq̃, radice rotunda, bulbosa, ra-
 phano nō abfimili, tenui obdusta cortice. Nascitur in sepibus vmbros-
 fis. Seminis succus cum oleo instillatus, aurium dolorem mitigat. Na-
 ribus etiā ex lana impositus, polipum absūmit. Carcinomata illitu fi-
 stit. Triginta eius grana, si in posca bibantur, abortus inferunt. Odo-
 remaiunt posteaq̃ flaccidi flores emarcuerunt, conceptus adhuc tene-
 ros enecare. Radix exalfacit. Orthopnoeis, ruptis, vulfis, tussi, destil-
 lationibus, auxiliatur. Humores pectoris excreatu faciles reddit, siue
 cocta tostaq̃ cum melle, aut per sese edatur, siue farina eius ex melle de-
 lingatur. Vrinam pellit. Venerem excitat, cum vino pota. Phagæde-
 nas vlcerum, & quæ cacoethe vocantur, trita cum melle & brionia al-
 ba, expurgat, & ad cicatricem perducit. Collyria ex ipsa ad fistulas &
 eiiciendos partus fieri solent. Qui radice suas manus perfricauerunt, a
 viperis feriri negantur. Illita ex aceto vitilignes emaculat. Folia recen-
 tibus vulneribus, conceptorum linteolorum vice, cōuenienter impos-
 nuntur. Decoctam in vino pernionibus apposuisse prodest. Caseus fo-
 lijs inuolutus, a putredine defenditur. Succus radice ad nubeculas, al-
 bugines, & oculorum caligines cōuenit. Radix cruda coctave, ad sa-
 norū vsus, pro olere recipitur. In gymnetidibus ifulis, quæ calarides
 vocantur, coctam radicem cum melle multo, in cōuiuijs placentarum
 loco offerunt. Radix messibus effoditur, lotaq̃ frustatim conciditur,
 & lino traiecta siccatur in vmbra, & ita reconditur.

De Aro.

CAP. CLXXXV.

Ron apud syros Lupha vocitatū, aliqui Alymon, alij Thy-
 a mon, alij Draconiam, Cyprij Collocassion dicunt. Folia
 emit dracunculi, sed longiora, & paucioribus distincta ma-
 culis, caulem suppurpureum, dodrantalem, pistilli specie, a quo croce-
 um semen exit. Radice dracūculi alba, quæ decocta estur, vtpote cum
 minus acris fit. Folia ad esum condiuntur, & arida per se, decocta mā-
 duntur. Radix semen & folia, dracunculi vires habent. Priuatim ra-
 dix ex fimo bubulo podagris illinitur, & dracunculi more reponitur.
 In totum ob mitiorem eius acrimoniam, in cibum expetitur.

De Arisaro.

CAP. CLXXXVI.

Risarum exigua hærbula est, cuius radix oleæ magnitudinē
 a implet, longe maioris q̃ Aron acrimoniæ. Vnde illitu no-

mas fistit. Fiūt collyria ex ea ad fistulas. Illitu radicis, genitale animas
lis cuiuscunq; in perniciem agitur.

De Hastula regia. CAP. CLXXXVII.

Astulā regiā græci asphodelon, alij Nartheciō, Romani ala
h bucū vocāt, vulgo notū. Folijs est maioris porri, caule læui,
ferēte in cacumine florē, quē Anthericon appellāt. Radices
subiacēt oblōgæ, rotūdæ, glādibus similes, gustu acres. Quæ excalsa-
ciunt. Vrinās & menses epotæ ciūt. Lateris doloribus, ruptis, conuul-
sis & tussibus, drachmæ pōdere potæ ex vino medētur. Ea vero vomī-
tiones adiuuat, ludicri tali magnitudine commanducata. A serpente
demorsis datur aptissime. Verum trium drachmarum pondere, folijs
floribus & radice ex vino, morsus illinire oportet. Item vlcera fordi-
da & depascentia. Mammarum quoq; & testiu inflammationes, tubercu-
la, furunculoscq; decoctis in facē vini bulbis. Recentibus oculorū
inflammationibus ex polenta auxiliatur. Radicis succus adiecto ve-
tere vino dulci myrrha & croco decoquitur, fitq; perq; vtile oculis
medicamentum. Ad purulētās aureis per se, aut cū melle vino & myr-
rhā tritus, prodest. In contrariā aurē infusus, dentium dolorem miti-
gat. Cinis e radice illitus, alopecias ad pilum reducit. Oleum in exca-
uatis radicibus igni decoctum, illitu exulceratis pernionibus & ambu-
stis igni, cōducit. Surditati, instillatus in aurem, auxiliatur. Candidā
vitiliginem lintheo antea perfrictam in sole, illita radix emendat. Se-
men floresq; in vino poti scolopendræ & scorpionum venenis, mirū
in modum resistunt. Aluum purgāt. Floret messibus albucum. Quare
æquinoctio verno antequam semen adoleuerit demetendum. Radicē
aiunt potam, veneris cupiditatem inhibere. Quod hærbarius Cratæ-
uas asseuerat. Addiditq; sanare podagræ dolores, si drachmæ ponde-
re bibatur.

De Bulbo vomitorio. CAP. CLXXXVIII.

Vlbus quem vomitorium vocant, folia habet lentiora mul-

b to & lōgiora bulbo cibario, radicem similem, cortice magno.

Ea mansa, aut decoctum eius potum, vesicæ malis medetur.

Vomitones mouet.

De Bulbo cibario. CAP. CLXXXIX.

Ibarius bulbus vulgo cognitus, a nobis estur. Stomacho &

c aluo vtilis rufus, & ex aphrica delatus. Amarum vero

& scylinus, stomacho aptior est, & concoctionem adiuuat.

Bulbi omnes acrimoniam habent. Excalfaciunt. Venerem stimulant.

Linguam tonsillasq; exasperant. Multum alimenti præbent. Carnes

creant. Inflationem pariunt. Luxatis, fractis, articularū doloribus effi-

Bulbus est alioq; celsa ex oleis balsamis &c. neq; et cōs bulbi

in quib; cepa quæq; et alia in mero. Bulbini. equine nati

DE MEDICINALI MATERIA

caciter illinuntur. Spicula extrahunt. Gangranas & podagras ex melle aut per se, hydropicorum tumores, & canum morsus cum melle & piperris polline illiti cohibent. Stomachi dolores mitigant. Furfures & vlcerum quæ in capite manant, cum tosto nitro abstergunt. Sugillata varosque per se aut ex oui luteo, & lentigines cum melle & aceto, emendant. Fractis auriculis vnguibuscum, ex polenta medentur. Idem calidis cineribus torrefacti, tolluntur ficus. Item cum cinere e mænarum capitibus, impositi. Cremati vero & cum alcyonio musti, vitia cutis in facie, atrasque cicatrices, in sole illiti emaculant. Faciunt ad rupta, si cum aceto cocti edantur. Sed copiosiore eorum cibo abstinendum. Quonia nervos tentant. Cocti cum polenta, & ex fuillo adipe impositi, tumores ac tubercula velocissime ad suppurationem perducunt & rumpunt.

De Scilla.

CAP.

CXC.

Cilla vim acrem atque feruentem habet. Assatam multo vtiliore reme esse constat. Polline aut luto oblita, in clybanum conijciuntur, aut carbonibus obruitur, donec obducens farina sufficiens inter inusta fuerit. Quæ exempta si non emollescat, altera farina aut luto circumlinitur, & eadem quæ prius sunt. Nam quæ ita non assatur, interaneis maxime noxia est. Torretur ite in olla, indito operculo, quæ in furnum demittatur. Sumi etiam solet medium, direptis viuo tenuis tunicis, quod frustatim confectum coquitur, mutata sæpius aqua, donec ipsa nec amaritudinem aut acrimoniam habeat, trahendaque lino frusta siccantur in umbra, ita ut ne vlla quidem parte se contingant. His scillæ segminibus ad oleum, vinum, aut acetum scillinum vtimur. Ad rimas pedum, interna pars crudæ scillæ in oleo feruefacta, aut cum resina liquefacta, imponitur. Decocta in aceto demorsis a vipera, cataplasma est. Ad singulas assæ parteis adiectis octonis tosti salis, cochlear vnum aut alterum damus ieiunis, ad emolliendam aluum. In potu autem & odoratis medicaminibus, quibus urinam ciere volumus, hydropicisque & stomachicis, quibus inflatur cibus, regio morbo, torminibus, in tussi vetere, suspitionis & cruenta extussionibus, tres obolos in delinctu ex melle sumpsisse satis est. Coquitur cum melle, & estur eorundem gratia, maxime ut concordionem adiuuet. Strigmenta per aluum extrahit. Cocta & simili supra modo, eosdem præbet effectus. Sed cauedus scillæ usus, his qui intestinum sentiunt vlcus. Ad peniles verrucas & perniones, tota efficaciter illinitur. Tritum semine & in carica aut melle deuoratum, aluum emollit. Scilla in limine ianuæ suspensa, mali medicamenti noxam arceat.

De Pancratio.

CAP.

CXCI.

Ancratiū quod aliqui scillam appellant, radice est magni bulbi, ruffo colore, aut suppurpureo, gustu amaro ac feruente.

Folij lilij, sed longioribus. Scillæ vires & præparationē habet. Eodemq; pondere in morbis efficaciter assumitur. Cui tamen mitior q̃ scillæ facultas inest. Radicis succus, cum erui farina digeritur in pastil los, qui hydropicis splenicisq; cum hydromelite, commodissime dantur.

De Cappari.

CAP.

CXCII.

Apparin aliqui Cynosbaton, alij Capriam, alij Corui ma
c lū, alij Ophioscorodon, alij Phyllostaphylon, quidā Thal
liam aut Petræam, alij Olophyton, alij ionitem, nonnulli Oli
gochloron aut Acontion, aut Hippomanes, alij Trichomanes, Ma
gi Potera, alij Pentheron, aut cor lupi, alij alochorodon, Romani in
turim, Aphri Hærbicæthon. Capparis aculeatus frutex est, qui in ter
ra stratus magis in orbē euagatur. Spinas vt rubus habet, in hami mo
dum aduncas. Folia mali cotoneæ, rotunda, fructum oleæ similem, qui
cum dehiscens panditur, florem candidum promit. quo excusso, non
nihil glandis oblōgæ figura inuenitur, quod apertum grana acinis pu
nicorum similia ostendit. Radices lignosas spargit, grandes, numero
sasq;. Tenui solo, asperisq; locis, in insulis iuxta domicilia nascitur.
Caulis, & fructus, cibi gratia condiuntur. Aluum turbat. Stomacho
aduersatur. Sitim gignit. Cocta tamen stomacho q̃ cruda vtilior est.
Fructus drachmis duabus in vino potus, quadraginta diebus, lienem
absumit. Et vrinam, cruentumq; excrementum emittit. Bibitur vtilissi
me in coxarum doloribus, & nervorū resolutione, item ruptis & cō
uulsis. Menses ciet. Caput purgat. Dentium dolorem sedat, semen ex
aceto decoctum, colluto inde ore. Aridus radicis cortex ad eadem pro
ficat. Ulcera omnia vetera, & sordida, & quæ occalluerunt, expurgat.
Lienosis cum farina hordei illinitur. Dente demorsa dolori eius auxi
liatur. Cum aceto trita, vitilignes albas absterget. Radix foliaq; intri
ta strumas ac duricias discutiūt. Auriū vermiculos infusus succus ene
cat. Aphrica, & Marmarica Capparis, vehemēter inflāt. Apula vo
mitus facit. Libyca, & quæ rubro mari defertur, mirū in modū acris
est. Siquidem in ore pustulas excitat, gingiuasq; osse tenus exest, quare
in cibis non ab re damnatur.

De Lepidio.

CAP.

CXCIII.

Epidium aliqui gingidiū vocant. Hærbula vulgo nota. Mu
ria cum laetæ seruatur. Vis foliorum acris & exulcerans. Qua
propter ischiadicis illita, præsentissimum est auxilium, si cū
helenij radice quarta parte horæ illinatur. Lienosis simili modo pro
dest. Lepras eximit. Radix appensa collo, dolore dentium liberare
existimatur.

v R

passerage
fod. q. d. gingidiū
v. d. gingidiū
159

Incipit p. d. d.
v. d. d. d. d.
v. d. d. d. d.
v. d. d. d. d.
v. d. d. d. d.

DE MEDICINALI MATERIA

De Ranunculo.

CAP. CXCIII.

Anunculum aliqui sylvestre Apium vocāt. Complura eius genera. Vis tamen omnibus vna, acris, & vehementer exulcerans. Nam vnum coriandri folijs constar, latoribus, subalbidis, pinguibus, flore luteo, interdum purpureo, caule gracili, cubitum alto, radice alba, exigua, amaraq, multis capillamentis helebori modo fibrata. Nascitur in limitibus humidis. Alterum lanuginosius, longiori caule, pluribus foliorū incisuris, plerumq in Sardonia proveniens, q̄acerrimum, quod sylvestre Apium appellant. Tertium minimum, odore graui, flore aureo. Quartū huic simile, flore lacteo. Folia, flores & cauliculi recentes, illitu exulcerant, & crustas non sine dolore gignunt. Quare vngues scabros extricant. Scabiem eximunt. Strigmata delent. Formicantibus verrucis, & pensilibus, alopecijsq paupis per illinuntur. Tepente decocto perniones fouentur. Sicca radix tria q̄ sternutamenta ciet, naribus admota. Dentium dolorem appensa leuat, ipsos tamen frangit.

De Fremio.

CAP. CXCV.

Remium, græci Anemonem, alij Agriam, aut nigram vocāt, alij Anemonem phœnicam, alij Enemion, nonnulli Mecosion, alij Tragoceros, alij terræ parinem aut Barbylam. Ofsanes Berilion, Ite Ornios cheranion, Pythagoras Attractilida, Magi Cnicum agriam, Romani Orci tunicam. Duo fremij genera. Vnum sylvestre. Alterū in cultis nascens. Cuius multæ species. Vna phœniceum florem profert. Altera candicantem, aut lacteum, aut purpureum. Harum folia coriario similia, tenuioribus prope terrā diuisuris, caules lanuginosos, tenues, in quibus flores vt papaueris, & in medio capitula nigra, aut cærulea. Radix oleæ magnitudine, aut amplius paulo grandescit, fermeq geniculis quibusdam cingitur. Sylvestri amplitudo maior, latoraq folia, & duriora. Oblongius caput, flore puniceo, multis radicū capillamentis. Acrior est quæ nigra habet folia. Vis omnium acris. Ea de causa succus naribus infusus, purgat caput. Commanducata radix pituitam trahit. Decocta in passo & illita medetur oculorum inflammationibus. Cicatrices eorumdem & hebetudines emendat. Sordida vlcera abstergit. Folia & caules, si cum ptisana decocti edantur, copiam lactis præbēt. Menstrua ciunt, vellere appositi. Illiti quoq lepras eximunt. Sunt qui errore ducti, argemonen nominari eupatorium putent. Quoniam a sylvestri fremio, argemonen & papauer quod Rhœam appellant, de quo inter papaueris genera referemus, propter colorum cognationem in floribus, distinguere non possunt. Verum papaueris & argemonæ color, minus puniceus.

spedatur, & vtraq; tardius floret. Quinetiam Argemone croceum succum, gustu admodum acrem, reddit. Rhœas vero candidiorem & acrem. Insuper fremio & rhœadi capitula syluestris papaueris similia insunt, sed in fremio superne crassiusculum, in rhœade angustius. Fremij genera nec succum remittunt, nec caput habent, sed quasi asparagi cacumen. In aruis illa sæpius enascuntur.

De Argemone

CAP.

CXVI.

Rgemone a Græcis Oenone vocatur, ab alijs Anthemis,

a alijs Homonœa, aliquibus flos campestris, Romanis Concordialis, aut Pergalia, alijs Lyburnia, Gallis Corona. Syluestri papaueri similis est. Folia habet fremij, diuisa, florē puniceū, caput in cauliculo papaueris rhœadis, oblongius, & summis partibus latū, radicem rotundā. Succū croci colore acré, dimittit, Argema & nubeculas expurgat. Folia illitu inflammationes compefcunt. Ea, vt hærbarius Crateuas author est, contusa cum axungia strumas discutit. Cribrata eius farina cum nitro & sulphure ignem non experto. contra vitilignes efficax est. Easq; sicco linteo antea confrictas in balneis sanat. Facit & ad scabiem.

De Altera Argemone.

CAP.

CXCVII.

Ltera est Argemone, quam Artemonen aliqui, alij Arse-

a lam, aut Sarcocollam vocāt, Romani Argemoniam. Easq; alijs syluestri papaueri similis est. Recens trita intercisiones impositu sanat. Oculorum inflammationes mitigat. Pota cum aqua dysentericis auxiliatur. Vulnere conglutinat. Conuulsis, & vellicatibus, imposita medetur. Inflammationibus utilis. Contra serpentium morsus cum vino bibitur.

De Anagallide.

CAP.

CXCVIII.

Nagallis purpurea, quibusdam Aeritis, aut Aegitis vocatur,

a alijs Sauritis, a Magis Oculi sanguis, aut Chelidonium, Romanis Macia, Hetruscis Masytipos, Gallis Sapanaz, Dacis CERCERAPHRON. Anagallis communis, a quibusdā Corchoron, alijs Halicabon, alijs Zeliaurus, Magis Nycteritis, Aegyptijs Mecij, Romanis Anciaton, Aphris Afirrisæ. Duo eius genera: quæ tantū flore distāt. Nā quæ cæruleo flore est, fœmina dicitur. Mas quæ fœnico. Frutices sunt parui in terra iacētes. Folijs in quadrāgulo caule pusillis, subrotūdis, ad Helxinæ folia accedētibus, semine rotūdo. Vtraq; mitigādi vim habet. Inflammationē arcet. Ad aëros corpori

DE MEDICINALI MATERIA

aculeos extrahit. Nomas cohibet. Succus caput gargarizatu purgat. Et naribus infusus, dolorem dentium lenit, si in aduersam narem iniiciatur. Argema cum melle attico emendat. Retusæ oculorum aciei auxiliatur. Contra viperarum morsus, iocineris et renum vitia, ex vino bibere prodest. Tradunt eam quæ cæruleum ædit florem, prociduum am sedem reprimere. Quæ vero phœniceum, illitu euocare.

De Hedera.

CAP. CXCIX.

Edera aliquibus Citharon, alijs Cissaron, alijs Chrysocarpos, alijs Poetica, alijs Corymbethra, alijs Cyffion, alijs Dionysia, alijs Ithytherion, alijs Persis, alijs Cemos, alijs Asplenos, Romanis Sylua mater, alijs Hedera, Gallis Suibites. Hedera differentias multas in specie fortitur, generalissimas autem treis. Nam quædam candida est. Altera nigra. Tertia Helix. Candida fructum fert candidum. Nigra nigrum, aut croci æmulum, quam vulgus Dionysiam vocat. Helix fructum non gignit. Sed tenues habet palmities, & folia parua, angulosa, & rubra. Hedera omnis acris est, & adstringens. Neros tentat. Flos trium digitorum carptu, facit ad dysentericos, in vino bis die potus. Ambustis cum cærato illinitur. Recensitia folia ex aceto cocta, aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorum & corymborum succus, cum irino vnguento, melle aut nitro, naribus infunditur. Et contra veteres capitis dolores, caput eo cum aceto & rosaceo perfundi vtile est. Purulenti auribus, aut dolentibus cum oleo medetur. Nigræ hederæ succus, aut e poti corymbi corpus infirmant. Mentemque turbant largius sumpti. Acini quinque triti, calfactique in punico cortice cum rosaceo, si instillentur a contraria aure, dolorem dentium mitigant. Denigrant capillum illiti corymbi. Folia in vino decocta illinuntur omnium vlcera generi, etiam si cacoethe sint. Mouet menses triti & subditi corymbi. Ijdem poti post purgationes feminarum, drachmæ pondere concipiendi spem adiununt. Pediculus foliorum melle irrigatus, ac vuluæ inditus, menstrua & partus extrahit. Instillatus succus putrida tædia narium, graueolentiamque emendat, & sanitati restituit. Lachryma hederæ psilothrum est. Illitu pediculos enecat. Succus in aceto potus, contra phalangia prodest.

De Chelidonia.

CAP.

CC.

Helidonium magnam nonnulli Pæoniam vocant, alij Crætam, alij Aubion, alij Glauciam, quidam Philomedion, alij Othonon, Romani Fabium, Galli Thonan, Aegyptij No-

thoth, Daci Crustana. Chelidonia maior, caule est cubitali aut altiore, surculoso. Folijs ranunculi, multis, mollioribus tamē, & colore cæsijs, flore violæ albæ, secundum singula folia prodeunte. In ea succus croci, mordax, acris, & aliquantulum subamarus, grauitèr olens. Radix superne singularis in multa crocea capillamenta fibratur. Siliqua seu corniculati papaueris, tenuis, lingua, in qua semē papauere maius recluditur. Succus in æreo vase, cum melle prunis decoctus, oculis claritatē adfert. Folijs, caule, radice, succus exprimitur ineunte æstate, & ficcatus in vmbra digeritur in pastillos Radix cum aniso & vino albo pota medetur regio morbo, & vlceribus quæ serpunt. Imposita cū vino aut manducata, dentium dolorem sedat. Hoc nomen sibi videtur vendicasse, q̄ aduentu hirundinum exoriatur, & discessu emarcescat. Sunt qui narrant hirundines matres excæcatis pulis adferentes hærbam visū restituere.

De Chelidonia minore. CAP. CCI.

Helidonia minor, quam Tyrinon syluestre aliqui nuncupant, hærbula est stolonibus constans, sine caule, folijs hederæ, multo rotundioribus, & minoribus, teneris, & suppinguis. Radices habet complures pusillas, in granorum tritici modum aceruatim cōgestas. Quarū tres aut quattuor in longitudinē exeunt. Iuxta aquas nascitur. Vis ei acris & fremij modo summam cutem exulcerat. Pforas & scabros vngues eximit. Succus radicibus expressus ad purgandum caput, naribus infunditur. Decoctum eius cum melle gargarizatum vadide caput inanit. Et omnia pectoris vitia extrahit.

De Othonna. CAP. CCII.

Thōnam aliqui maioris Chelidoniæ succum esse aiunt. Alij succum floribus corniculati papaueris expressum. Alij permistos cæuleæ Anagalidis, Hyoscyami & papaueris succos, esse contendunt. Alij Troglodyticæ hærbe succum, quæ Othōna vocatur. Nasci q̄ eam in eo Arabiæ tractu qui ad Aegyptum spectat. Othonna similis Eruce, perforatis crebro folijs & veluti a tinea derosis, squallore obfritis, paucis. Flore croci, latifolio. Quare quidā fremij speciem esse putauerunt. Extractus succus oculorum medicamentis adiicitur, vbi expurgare est opus. Mordet enim & abstergit omnē caliginem, quæ oculis offunditur. Tradunt humorem quēdam ex hærba emanare, qui elotus semotis calculis, in pastillos ad eadem digeritur. Aliqui tamē affirmant, lapidem esse Aegyptium, in Thebaide nascentem, exigua magnitudine, candido colore, gustu cum feruore quodam & adstrictione, mordaci.

DE MEDICINALI MATERIA

De Auricula muris. CAP. CCIII.

Myosotis
varat
yosota alij Myoton, alij Anthilion, alij Alfinen, nonnulli
m Myorthochon, alij Myrtosplenon, Latini muris auriculam
vocant, Aphri Labatholabat. Nomen ideo accēpit q̄ mu-
sculorū aures folijs imitetur. Lucos & sabulosa loca amat, ideo Alfine
dicta est. Ea Helxinæ similis, sed humilior, ac folijs minor. Vim refri-
geratoriam habet. Oculorum inflammationibus conuenienter ex po-
lenta illinitur. Succus eius aurium doloribus instillatur. In totum ea-
dem potest quæ Helxine.

De altera auricula muris. CAP. CCIII.

Impatiens
Vris auricula quā Myosotida vocant. Hærbæ est caulibus
m pluribus ab vna radice, aliquatenus rubentibus, concavis ab
imo. Folijs angustis, oblongis, dorso acuto, nigricantibus, per
interualla assidue geminatis, atq; in mucronem desinentibus, & tenui-
bus cauliculis ex alarū sinu prodeuntibus, flore cæruleo. Radix digi-
tali crassitudine, multis capillamentis fibrata. In summa scolopendrio
similis, sed breuior, minor. Radix illita ægilopia sanat. Sunt qui Hel-
xinen, muris auriculam vocitent.

De Glasto satiuo. CAP. CCV.

Herba satiuæ
varat
Satis satiuæ aliquibus Augion, Magis Arusion, Romanis
i gluta aut glastum dicitur. Glastum quo insectores lanarū vtū-
tur, folium habet plantagini simile, verū pinguius nigriusq;
Cuius caulis duum cubitorū altitudinē excedit. Illita folia tumores
omneis discutiūt. Cruenta vulnera glutinant. Sanguinis profluvia fi-
stunt. Ignem sacrum, phagedænas, putrescentia vlcera & quæ serpunt
sanant.

De Syluestri glasto. CAP. CCVI.

Vara
f Syluestre glastum satiuo simile est. Folia fert maiora, lactuca-
cis proxima, caules prætenues, multifidos, rubicantes. In
quorum cacumine folliculi dependent, quādam linguarum
effigiem referētes, in quibus semē. Flore tenui, luteo. Eadem quæ & su-
pradicta præstat. Potu & illitu lienosis auxiliatur. Sed sciēdum est,
ne tradita errorem pariant, satiuum glastum, luteum florem, tenuiores
multifidosq; ramulos, proferre. In cacumine autem folliculos linguæ
speciem repræsentantes in quibus semen continetur, melanthio simi-
le, caulemq; supra binum cubitorū altitudinem attoli. Syluestre vero
nigriora ferre folia, caulem minorem sed crassiorē. Florem purpu-
reum, aut cæruleum, fructum cruciformem, asperum, in quo semen, fo-
lijs exilibus quinquepartito diuisum.

De Telephio.

CAP.

CCVII.

Elephium aliqui sylvestre semperuiuum, alij portulacam syl-
 t uestrem appellant, Romani illecebram, Aegyptij Anoth,
 Aphri Tirtopurin. Hæba portulacæ similis et caule et fo-
 lijs habens geminas alas, singulis foliorum geniculis inhærentes, a
 quibus rami seni septenive fruticât, a radice referti cæruleis folijs, cra-
 fis, lentis, carnofis. Flore luteo, aut candido. Nascitur, in
 cultis & maxime inter vites. Tempore verno folia
 senis horis illita albam vitiliginem sanant.

Sed postea hordeacea farina illini de-

bet. Perunctam etiam in fo-

le vitiliginem tollunt.

Sed vbi inarue-

runt abster-

guntur

“ “

Pedacij Dioscoridis Anazarbei De me-
 dicinali materia secun-
 di Libri

F I N I S

h. iij.

L. L.

مجلسه ۱۰۰

De Agarico.

CAP. I

2

Vtriq; gustus in initio dulcis, mox in amaritudinē transit Sarmaticæ in aquifolia prouenit. Sunt qui radicē esse plantæ affirmēt. Alij vř fungos nasci in arborum caudicibus, quadā putredine. Gignitur in Galatia Asiæ cōtermina, & Cilicia in cedris. Sed friabile & infirmū. Ad stringendi calfaciendiq; naturā habet. Contra tormina, & cruditates, rupta, præcipationesq; efficax. Datur duobus obolis in vino mulso, febri nō sentientibus. Febriculosis vero in aqua mulsa. Arquatis quoq; suspiriosis, iocineris renūq; vitio laborantibus, dysentericis. Itē si vrina ægre reddatur, si vuluæ strāgulatus vrgeat, si pallor mēbra decolorēt, drachma vna dari solet. Si tabes infestat, ex passo. Si lien ne gociū exhibet, ex aceto mulso. Si dissolutio stomachi est, itā vt cibi tenax non sit, manditur, & si nulla humoris sorbitione deuoratur. Simili modo accide ruřtantibus propinatur. Sanguinis reiectiones sistit, tribus obolis ex aqua sumptum. Facit ad coxendicum & articulorum dolores, & comitiales morbos, si cū aceto mulso, pari pondere assumatur. Mēses ciet. Fœminis, quas inflatio vuluæ vexat, vřtiliter æquali modo datur. Rigores soluit datū ante febrīū significationes. Aliū purgat drachma vna aut altera, si cū aqua mulsa bibatur. Venenorū ātōtū est drachmæ instar, cū diluta potione sumprū. Si serpētes idū vibrarūt, morsūq; subfrixerūt, tribus obolis ex vino potū, mire auxilia tur. In sūma iternis omnibus vitijs cōuenit, pro viribus et ætate datū

LIBER TERTIVS

60

nunc ex aqua, nunc ex vino, ijs ex aceto mulso, alijs ex aqua mulsa.

De Rapontico.

CAP.

II.

Ha aliqui Rheū, aliqui Rhiā, Latini Rapōticū vocāt. Pro-
 uenit in ijs quæ supra bosphorū sunt regionibus, ex quibus
 affertur. Radix nigra Centaurio magno similis, sed minor &
 ruffior, fungosa, aliquantū leuis, sine odore. Optimū habetur quod te-
 redines nō sensit, si gustatu cū remissa adstrictione lentescat, manduca-
 tumq; colorē reddat pallidū, aut ad crocū inclinantē. Id epotū facit ad
 inflationes, stomachi imbecillitatē, & omne genus dolores, ad cōuula-
 sa, lienosos, hepaticos, tormina, ad renū vesicæ & pectoris vitia, aduer-
 sus intēra præcordia, & vuluæ mala, coxendicum dolores, sanguinis
 excreationes, suspiria, singultus, dysenterias, & celiacorū affectus, con-
 tra febriū circuitus, & venenatorū morsus. Datur in singulis valetudi-
 nibus eodē quo agaricū pōdere, & cū eisdē liquoribus. si febris careāt,
 in mulso, sin aliter ex aqua mulsa. si tabē experiūtur, ex passo. si lienis
 exercet, in aceto mulso. Si dissolutio est stomachi, id est cū cibi tenax
 non est, māditur, & sine sorbitione vlla deuoratur. Liuetia lichenasq;
 tollit, cū aceto illitū. Inflammationes omneis veteres ex aqua oblitū di-
 ssipat. Summa eius vis adstringens cum aliquanto calore.

De Gentiana.

CAP.

III.

Entianā aliqui cētauriā radicē, alij Aloē gallicā, alij Narcē,
 alij Chironion, Dardani aloitin, Romani genus aut Cicēdi-
 am, alij Ciminalē vocāt. Huius inuētio prima assignatur Gē-
 tidi Illyriorū regi, a quo cognomētū habuit. Folijs proxime radicē,
 iuglādi plātaginive similibus, subrubris, a medio caule præserti iuxta
 cacumē paulū dissectis, caule cauo, & inani, digiti crassitudine, geni-
 culato, & ex iteruallis maioribus foliato, binū sæpe cubitorū. Semine
 in calycibus lato, leui paleaceo, saris ad sphōdilijs semē accedēte. Radix
 longæ Aristolochiæ, crassa, amara. Nasaitur in sublimibus mona-
 tium iugis, vmbrosis locis, aquosisq;. Vis radicis ex calfa storia, & ad-
 stringens. Contra morsus serpentū, duabus drachmis cū pipere ruta
 & vino pota, auxiliatur. Extracti succi drachma, laterū doloribus, &
 ex sublimi deuolutis, ruptis, & conuulsis, prodest. Hepaticis & stoma-
 chicis, pota cum aqua subuenit. Radix collyrii modo subdita, par-
 tus eijcit. Imposita vt lycium, vulneraria est, & vlcera cuniculatim
 depascentiū medela. Succus præcipue eodē effectu prodest. Oculis in-
 flammatione laborātib; illinitur. Pro meconio collyrijs acribus imi-
 scetur. Radix vitiliginē absterget. Succus extrahēdi ratio hæc est. Con-
 trusa radix quinq; diebus aqua maceratur. Postea in eadem tantisper
 h.iiij.

DE MEDICINALI MATERIA

decoquitur, dum extent radices. Et ubi refrigit aqua, lintheo excolas-
tur. Mox discoquitur, dum mellis crassitudo fiat: Fiſtiliſq; recondi-
tur.

De Aristolochia rotunda. CAP. IIII.

a Ristolochia rotunda nomen ex eo ſibi adoptauit, q̄ exiſtine
tur optime puerperis opitulari. Tria eius genera traduntur.

Vna quæ ſœmina vocatur, folijs hederaceis, præſtâti odore,
cum acrimonia, mollibus, ſubrotundis, multis ab vna radice germini-
bus, prælongiſq; palmitibus, flore candido tanquam pileolo, rubro,
grauiter olente.

De Aristolochia longa. CAP. V.

a Ristolochia longa, maſcula appellatur, nonnullis daſtylitis,
alijs Melocarpos, alijs Teuxinon, Latine Aristolochia, lon-
giore q̄ rotunda folio, tenuibus ramulis, dodrantalibus, flo-
re purpureo, grauiter olente, qui marceſcens in pyri ſimilitudinem
conformatur. Tuberibus radicum rotundis, vt rapum. Longæ vero
radix digiti crassitudinem, & palmi longitudinem implet. Nonnunq̄
paulo grandius adoleſcit. Ambæ colore intus buxæo, gultu amaro, &
grauis. Eſt etiamnum tertia lōga, quæ clematidis vocatur, ramulos ha-
bens tenues, reſertos folijs ſubrotundis, minori ſemper uiuo ſimilibus,
flores rutæ, pleniores, radices longiores, tenues, craſſo cortice odora-
toq; veſtita, vnguētornm ſpiſſamentis conuenientes. Rotunda cæte-
ris venenis reſiſtit. Longa vero aduerſus angues & venena, drachmæ
pondere ex vino bibitur & illinitur. Pota cū pipere & myrrha men-
ſes, partus, & omnia vuluarum onera eiſcit. Eadem efficit ſubdita in-
peſſo. Rotunda ad eadem pollet. Inſuper ſingultibus, ſuſpirijs, rigo-
ribus, lieni, conuulſis, laterum doloribus, pota cum aqua ſingulariter
auxiliatur. Aculeos & ſpicula extrahit. Offium ſquamas illitu adi-
mit. Vlcerâ putrida exſcat, & ſordida expurgat. Caua cum iri & melle
explet. Gingiuas & dentes extergit. Clematidis ad eadē pollere credi-
tur. Viribus tamen inferior eſt. Appellatur a quibuſdam Arariſa
& melecaphrum, ephreſtios, leſtitis, pyxionix, dardanion, iontitis, Gal-
lis theximion, Aegyptijs Sophoeſoph, Siculis Chamæmelon. Italis
malum terræ. Dacis Abſinthium ruſticum. Naſcitur in montibus &
calidis locis aut campeſtribus & petroſis. Ad grauem febrim effica-
xiſ. Si nidore ſubditis carbonibus febricitans ſuffiatur, febris leuabi-
tur. Vulnereſ impoſitu ſanat. Carcinomatibus narium, cum cypiro &
dracunculi ſemine & melle prodeſt. Rigoribus medetur, cocta in oleo
aut adipe ſuillo, illiraq;.

LIBER TERTIVS

61

De Dulci radice. CAP.

VI.

Lycyrrhisam aliqui Ponticā, alij *Glyceraton*, quidam *Symphyton*, alij *Leonticam*, alij *Glycyphyton*, aliqui *Scythion*, alij *Adipson*, alij *Sylithram*, alij *Lybiestafon*, alij *Omænon*, alij *Peenthaomæon*, Latini dulcē radicē appellauere. Plurima gignitur in Cappadocia & ponto. Fruticosa est, ramis binū cubitorum altitudine assurgentibus, folijs lentisci, densis, pinguibus, tætuq; gummosis, flore hyacinthi, fructu pilularum plātani magnitudinis, asperiore, qui filiquas lentium modo habet, ruffas & paruas, radices longis, vt gentianæ coloris buxei, subacerbis & dulcibus, quæ densantur in succū lytij exemplo. Is in arteriæ scabricia efficax habetur. Verum oportet vt liguæ subditus eliquefcat. Aestuātī stomacho, thoraci, ac iocineri conuenit. Sanat vesicæ scabiem & renum dolores cum passo potus. Idem eliquatus sitim sedat. Vulneribus illitus accōmodatur. Cōmanducatus stomacho prodest. Recētis radicis decoctū ad eadem conuenit. Eiusdem farina pterygijs commodissime inspargitur.

De Centaurio magno. CAP.

VII.

Centaurium magnum aliqui *Narcen* vocant, alij *Limnesion*, alij *Maronem*, alij *Plectroniam*, alij *Chironiam*, alij *Linnesion*. Magi *Herculis sanguinem*, Romani *fel terræ*. Folia habet iuglandis, oblonga, viridi brassicarum colore, serrata in ambitu, caulē ceu rumicis, binum aut ternum cubitorum, multis ab radice adnatis, in quibus capita ceu *Papauerum*, in rotunditate oblonga, flos cæruleus, semē *Cnico* simile, floccis quibusdam inuolutū. Radix crassa, grauis, solida, tripedalis, succo prægnans, cum adstrictione aliqua & dulcedine acris, & rubescēs. Amat solum pingue & apricū, ac syluas & colles. Copiosissima est in Lycia & Peloponneso, in Arcadia, Helide & Messenia, pluribusq; locis circa Pholoen, Lyciam & Smyrnam. Radix cōuenit ruptis, cōuulsis, pleuriticis, halitus difficultati, veteri tussi. Sanguinē expuentibus, drachmis duabus trita datur, si febris sit, in aqua, cæteris in vino. Itē ad tormina & vuluæ dolores. Ramēta eius in collyrij formā vuluæ subdita, mēses atq; partus extrahūt. Succus eadē præstat. Vulneribus prodest. Nam recens tusa, aut arida ante madefacta, ea glutinat & coniūgit. Carnes coalescūt, si tusa simul decoquatur. In Lycia succū exprimunt, quo pro lytio vtuntur. Panacia appellata est, quoniam omnia mitiget vitiā, quæ inflammationem minantur, plurimisq; scateat remedijs. Pulsationes vulnerum, vrinæ stillicidia, calculosorum cruciatus, clystere immissa sedat. Legitur matutinis sole ad ortum spectante, hora diei pura cum omnia cōplentur.

DE MEDICINALI MATERIA

De Centaurio minore. CAP.

VIII.

Entaurium minus aliqui Limnethion, alij Elleboriten, alij
 c Amaranton, Magi herculis sanguinem, Latini febrifugam,
 alij Auram, multi radicē, Daci Tulbellam appellant. Limne-
 thion aliqui vocauere, quoniam nigra amet loca. Hærbæ origani aut hy-
 perici similis, caule anguloso, palium excedente, flore lychnidis, e pu-
 nico in purpuram vergente, folijs rutæ prælongis & paruis, fructu tri-
 tico simili, radice pusilla, læui, & superuacua, quæ gustanti amaritudi-
 nem adfert. Hærbæ recens tusa, suo illitu vulnera conglutinat. Vetera
 vlcera purgat & cicatrice obducit. Bilem crassosq; humores per aluū
 exigit, si decocta deuoretur. Ius decocti ischiadicis conuenientissime
 infunditur. Trahit enim sanguinem & dolorem leuat. Succus oculo-
 rum medicamentis perq; utilis. Siquidem cum melle caliginem oculo-
 rum expurgat. In vellere appositus, menses & partus extrahit. Epos-
 tus peculiariter neruorum virijs succurrit. Legitur semine prægnans,
 & diebus quinque madefacta, decoquitur donec superemineat aquæ.
 Mox ubi refriguit lintheolo exprimitur. Et eiecta hærbæ, iterum deco-
 quitur, vsq; dum mellis crassitudinem habeat. Nonnulli eam recentē
 grauidamq; contundunt, atq; succum fistili non picato exprimunt, &
 in sole lignea rude assidue mouentes, inspissant. Quod si quid concre-
 tū faucibus vasis adhærescat, deradunt, reliquosq; humori permiscunt.
 Noctu diligenter operiunt. Namq; ros nocturnus, liquores coalesce-
 re non finit. Quæ autem ficcis radicibus aut hærbis liquamēta expri-
 muntur, decocta vt in Gentianæ mentione retulimus, præparantur.
 Sed quæ ex corticibus humidis, aut contusis hærbis factitantur, in so-
 le, vt ante dictum est, coguntur. Sic e Taphia, sic Mandragora, reli-
 quisq; similibus succus, sic ex acerbis vuis melligo elicitur. Lycium ta-
 men & absinthium, hypocistis & consimilia, decocta eo quo diximus
 modo coguntur.

De Chamæleone albo. CAP.

IX.

Hamæleo albus quibusdā Chrysisceptron, alijs Ixia, Roma-
 nis cardus varin⁹, Aegyptijs Ephæar dicitur, alijs Ephtho-
 sechin. Ixiam ideo aliqui vocauere, q; quibusdā in locis vi-
 scum circa radicem inueniatur. Quo pro mastichæ vtuntur mulieres.
 Folia habet sylibo aut carduo similia, asperiora, acutiora, nigroq; cha-
 mæleone validiora. Caulem non promit. Verū ex medio spinas Echii
 marini, aut Cinnaræ modo, erigit. Flores purpureos veluti pappo-
 rum lanugines emittit. Semen Cnici simile. Radicē in lætis collibus
 crassam, in montosis vero graciliorem, in profundo albam, aliquatenus
 aromaticam, graui odore; dulcē. Quæ pota acetabuli mensura, latas

interaneorum tineas pellit. Bibitur autem in vino austero cum Origani feruēfacti succo. Hydropicis commodissime drachma in vino datur. Etenim eos extenuat. Contra difficultatem vrinæ decoctum propinatur. Hausta in vino serpentium venenis resistit. Occidit canes & fues. Mures item necat subacta cum polenta aut aqua, & oleo madefacta.

De Chamæleone nigro. CAP. X.

c Hamæleo niger quem Pancarpon aliqui, alij Vlophonon, alij Ixiam, alij Cynomazon, alij Ocimoides, alij Cnidion coccon, alij Cynoxyllon, Latini Carduum nigrum aut vernilaginē, Aegyptij Sobel vocant, folijs scolymo similis esset, nisi minora, tenuioraq; ac rubro distincta viderentur. Caulem emittit dodrā talem, crassitudine digitali, subrubrum & in vmbella flores spinosos, tenues, hyacinthi æmulos, versicolores, radice crassa, nigra, densa, interdum exesa, quæ dissecta flauescit, & commanducata mordet. Prouenit in cāpestribus siccis, & cliuosis tractibus, & maritimis. Radix trieta addito attramenti futorii exiguo, cedrino oleo, & axungia, scabiem abigit. Eadem cum sibi sulphur & birumen asciauit, & cocta in aceto illinitur, impetigines absterget. Decoctum collutione dentium dolorem mitigat. Cū pari pipere & cæra oblita radix, dolenti dentia auxiliatur. Radice concisa & in aceto decocta dētes fouentur. Eos quoq; frangit, si scriptorio stylo seruēs admoueatur. Vitia cutis in facie, viriliginēq; cum sulphure emendat. Erodentibus medicamentis ammiscetur. Phagedænas, tetraq; vlcera illitu sanat. Quare Chamæleo vocetur, a varietate foliorum euenit. Mutant enim cum terra colorem. hic viridia, illic albicantia, aliubi cærulea, nonnulsq; rubra inueniuntur.

De Crocodilio. CAP. XI.

c Rocodilion chamæleontis nigri figuram habet. Nascitur in syluosis, radice longa, læui, aliquantū lata, odore vt nasturcij acuto. Feruēfacta in aqua & pota radix, sanguinem copiosum per narces pellit. Datur lienosis, eos euidenter adiuuans. Semen eirundum inest, duplex vti scutum. Quod suapte vi vrinam ciet.

De Labro veneris seu dipsaco. CAP. XII.

d Ipsacum aliqui Crocodilion vocant, alij Chamæleonem, alij Onocandion, alij Veneris Lauacrum, Romani labrum veneris, alij carduum veneris, Aegyptij Sefeneor, alij Chir, alij Meleta, Daci Sciamam. Aculeatarum generis est. Caulem habet altū, spinis horridum, folia lactucæ, aculeata, prælonga, bullas intus & extra spinosas in dorsi medio, binis folijs geniculatim caulem amplectentibus, concauo alarum sinu, in quo imber aut ros asseruetur, vnde

DE MEDICINALI MATERIA

dipsaci quasi sitientis nomen traxit. In cacumine caulis, singula furculis capitula insunt, oblonga, echinata spinis, quæ arefacta cãdida spectantur, dissecta quæ medullatenus, vermiculos ostendunt. Sanat rimas scdis fistulasque, si tusa & decocta in vino radix, vsque dum sit crassitudo cæra, immitatur. Medicamentum ærea pixide recondendum. Aiunt forsimulationibus verrucisque penilibus remedio esse. Vermiculi capitulorum in folliculo alligati, collo aut brachio appensi, produntur quartanis febribus remedio esse.

De Spina alba.

CAP.

XIII.

Pina alba quam Agriocinnaram, alij Donacitin, alij Erythra sceptrum vocant, Romani Spinam albam, aut Regiam, alij Cardum Ramptariũ. Nascitur in montibus & syluosis. Folia albi Chamæleonis, angustiora, & candidiora, aliquantum hispida, & aculeata, caulem supra bina cubita altum, digiti magni aut pollicis crassitudine, albicantem, intus cauum. In cacumine capitulum inest spinosum, echini marini æmulum, sed minus, & oblongum. Flores purpurei, in quibus semen ceu Cnicum, sed rotundius. Huius radix pota, cœliacis, stomachicis, & ijs qui cruenta extullunt, efficax est. Vrinam cit. Tumoribus illinitur. Decocto eius dentes in dolore collui prodest. Epotum semen conuulsis infantibus, & a serpente demorsis auxiliatur. Gestatum pro amuleto serpentes abigere traditur.

De Spina arabica.

CAP.

XIIII.

Rabicæ spinæ quæ Acanthis aliquibus dicitur, naturam albæ spinæ similem esse constat. Ipsa siquidem stringit. Ad sanguinis reiectiones, mensium abundantiam, cæterasque fluxiones radix etiamnum valet. Prouenit in asperis.

De Carduo.

CAP.

XV.

Arduus græce Scolymos, alias Pherusa, alias Pyracætha nominatur, in Aegypto Cnus. Folia Chamæleonis habet, aut albæ spinæ, nigriora, & crassiora. Caulẽ longum ædit, foliosum, capite spinoso. Radice nigra & crassa, quæ illita graueolentiam alarum totiusque corporis emendat. Item si decocta in vino bibatur, Copiosam autẽ vrinam sœtidamque expellit. Hærbæ cum recens tenescit, in olera asparagi modo transit.

De Poterio.

CAP.

XVI.

Oterium aliqui Phrynion, Iones Neurada, aliqui Acideton vocat. Largefruticat, cortice obductum tenui, spinis horridum, lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lentis, tenuibus, tragacanthæ proximis, folijs paruis, rotundis, flore exiguo, cãdidi coloris. Seminis nulli vsus, sed gustu acuto & odorato. Nasci

tur in aquosis & collibus. Radices demittit binum ternumve cubito-
rum neruofas, & firmas. Quæ proxime terram recisæ dant succum gū-
mi similem. Tusæ præcisus neruis & vulneribus glutinandis illinitur.
Decoctum quoq; eius neruorum affectibus prodest.

De Acanthio.

CAP.

XVII.

a Canthium albæ spinæ simile, folijs aculeatis per extremita-
tes, & lanugine araneosa obductis, quæ collecta & in vnum
aceruata bombicis effigiem præbent. Folia vel radices ad re-
media opisthoroni bibuntur.

De Acantha.

CAP.

XVIII.

a Cantham aut Hærpacantham, quidam Melamphyllon, Ro-
mani Pederotam, aliqui Topiariam, alij Mamolaria, qui-
dam Cræpulam vocât. Nascitur in hortis, petrosis & riguis.
Folia habet multo lactucaceis latiora, & longiora. Erucæ diuisura ni-
gricantia, pingua, læuia. Caulē binum cubitorum digitali crassitudi-
ne, læuem prope verticem ex interuallis circūdatū foliolis paniculas
oblōgas referētibus, hyacinthi similibus. E quibus flos prodit albus,
semen oblongum, luteum, caput thyrsi specie. Radicibus nritur lon-
gis, mucosis, rubris, & glutinosis. Quæ visis igni & luxatis artubus
illita subueniunt. Potæ vrinam ciunt, sed aliū cohibent. Ruptis, cō-
uulsis, tabem sentientibus, mire profunt.

De Syluestri spina.

CAP.

XIX.

c St & syluestris spina carduo similis, aculeata, breuior q̄ quæ
in hortis satiq; proueniat. Cuius radix ad eadem ad quæ su-
perior pollet.

De Anonide.

CAP.

XX.

a Nonis quam aliqui Onorida appellant, ramos habet fruti-
cosos, dodrante maiores, frequentibus geniculis cinctos, ca-
uīs alarum multis, capitibus rotundis, folijs lenticulæ, pusil-
lis ad rutæ aut pratenfis lotifolia accedentibus, subhirsutis, odoratis,
non iniucunde olentibus. Muria conditur anteq̄ spinosa fiat. Cibis
gratissima. Rami acutioribus spinis & veluti durioribus aculeis hor-
rent. Radicem mittit candidam. Quæ excalfacit & extenuat. Huius
cortex ex vino potus vrinam ciet. Calculos cōminuit. Margines vl-
cerum erodit. Radix cum decoquitur in posca, dolorem dentium col-
lutione mitigat. Decoctū eius potu hæmorrhoidas sanare creditur.

De Leucacantha.

CAP.

XXI.

1 Eucacanthā quidā Polygonaton, alij Phyllon, alij Ischia-
da vocant, Romani Spinam albā. Radice cyperi valida
& amara. Quæ manducata dolorem dētium sedat. Veteri la-



DE MEDICINALI MATERIA

terum dolori, atq; ischiadicis prodest, decocto cyathis tribus ex vino poro. Eadem ruptis & cōuulis medetur. Radicis epotus succus eodē præbet effectus.

De Tragacantha. CAP. XXII.

Tragacanthæ radix lata & lignosa summo cespite nititur, surculos humiles, robustos, latissime fundens, in quibus minuta folia nonnunq̃ tenuia exoriuntur. Quæ sub se spinas albas, rectas & firmas oculunt. Est etiamnū Tragacantha lachryma quæ, vulnerata radice manans, concreuit. Præstat pellucens, gracilis, sincera & subdulcis. Cutis spiracula ut gūmi obstruit. Huius increbuit usus ad oculorum medicamenta, ad tussim, exasperatas fauces, retusas voces, cæterasq; destillationes, cū melle in delinctu. Subdita quoq; liguæ liquefcit. In passo madefacta drachmæ pondere bibitur, contra renum dolorem, & vesicæ rosiones, mixto cornu cerui vsto & eloto, aut scissi aluminis momento.

De Eryngio. CAP. XXIII.

Eryngion aliqui Eryngen, alij Caryon, alij Gorginion, alij hernion, alij origanū, chlounion, alij Myracāthon, alij Moly, Aegyptij Crobyson, Magi Siserion, Romani capitulū martis, Daci Sicupnoex, Hispani Centumcapita, Aphri Cherdam, alij Oriam Chloem, alij Chida appellant. Aculeatarum generis est. Cuius folia in principio, sale condita, in cibos recipiuntur. Lata autē sunt & extremo ambitu aspera, gustu aromatica, quæ cum adolefcunt per multas caulium prominentias spinose inhorrescunt. In quorum similitudinibus globosa capitula, durarum acutissimarumq; spinarum ambitu stellatim circumuallantur, quorū colos alias viridis, alias albus, interdum cæruleus inuenitur Radix oblonga, lata, foris nigra, interne candida, pollicis crassitudine, odorata. Nascitur in asperis & campestribus. Vim habet calfactoriam. Pota mēses & vrinas pellit. Tormina inflatione q; discutit. Contra iocinerum vitia, serpentū morsus, & hausta venena, cum vino prodest. Bibitur aduersus plurima, cum seminis pastinacæ drachma vna. Appensa illitave tubercula discutere proditur. Pota cum hydromelite radix, opisthotonicis & comitialibus medetur.

De Aloe. CAP. XXIII.

Aloe aliquibus Amphibion, alijs Herminion, alijs Eryngion, alijs Tragoceros, Romanis Aloa, Barbaris Aloe dicitur. Cuius folium scyllæ similitudinem habet, crassum, pingue, latum, rotundum, retrorsus pandum. Folia utrinq; gerit, ex obliquis spinosa, rariuscule striata, breuia. Caulis emittitur non dissimilis

antherico. Flos albus. Fructus hastulæ regiæ cognatus. Graui tota est odore, & gustu amarissima. Radice vna ceu palo in terram depasta. Plurima præpinguisq; in India gignitur, ex qua coactus succus adferatur. Nascitur etiam in Asia & Arabia, in insulis quibusdam & maritimis vt in Andro, minime succo extrahendo idonea, sed ad glutinanda vulnera sane q̃vtilis, si detrita illinatur. Duo succi genera. Quoddā harenosum, quod fidens crassamentum purissimæ esse videtur. Alterum ad iocineris imaginem vergit. Eligi debet syncæra, quæ nihil doli sensa sit, nitida, calculorum experts, ruffi coloris, friabilis ac iocineris modo coacta, facile liquecēs, eximæ amaritudinis. Improbatur nigra & fractu cōtumax. Guinmi eam adulterant, quod depræhēditur gustu, amaritudine, & valido odore. Eoq; argumento q̃ digitis friata non ad minima vsq; frusta resoluitur. Nec defunt qui Acaciam immisceant. Natura eius est spissare exiccare, somnum allicere & corpora densare, aluū resolvere. Stomachum repurgat binum cochlearium mensura, in aqua frigida aut lacte pota. Sanguinis reiectiones sistit. Regium morbum purgat, tribus obolis ex aqua, aut drachmæ pondere in potu. Deuorata cum resina, aut cum aqua vel melle cocto sumpta, aluū soluit. Purgationis perfectæ causa tribus drachmis sumitur. Alijs purgatorijs medicaminibus ammixta, præstat vt minus stomachum infestent. Sicca glutinandis vulneribus inspargitur. Vlcera ad cicatricem perducit, cohibetq;. Eadē peculiariter exulceratis genitalibus medetur. Disrupta infantibus iūgit. Cōdylomata rimasq; sedis ex passo sanat. Hæmorrhoidum abundantiam & sanguinis eruptiones sistit. Pterigia ad cicatricem ducit. Līuores & insignita, ex melle tollit. Priuatim scabras lippitudines, pruriginēsq; angulorum, permulcet. Dolorem capitis sedat temporibus & fronti illita, ex aceto & rosaceo. Capillum fluentem continet, cum vino. Tonillis, gingiuis, & omnibus oris vlcēribus, cum melle & vino proficit. Oculorum medicamentis torretur, in munda & candenti testa, pennaq; subinde versatur, vt possit æqualiter torreri. Lauatur vt quod sit harenosissimū, tanq̃ inutile subfidat, & leue ac pinguiissimum assumatur.

De Absinthio.

CAP.

XXV.

absinthii aliqui Bathy picron, Aegyptij Somi. Romani ab
a absinthii. Herba vulgo cognita. Præstatius in ponto & Capadocia. In monte Tauro nascitur. Vim habet calfaciendi & adstringendi. Bilem expurgat, quæ & stomacho & ventri inhæsit. Vrinam cit. Crapulam præsumptum arceat. Ad inflationes ventris, & stomachi dolores prodest, cum feseli & nardo gallico potum. Fastidia discutit. Arquatos sanat madefacti dilutū, aut decocti ius, cotidie

DE MEDICINALI MATERIA

tribus cyathis haustum. Menfes cit potum, aut cū melle appositum. Contra fungorum strangulationes cōuenienter ex aceto bibitur. Ad uersatur ixiæ venenis cū vino. Itē cicutæ, & muris aranei moribus, & draconi marino. Anginæ eo cum melle & nitro perunguntur, & epinyctides ex aqua. Ad fugillata & oculorū caligines ex melle illinitur. Item auribus si manat sanies. Dentium auriumq; dolores decoctū vaporis suffitu compescit. Decoctum in passo dolentibus oculis oblinitur. Item præcordijs & iocineri, tritum cū cærato cyprino. Stomacho quoq; longa valetudine laborāti cū rosaceo. Cum ficis autem, aceto & erui farina, aquæ inter cutē lienosisq; subuenit. Vinum ex eo fit, quod absinthiten vocāt, præsertim in Propontide & Thracia, quo ad antedicta vtuntur, cum febris carent. Alioquin in æstate propinant & acceptam huic vino incolumitatem referunt. In sparsum arcis Absinthium, vestes ab erodentiū iniuria vindicat. Culices eo & oleo perunctis abigit, & a corpore arcet. A tramentum librarium diluto eius temperatum, literas a murium erosione tuetur. Existimatur liquamentum eisdem præstare effectus. Attamen potionibus improbatur, quoniam stomachum male habet, & capitis ciet dolorem. Sunt qui cocta Amurca liquamentum adulterant.

De Marino Absinthio. CAP. XXVI.

Absinthium marinū quod aliqui Seriphum, Latini Centoniscum vocant, copiosissimum in Tauro mōte, iuxta Cappadociā & in Taphysiri Aegypti gignitur. Quo Asiatici pro Oliuæ ramo vtūtur. Hæba est tenuis, Abrotoni parui similitudine, referta minutulis seminibus, subamara, stomacho inimica. Ea graui ter olet, & cum quadam calfactione adstringit. Id per se aut cū Oryza coctum interaneorum animalia, teretesq; tineas, adiecto melle enecat. Aluū læuigat. Cum edulio autem vel lenticula decoctum eadem præstare potest. Pecora maxime pinguescunt hoc pabulo. Tertium genus absinthio assignatur, quo Galatia alpibus finitima scætet. Id patrio nomine Santonicum vocant, regionis in qua nascitur cognomēto, absinthio non dissimile, verum subamarum est, non adeo seminis fecundum. Eadem quæ Seriphium potest.

De Abrotono. CAP. XXVII.

Abrotonum alij Abutonon, alij Absinthium, alij Heraction, alij Cholopæon, alij Absinthiomenon, alij Theliphthoricon, alij Procampylon, Magi Neura phœnicos, alij Cynanchiten, Romani Absinthium ponticū, nonnulli Thelythamnum, alij Glycyn ancona vocant. Duorum est generum. Fœmina quadam arboris specie fruticans candicat, circum ramulos folijs seriphi modo mi-

nutim incisus. Floribus referta est, comantibus in summo fulgore auri corymbis. Quod per æstatem prodijt, suauiter olet, cū grauitate quadam & amaro gussu. Id genus Siculum esse constat. Alterum mas vocatur, sarmentosum, tenui semine vti Absinthium. Plurimum in Capadocia gignitur & Galatia Asiatica, atq; in Syria Hierapoli. Cruadū semen, tritū & feruefactū ex aqua, in potu auxiliatur, orthopnoicis, conuulsis, ruptis, coxendicibus, vrinæ angustijs, mēsis suppresis, aut remorantibus. In vino potum exitialium venenorum antidotum est. Rigoribus ex oleo illinitur. Serpētes & substratu & nidore fugat. Contra i&us eorum cum vino potum prodest. Priuatim efficax contra scorpionum & phalangiorum venena. Oculorum inflammationibus commode illinitur, cum cotoneo cocto aut pane. Tritum cum farina hordeacea, decoctumq; tubercula discutit. Irini compositionibus ammiscetur.

De Hyssopo.

CAP. XXVIII.

h yssopum aliqui Later vocāt, alij Cassialam, Aegyptij Peselem. Hærbæ nulli non cognita. Duū generū est, montanū & hortense. Optimum est Ciliciū. Vim habet extenuadi & calfaciendi. Decoctum cū ficis, aqua, melle, & ruta, potūq; peripneumonici, diuturnæ ruffi, suspiriosis, destillationibus & orthopnoicis auxiliatur. Tineas enecat. Idem facit si cum melle delingatur. Crassum humorem per aluum extrahit, decoctum ex aceto mulso epotum. Ad subducendam aluum cum ficis viridibus detritis mādatur. Vehementius addita Iri, Cardamomo, aut Irione deiicit. Colore in corpore fouet. Lienī, & aquæ inter cutem, cum fico nitroq; inflammationibus quoq; ex vino illinitur. Cum feruente aqua impositum sugillata discutit. Cū decocto ficorum optime anginis gargarizatur. Decoctum cum aceto dentium dolorem in collutione sedat. Inflationes auricularum vaporis suffitu discutit.

De Stichade.

CAP.

XXIX.

f Tichas quam aliqui Syncliopa, alij Alcibiadem, alij Pantonion, nonnulli Styphoniam, Aegyptij Suphlo, Magi Pythonis oculum, Romani Sciolebinam vocitant, iuxta Galliā in insulis eiusdem nominis, e regione Massiliæ gignitur, vnde cognomentū accēpit. Hærbæ tenui semine, coma Thymi, longiore folio, subamara gustu, & aliquantum acris. Cuius decoctum Hyssopi modo ad pectoris vitia efficax est. Antidotis miscetur. Viscera omnia & vniuersum animantis habitum extenuat.

DE MEDICINALI MATERIA

De Origano.

CAP.

XXX.

o Riganum Heracleoticum, quod & Cornelion vocant, foliū habet hyssopo non dissimile, vmbellamq; non in rotæ specie orbiculatam, sed veluti multifidam, semine in summis virgis haudquaquam denso. Excalfacit. Vnde decoctum cum vino potum demorsis a serpente conuenit. Si cicutam aut meconion hauserunt, ex passo, si gipsum aut ephemeron, ex aceto mulso propinatur. Ruptis, conuulsis, hydropicis cum fico esui datur. Aridum acerabuli mensura potum in aqua mulsa, atros humores per aluum extrahit. Menses ciet, & tussi cum melle linctum medetur. Ad pruriginem, pforas, regiumq; morbū decocti ius in balneis prodest. Succus virentis tōfillas, vuā, & oris vlcera sanat. Et per nares ex oleo irino infusum trahit. Auriū dolores cum lacte mulcet. Cōficitur ex eo & cepis & rhois frutice quo ad obsonia vtuntur, vomitorium medicamentum, his omnibus in cupreo vase per tricenos dies insolat, dū caniculæ sydus flāgrat. Hærbæ autem substratu serpentes fugantur.

De Onitide.

CAP.

XXXI.

q Væ Onitis appellatur, cā didiore est folio, nō dissimilis hyssopo. Semen veluti coniunctos corymbos habet. Vis ei Origani Heraclei, sed multo inefficior.

De Syluestri Origano.

CAP.

XXXII.

f yluestre Origanum aliqui Panaces heraclion, alij Cunylam vocant, ex quibus est Nicāder Colophonius. Folijs est Origani, ramis tenuibus palmum altis in quibus vmbellæ anethi insunt. Flores candidi. Radix tenuis, superuacua. Peculiariter percussis a serpente, folia & flores ex vino poti, auxiliantur.

De Tragorigano.

CAP.

XXXIII.

t Ragoriganū tenuis frutex est, syluestri Serpyllo aut Origano similis, folio & ramulis. Quibusdam in locis virentius inuenitur, & latioribus folijs, satis glutinosum. Alterū exilibus furculis, ac tenuibus folijs, quod aliqui prassium vocauerunt. Optimum est Ciliciū, & Cretense, & Smyrneum, & in Chio Cooq; proueniens. Omnia excalfaciunt. Vrinam cient. Aluo accommodantur. Decocto potu bilem deiciunt. Lienosis ex aceto bibere prodest. Contra pota ixiæ venena in vino bibuntur. Menses trahunt. Peripneumonicis, tussientibus, ex melle in eclegmate dantur. Grata ac mitis eorū portio est. Quare cibum fastidientibus, & stomacho acide ructanti, imbecilloq; traditur. Item si a maritima iactatione nausea & æstus præcordiorum excitetur. Tumores vero cum polenta discutiunt.

LIBER TERTIVS

66

De Pulegio.

CAP. XXXIIII.

g Lichona Græci aut blechroon, alij Arsencañtho, Latini Pulegium vocant, Galli Aluolum, Aphri Apoleiũ, Quidam Galisopsum. Hæba vulgaris notitiæ. Extenuat, calfacit, decoquit. Menstrua, secundas, ac partus eiicit. Pulmonis vitia ex melle & aloë potum extrahit. Cõuulsis auxiliatur. Nauseas stomachiq; intercisiones, ex posca permulcet. Atram bilem per aluũ exigit. Bibitur in vino vtilissime contra serpentium morsus. Defectos animo recreat, cum aceto naribus obiectum. Gingiuas arefacti cinere corroborat. Illitum cum polenta inflammationes omnes sedat. Podagris per se subuenit, impositum vsq; dum rubescat locus. Cum cærato varos exringuit. Lienosis cum sale vtiliter illinitur. Decodum eius ablutas pruriges mirigat. Conuersas vuluas corrigit. Cõtra inflationes duriciasq; vuluæ, in defectiones cõueniẽter adiicitur. Vocant aliqui Blechona, quoniam dum floret gustatum a pecoribus, balatum concitat.

De Didamo.

CAP.

XXXV.

d Idamum, aliquibus syluestre Pulegium vocatur, alijs Embastron, alijs Belouacos, alijs Artemedeion, alijs Cretica, quibusdam Ephemeron, nonnullis Eldia, aliquibus Belotoscos, aut Dorcidion, aut Helbunion, Romanis Vstilago rustica. Cretensis hæba est, acris, læuis, Pulegio similis, sed maioribus folijs, quæ tomento quodam spissaq; lanugine pubescunt. Florem nullum aut semen profert. Præstat omnia quæ satium Pulegiũ, sed efficacius multo. Nõ potum modo sed appositum quoq; aut suffitum, defunctos paratus eiicit. Produnt in Creta capras sagittis percussas, huius hæbæ passu, eas excutere. Purgandi vim habet succus illitus, aut cum polenta tritus. Hæba impactos pedibus reliquove corpori aculeos, illitu refugit. Ad lienis dolorem efficax habetur. Siquidem ipsum imminuit. Metunt semen æstate & autumno. Radix eius gustu calfacit. Partus accelerat. Succus cum vino potus, contra serpentium morsus præfidio est. Tãta hæbæ facultas est, vt olfacta abigat bestias, quæ venenato iñsũuiunt, appensaq; exanimet. Vulneribus ferro illatis, & venenatis moribus, infusus succus præsentaneo est remedio, si etiã ab instillatione statim in potu assumatur.

De Pseudodidamo.

CAP.

XXXVI.

q Vod pseudodidamum vocant, multis in terris nascitur ante dido simile, sed minus q̃ illud acre. Eisdem effectus præbet. Sed ineffacius multo.

DE MEDICINALI MATERIA

De Cretenſi Diſtamo. CAP. XXXVII.

Eſtetur a Creta alterū Diſtami genus, folijs Siſymbrij, ramis
 d maioribus. In quibus flores ſylueſtris Origani, nigri, mol-
 les. Odor foliorū iter Siſymbriū & ſaluiā iucūdiſſimus. Eſſi-
 cax ad eadē, ſed vehementius nares ferit. Miſcetur emplaſtris & medi-
 caminiſ quæ aduerſus ſerpētium iniurias cōſingūtur, theriaca vo-
 cant.

De Saluiā. CAP. XXXVIII.

Leliſphacō alij Elaphoboſcon, aliqui Phacon, alij Cioſmin,
 e alij Phagnon, Aegyptij Becion, Romani Saluiā vocāt. Fru-
 tex eſt ramoſus, lōgus, virgas habēs quadrangulas, & canas.
 Folia mali coronei effigie, ſed longiora, aſperiora, craſſiora, & quæ ſen-
 ſim attritarū quaſi veſtiū ſcabriciē referant, hirsuta, ſubalbida, perq̃ iu-
 cūdo odore, ſed graui. Semen ſummis in caulibus ſylueſtri Ormino ſi-
 mile gerit. In aſperis naſcitur. Menſes cit & vrinas decoctū foliorū ra-
 morūq; potū. Partus extrahit. Paſtinacæ marinæ iſtibus auxiliatur.
 Capillos denigrat. Vulnerū ſanguinem cohibet. Tetra vlcera purgat.
 Teſtiū pruritus ſedant rami foliaq; ſi decocto eorum foueantur

De Menta. CAP. XXXIX.

Edyosmon ſatiuū alij Minthā, alij Calaminthan, Latini Mē-
 h tam vocant, alij Nepetā, Aegyptij Tis, alij Perxo, alij Ma-
 cetho. Cognita hærba eſt. Calfaciendi, adſtringēdi atq; exic-
 candi vim habet. Siſtit ſanguinē pote ex aceto ſucco. Tineas in ven-
 tre teretes enecat. Venerē ſtimulat. Singultus, vomitiones, choleraſq;
 ſedant, terni ramuli cū acidi granati ſucco poti. Suppurationes diſcu-
 tit, ſi cum polēta illinatur. Impoſita fronti capitis dolores mulcet. Mā-
 mas ſi tendantur, aut lacte turgeant, compoſcit. Cū ſale canū morſibus
 illinitur, Auriū doloribus cū aqua mulſa ſubuenit. Vuluæ ante coitū
 admota, conceptioni reſiſtit. Linguae ſcabriciē cōſtriſta læuigat. Coi-
 re lac denſariq; in caſeū nō patitur, ſi folia potionibus lactis immergā-
 tur. In ſūma ſtomacho vtilis eſt. Et in condimētis peculiarē gratiā ha-
 bet.

De Mentaſtro. CAP. XL.

ylueſtrem Mentam Latini Mentaſtrum vocant, hirsutiore
 f folio, & prorſus maiore q̃ Siſymbrij, grauiori odore. Quare
 minus ad ſanorum vſus expetitur.

De Calaminthā ^{nepeta} CAP. XLI.

X Calaminthā generibus, quædam montibus familiaris, ſo-
 e lia Ocimi habens, incana, ſurculos aridos, & caules angu-
 loſos, purpureum florem. Altera Puſilegio ſimilis eſt, ſed ma-
 ior. Quam ſylueſtre Pulegium ideo appellarunt, q̃ odore ipſum æmu-
 letur. Nepetam Latini vocitant. Tertia Mentaſtro cognata eſt, folijs

oblongioribus, caule & ramis maioribus q̄ superioris, sed viribus inefficacior. Omnium folia gustu feruentia & acria. Radix superuacua. Nascitur in cāpestribus, asperis, & aquosis. Potu aut illitu demorsis a serpente opitulatur. Decoctum potu menses & vrinas expellit. Ruptis cōuulsis, orthopnœæ, torminibus, cholera, rigoribusq; auxiliatur. Regium morbum expurgat. Præsumpta in vino venenis resistit. Tineas cæteraq; interaneorū animalia, cū sale & melle pota, enecat. Necfescus cocta crudave si teratur. Elephāticos esitata adiuuat, si postea serū lactis ebibatur. Folia detrita si in vellere subijciantur, mentes extrahunt, & partus enecant. Accensa aut substrata serpētes fugāt. Nigris cicatricibus candorem reddunt, in vino cocta & illita. Sugillata tollunt. Calamintha ischiadicis imponitur vt concretum humorem euocet summam cutem exurens. Vermes necat succus auribus instillatus.

De Thymo.

CAP.

XLII.

Hymon quidā Cephaloton, alij Epithymum, alij Thyrsion, Latini Thymum. Aegyptij Stephanen, Daci Mosulam.

Thymum ab omnibus cognoscitur, furculosus frutex, exilibus folijs & angustis circūdatus, capitulis in cacumine flore purpureo refertis. Gracili solo & petroso prouenit. Vim habet hanc, vt cū sale & aceto potum, pituitā per aluū detrahat. Decocti ius prodest orthopnoicis, & anhelatoribus. Tineas ventris exigit. Menses, partus, & secundas pellit. Vrinæ ciet. Cū melle in eclegmate faciles facit excreationes. Recētes tumores discutit cū aceto illitū. Concretum sanguinem dissoluit. Verrucas thymi colorem reddentes, penfilesq; tollit. Ischiadicis cum vino & polenta impositum subuenit. Hebetibus oculis in cibo prodest. Perq̄ vtile pro condimento, dumtaxat ad vsus eorum, qui recte valent.

De Satureia.

CAP.

XLIII.

Satureia nota est. Gignitur in asperis locis & tenui solo, Thymo similis, minor tamen & tenerior. Desertis picam florū plenam, diuq; permanentem. Eadē potest quæ Thymum, si modo confirmili sumpritetur. Aptus sanis vsus. Est etiamnum quædam satrua, syluestri prorsus minor, quæ propter mitiorem acrimoniā commodus in cibos recepta est.

De Serpyllo.

CAP.

XLIIII.

Erpyllum aliqui zygin syluestre, alij Polion vocāt, Aegyptij Meruopyū, Latini Serpyllū. Duorū generū est. Hortēsiū odore Sampsucū imitatur, atq; in coronas addi solet. Cui a serpēdo nomē inditū est, quoniā si qua eius particula terrā attingat,

DE MEDICINALI MATERIA

inibi radices demitter. Folia & ramulos Origani habet, sed candidiores. In maceris multo proærius affurgit. Sylvestre zygis appellatū non serpit, sed in altitudinem increfcit, ramulos ædēs tenues, furculosos, folijs refertos lōgioribus q̄ Rutæ, & durioribus, angustis. Flores iucunde olent, gustanti acres. Radicis nullus vsus. Nascitur in petris satiuo efficacius, atq; magis excalfaciēs, & ad medendi vsum aptius. Menses trahit. Vrinā potu ciet. Torminibus, ruptis, vulvis & iocineris inflammationibus, auxiliatur. Et aduersus serpentes potu illitue. Capitis dolores mulcet coctum adiecto rosaceo, & madefactū in aceto. Maxime vero Phreniticis & lethargicis conuenit. Cruentos vomitus sedat, succus drachmis quatuor ex aceto potus.

De Sampluco.

CAP.

XLV.

Ampfucum aliqui nomināt Amaracū, alij Triphyllon, alij Agathides, alij Cnecion, alij Acapnon, Pythagoras Thraëben, Aegyptij Sopho, Armenij Myuron, Magi Ichrei asinum, aut Hecigonon Ifidis, Romani Maioranā. In Cypro & Cyziceno laudatissimū. Secundū sibi locū vendicauit Aegyptiū. Amaracum gens Sicula & Cyzicena appellat. Hæba est ramosa, per terrā repens, folijs eius calaminthæ quæ tenui folio cōstat, letophyllos appellatur, hirsutis & rotundis. Suauissimū odorem spirat, ideo coronis inferitur. Vis eius excalfaciens. Succus decocti potus conuenit incipiētibus hydropicis, & ijs quos vrinæ difficultas aut tormina excruciant. Illita ex melle arida folia, sugillata tollunt. Menses subdita in pello trahunt. Cōtra scorpionis idū ex aceto & sale illinuntur. Luxatis tumoribusq; cærato excepta imponuntur. Aduersus oculorum inflammationes, tumoresq; cum polline polentæ illini prodest. Acopis malagmaticsq; calfaciendi gratia commiscetur.

De Sertula campana.

CAP.

XLVI.

Ertula cāpana laudatissima in Attica & Cyzico & Carthagine nata. Cuius color vicinus est croco, boni odoris. Nascitur & in campania circa Nolam, colore in luteum languescēte, odore infirmo. Vim habet adstrictoriam. Inflammationē omnē emollit, præsertim quæ in oculis, vulua, sede aut testibus erūpat, si ex passo cocta illinatur. Interdum autē addito oui luteo assato, aut fœno græci farina, lini semine, aut polline, aut capitulis papaueris, intybove. Recentes meliceridas per se cū aqua, & vlcera manātia in capite, illita cum creta chia, vino, aut galla sanat. Stomachi dolores & cruda & cocta cū aliquo ex antedictis leuat. Doloribus aurium mitigandis cruda ex passo instillatur. In aceto aut rosaceo madefacta, capitis dolorem lenit.

LIBER TERTIVS

68

De Maro.

CAP.

XLVII.

Arum aliqui Origanida, aut Hysobrion vocant. Hærbæ cognita vulgo, surculosa, flore Origani, folijs multo cãdidioribus, flore odoratiore. Vim habet hysymbrio cõsimilem. Substringit enim & modice calfacit. Qua de causa illitu serpentia vlcera fistit. Et in calidas illiriones additur. Iuxta Magnesiã & Traleis copiosissima gignitur.

De Ocimaistro. CAP. XLVIII.

Cinos aut Aconos a Græcis dicitur ab alijs sylvestre basilicum. Latinis Ocimastrũ tenui siccoq; ramulo hærbæ, Ocyamo similis, odorata. Sed hirsutior. Qua coronæ factitatur. A nonnullis olitoribus colitur. Menses & aluũ pota fistit. Illita panos ignemq; sacrum sanat.

De Bacchare.

CAP.

XLIX.

Accharis hærbæ fruticosa, quæ in coronas additur. Cuius folia aspera sunt, media violæ & verbasci magnitudine. Caulis angulosus, cubiti altitudinem petens, adnatis appendicibus aliquantulum asperis, flore purpureo subalbicãte, odorato. Radicibus veratro nigro similibus, quibus odor inest Cinnamomo proximus. Asperum squallidumq; solum amat. Radix in aqua decocta ruptis, vulvis, præcipitatis, spirandi difficultati, salutaris. Item diuturnæ tussi & vrinæ difficili. Menses pellit. Contra serpentium morsus vtilissime datur in vino. Recens radix apposita partum extrahit. Puerperis eius decoctum in defessionibus prodest. In diapsmata vtiliter inseritur, iucundi odoris gratia. Folia utpote quæ adstringant, capitis doloribus illitu prosunt. Oculorum inflammationibus, mammis tumensibus a partu, ægilopijs incipientibus, ignibusq; sacris auxiliatur. Odor somnum gignit.

De Ruta

CAP.

L.

Vta duplex, montana quam aliqui Rhyten montanam vocant, et hortensis quam Aegyptij Epnubum, Syri Armala, alij Besafa, Aphri Churma, Mõtana sylvestrisq; acrior est & in cibis dãnata. Satiua vero quæ sub arbore ficus enascitur, magis in cibos admittitur. Vtraq; vrit, calfacit, exulcerat. Vrinã ciet. Mēstrua pellit. Aluum fistit potu cibove. Letalium medicamentorũ antidotũ est, si semẽ ex vino acetabuli mēsurā ebibatur. Folia per se præsumpta, aut cũ nucẽ iuglãde aridisq; ficis, inefficaces venenorũ vires reddunt. Contra serpentes simili modo sumere conuenit. Genituram cibo potu extinguit. Cum anetho sicco decocta, tormina sedat. Facit ad peñstoris laterumq; dolores, difficultatem spirandi, tusses, pulmonis inflammationem, coxendicum articulorumq; cruciatus, & rigores febrium

i. iiii.

DE MEDICINALI MATERIA

circuitu repetentes, pota vt antedictum est. Item ad inflationes coli, vuluæ, recti& intestini, decocta & imposita. Fœminas vuluæ strangu-
latu liberat, si a genitali sede tenus cum melle subiiciatur. Feruesceta
ex oleo & pota vëtris tineas excutit. Articularijs doloribus ex melle,
aquæ inter cutem cum ficis illinitur. Eisdem in potu auxiliatur, deco-
cta in vino ad dimidias parteis, & oblita. Cruda cõditæq; cibo, visus
aciem excitat. Dolores oculorum cum polenta lenit. Doloribus capi-
tis cum rosaceo & aceto illita auxiliatur. Profluentem naribus sangui-
nem sistit, trita & indita. Testiũ inflammationibus cum laureis folijs
imposita, & eruptionibus papularum cum myrto & cærato prodest.
Cum pipere autem & nitro affricta, albæ vitiligini medetur. Cũ eisdẽ
illita fornicationes tollit, & verrucas quæ thymi florem repræsentâr.
Contra impetigines cum alumine & melle vtilissime imponitur. Suc-
cus in mali punici calyce calfactus, aurium dolori efficaciter infundit-
tur. Hebetudinem oculi qui sensere, ruta cum fœniculi succo ac melle
peruncti iuuantur. Ignem sacrum, vlcera quæ serpunt, aut in capite ma-
nant, cum aceto rosaceo & cerusa persanat. Mansa Alliorũ Ceparũq;
acrimoniam domat. Montana si copiosius estur interficit. Dum florẽ
promit & ad murias colligitur cutẽ inflat & rubore quodã inficit, cũ
pruritu ac vehemẽti inflãmatione. Oportet itaq; eã vnctis antea ma-
nibus & facie colligere. Tradunt succum gallinaceis pullis insparsum
feles arcere. Adijciunt eã quæ in Macedonia circa Olcimum amnem
prodeat, comedentes interimere. Mōtosus autem is locus, viperis sca-
tet. Semen eius potum cõtra intestina vitia efficax est. In antidota cõ-
mode additur. Contra incontinentiam vrinæ tostum semen septenis
diebus potui datur. Radix huius montanum Moly vocatur. Sylue-
stris ruta satiuæ similis est. Prodest comitialibus & coxendicum do-
loribus. Menstrua mouet. Partus enecat. Acrior est viribus q̃ horten-
sis & validior. Sylvestris vtpote noxia, cibis abdicatur.

De Sylvestri Ruta. CAP. II.

Vt am syluestrem aliqui appellant Hypericon, alij Andro-
sæmon, alij Coron, alij Chamæpityn, Romani Hederæ-
lem, aut Centonalem, Aphri Churma semmaced. Odor se-
minis resinofus est. Ideo chamæpitys aliquibus nominatur. Frutex
est furculosus, rubescēs. Folia rutæ figura, flores lutei, qui digitis triti
sanguineo succo manant. Vnde Androsæmon vocitarunt. Ramuli
subhirsuti. Siliquæ teretes hordei effigie, in quibus semen nigrum resi-
nam olens. Gignitur in cultis & asperis. Vrinam ciet. Menses apposi-
tu trahit. Pota cum vino quartana liberat. Folia cum semine ambustis
illitu medetur. Et diebus quadraginta epota ischiadicos sanant. Vocat

etiamnum hoc modo syluestrem Rutam, quod in Cappadocia & Galatia Asiæ finitima Moly dicitur. Frutex est qui ab vna radice multos emittit cauliculos. Folijs multo q̄ alterius Rutæ lōgioribus, tenerioribusq̄, odore graui, flore candido, capitulis in cacumine paulo maioribus q̄ satiuæ Rutæ, quæ tribus maxime partibus constant. In quibus triangulum semen, subruffum, gustu amarum recluditur. Cuius est vsus. Semen autumnō maturefcit. Quod cum melle, vino, croco & feniculi succo, ac gallinaceo felle, teritur contra retusam oculorum aciē. Sunt qui eam Armalam vocent, Syri Befassan. Qui Cappadociam incolunt, Moly, quoniam quamdam cū Moly seruet similitudinem. Radice nigra, flore candido. In collibus & læto solo prouenit.

De Moly.

CAP.

LI.

Oly aliqui syluestre Leucoion appellant. Folia habet graminis, latiora, humi sparsa, Florem albæ violæ similem, sed minorem, lætei coloris. Caulem cādidum quaternum cubitorum. In cuius cacumine inest aliquid quod Allij speciē referat. Radix parua, bulbosa, quæ mirum in modum valet ad aperiendas vuluas, si trita cum irino vnguento in pello subijciatur.

De Panace.

CAP.

LIII.

Anax nōnullis Heracleum dicitur. Ex quo Opopanax colligi solet. Plurima ex parte, in Beoria & in Phocide Archadiæ nascitur. Ibiq̄ compendij causa studiose colitur. Folijs est asperis, in terra iacentibus, hærbacei coloris, ad ficulnea accedentibus, in ambitu quinquepartito diuisis. Caule vt ferulæ altissimo, qui lanugine quadā incanescit. Folijs etiā minutioribus obfusus. Muscarijs ceu Anethi in cacumine. flore luteo, & semine odorato feruēteq̄. Radices habet multas ab origine vna candidas, graue olentes, crassæ corticis & amari. Nascitur in Cyrene Libyæ, & Macedonia. Excipitur succus incisa radice, recenti caulium pullulatu. Ea candidum succū emittit, q̄ā ficcatus in summa cute croceum colorem contrahit. Effluentem autem succum excipiunt, folijs excauato solo stratis, quæ ficcata tolluntur. Simili modo caule messibus inciso, profluentem succum eximūt. Meliores ex radicibus albæ, rigidæ, & ficcæ, ingustabiles, aromaticæ, feruentes gustu. Fructus ex media ferula cibo idoneus est. Sed ex agnatis stolonibus, ab vsu cibario abhorret. Maxime in hoc succi genere probatur, q̄ amarissimus, interne albus, aut subfuluus foris ad croci colorem inclinās, læuis, pinguis, friabilis, statim in aqua eliques cens, graui odore. Niger improbatur ac mollis. Adulteratur ammoniacō aut cæra. Sed syncæri experimētum est, si digitis in aqua friatus resoluatur, & lætescat. Excalfacit, mollit, extenuat. Febriū rigoribus,

DE MEDICINALI MATERIA

vulvis, ruptis, laterum dolori, torminibus, stillicidio vrinæ conuenit. Contra vesicæ scabiem ex aqua mulsa aut vino bibitur. Menfes trahit. Fœtum enecat. Inflationes quæ vuluam male habent, duriciasq; ex melle impositus discutit. Ischiadicis illinitur. A copis & capitis medicaminibus ammiscetur. Carbunculos rumpit. Podagricis cum vua passa illitus subuenit. Dolore dentium liberat, cauis inditus. Oculorum aciem excitat. Ex eo & pice optimum fit emplastrum contra bestiarum morsus, quæ in rabiem efferantur. Ramēta radices vuluæ ad mota, partus extrahūt. Ad vetera vlcera efficax est. Nudata ossa, corpore operit, si trita cum melle illinatur. Semen cum absinthio sumptū menses pellit. Cum Aristolochia prodest, aduersus animalia quæ venenum eiuculantur. Contra vuluæ strangulatus in vino bibitur.

De Panace Asclepij. CAP. LIIII.

Anax Asclepij caulem a solo emittit tenuem, cubitalem, geniculatum, maioribus q̄ fœniculi folijs, hirsutioribus, odoratis, aureo flore, acris, odorato, ex muscarijs depēdente. Radix parua est & tenuis. Auxiliarem vim habent flores & semina, contra vlcera, phagedænas & tubercula, si trita cum melle imponantur. Aduersus serpentes ex vino bibuntur, & cum oleo illinuntur. Aliqui panaces syluestre origanum vocant, alij Cunilam de qua in origani mentione diximus.

De Panace Chironio. CAP. LV.

Anaces, chironium in Pelio monte maxime prouenit. Foliū eius Amaraco simile. Flos aureus. Radix parua quæ non alte demittitur, gustu acris. Pota radix serpentium veneno resistit. Illita coma eadem præstat.

De Ligustico. CAP. LVI.

Igusticum quod alij Panaciam, alij Panaces vocant, plurimum in Liguria nascitur, in monte Apennino alpebus cōtermino. Vnde noscitur traxit. Panaces incolæ non ab re appellant. Quoniam & radice & caule heracleotico panaci simile fit, & viribus eisdem præditū. Gignitur in altissimis asperisq; montibus, ac vmbrosis, maxime iuxta riuos. Cauliculum fert anethi, geniculatum, tenuem, & in circuitu folia Sertulæ campanæ, molliora, odorata, prope verticem graciliora, & lōge magis diuisa. In cacumine muscarium, in quo semen dependet nigrum, durum, & oblōgum, fœniculo proximū, gustanti acre & Aroma olens. Radix cādida, heracleotici panacis similis, odorata. Radicis feminisq; vis exalta & toria, concoquens. Prodest ad intestinos dolores, tumores, cōcoctiones. Item ad inflationes, præsertim quibus stomachus turgeat. Et contra serpentium idus. Vri

nas & menses potu trahit. Eisdem præstat effectus apposita radix. Semen cum radice oxyporis & medicamentis decoquentibus ammiscetur. Stomacho perq̃ vrile. Quare pro pipere vtuntur eo indigenæ ad obsonia. Adulteratur semine quodā simili. Quod facile gustu discernitur. Amarum enim est. Alijs semen Fœniculi aut Sefelis ammiscentes Ligusticum dolo vitiant.

De Pastinaca.

CAP.

LVII.

Pastinacam sylvestrem, aliqui Cerasioniam, vocant, Latini rusticam pastinacam, aliqui Carotam, Aegyptij Babuyron, Aphri Sichā. Folia Gingidij habet, latiora, subamara, caulem rectum, scabrum. Umbellam similem Anethi, in qua flores insunt candidi, & in medio purpureum quiddam, ferme croceum. Radix digiti crassitudine, dodrantalis, odorata, quæ cocta manditur. Semen potum vel impositum menstrua mouet. Ijs conuenit in portione, quos vrinæ difficultas torquet, aut lateralis dolor excruciat, aut si aqua cistem subijt. Serpantium moribus idibusq̃ prodest. Præsumentes eam nulla affici iniuria a serpentibus traduntur. Conceptus adiuuat. Radix vrinam pellit. Venerem stimulat. Partus apposita eijscit. Folia trita & cum melle imposita phagedænas vlcerum purgant. Satiua ad eadem pollet, inefficacior tamen, & cibo aptior.

De Sefeli.

CAP.

LVIII.

Sefeli massiliense quod nonnulli Sphagnon vocant, folia Fœniculi habet, crassiora, caulē vegetiorem. Umbellam Anethi, in qua semen oblongum, angulosum, degustanti acre. Radix longa est, iucundi odoris. Semen & radix excalfaciendi vim habent. Potu stranguriæ & orthopnœæ medentur. Suffocationibus mulierū comitialibusq̃ profunt. Menses & partus trahunt. Ad omnia interna mala pollent. Tussim veterem sanant. Semen cum vino potum concoquit & gormina discutit. Epialis febribus vrile. Contra perfrigidiones in itineribus, cum pipere & vino bibitur. Capris cæterisq̃ pecudibus datur in potu, quo facilius suos fœtus enitantur.

De Aethiopico Sefeli.

CAP.

LIX.

Aethiopicū Sefeli quod Aegyptij Cyonū phricen vocāt, folia habet Hedera, minora & ad Periclymeni modū oblōga. Frutex nigricat, palmitibus in bina cubita extēsis, ramis sesquipedalibus, capitulo Anethi. Semine in Tritici morē denso, nigro, amaro, massiliensi odoratiore & acriore, multum suauis.

De Peloponnenfi Sefeli.

CAP.

LX.

Peloponnense folia habet Cicutæ, latiora, & crassiora. Caulē supra massiliensis magnitudinem, serulaceum, & latum in ca-

DE MEDICINALI MATERIA

cumine capitulum, in quo semen latius, odoratum, & carnosum pendet. Eisdem viribus præditum est. Nascitur in asperis, riguis & collibus. Inuenitur etiamnum in Ida monte.

De Cretico Sefeli. CAP. LXI.

Ordylum quod aliqui Creticum Sefeli vocant iuxta Ciliciam in Ameno mōte nascitur, hærubula furculosa, semine dupli-
t ciam in Ameno mōte nascitur, hærubula furculosa, semine dupli-
plici, rotundo, scutulorum effigie, odorato, subacri. Contra
vrinæ difficultatem bibitur. Potu cit mēses. Succo seminis caulisq; vi-
rentis, ternis obolis ex passo decem diebus hausto, renes sanantur. Effi-
cax est radix ad ciendas pectoris excreationes in delinctu cum melle.

De Sisone. CAP. LXII.

Ison exiguum semen est in Syria natum, Apio simile nigrū,
f feruens, oblongum. Contra lienis vitia bibitur. Vrinæ diffi-
cultatē potu emendat. Remoratos menses citat. Quo in con-
dimētis cum Cucurbita & aceto indigenæ vtuntur. In cacumine gra-
nula multa gerit.

De Aniso. CAP. LXIII.

Nisum semen paruum est in Syria natum. Apio simile est, ma-
a gnum, feruens, oblongum. Contra lienē & vrinam quæ ægre
redditur, bibere prodest. Retardatos menses pellit. Id incolæ
ad condimenta vsurpare solent, & cum Cucurbita in aceto decocta
assumunt. Anisum in summa excafcit, exiccat. Oris halitum iucun-
diorem facit. Doloris leuamētum præstat. Vrinam ciēt. Aquam quæ
subijt curē dissipat. Potum sitim cohibet. Animalium venenis aduer-
satur. Valet ad inflationes aluumq;. Alba fœminarum profluua sistit.
Lac ad mammas elicit. Venerem stimulat. Dolores capitis leuat suffi-
tum naribus. Cum rosaceo tritum, instillatumq; frātis auribus mede-
tur. Melius semper recens, plenum, non fursurosum, odore præstans.
Inter prima laudatum est Creticum. Proximum Aegyptium.

De Caro. CAP. LXIIII.

Arum semen est vulgaris notitiæ. Excafcit. Vrinam conci-
c tat. Stomacho vtile. Os commendat. Cōcoctionē adiuuat.
Mistum antidotis & oxyporis Anisi vicem præbet. Radix
cocta Pastinacæ modo manditur.

De Anetho. CAP. LXV.

Nethum quod estur, aliqui Polygida vocāt, alij Anicetum,
a Magi Cynocephali geniturā, aut capillos, alij Mercurij se-
men, Latini Anethum, Aphri Sicciriam, Aegyptij Adra-
cum. Daci Pulpum. Aridi anethi comæ seminisq; decoctum, potu lac
euocat. Inflationes & tormina sedat. Aluum vomitionesq; sistit. Vri-

nas ciet. Singultus lenit. Oculorum aciem hebetat. Genituram refingit affidue potum. Fœminis vulvæ malo opportunis ad defeſſiones vtile. Condylomata illitus eius cinis tollit.

De Cumino ſatiuo. CAP. LXVI.

Vminum ſatium ori gratū eſt. Sed multo magis Aethiopia cum, quod Hippocrates regium appellavit. Secundum locū tenet Aegyptium. Reliqua ſequuntur. Prouenit in Galatia, in Aſia, Cilicia, & Theretia, & plerique alijs tractibus. Excalfacit, adſtringit, exiccat. Ad tormina inflationeſque conuenit, coctum & cū oleo inditum, aut cum hordeacea farina illitum. Orthopnoicis datur in poſca. Demorſis a ſerpente in vino. Teſtium collectionibus auxiliatur, impoſitum cum vua paſſa, aut lolij farina cæratove. Menſium abundantiam inhibet. Contritum autem in aceto & naribus obiectum, ſanguinis profluuiā ſiſtit. Colorem bibentium aut perunctorum mutat in pallorem.

De Sylueſtri Cumino. CAP. LXVII.

Sylueſtre Cuminū ſive ſyluaticum, plurimum efficaciusque in Lycia & Galatiæ Aſia, atque Carthagine Hiſpaniæ gignitur. Frutice paruo, dodrantali caule, ac tenui, quaternis aut quinque folijs tenuibus, veluti ſerratis, & Gingidij diuiſura. In cacumine capitula quina aut ſena habet, mollia, rotunda, in quibus eſt ſemen acroſum, guſtu ſatiuo acriore. Naſcitur in collibus. Bibitur ſemen ex aqua aduerſus tormina inflationeſque. Item contra venenatas beſtias ex vino. Singultus ex aceto ſedat. Stomacho vtile quē humor vexat. Sugillata tollit, ſi manducatum cum melle & vua paſſa illinatur. Teſtium inflammationibus, adiectis eiſdem medetur. Eſt & aliud ſylueſtris Cumini genus, ſatiuo nō diſſimile, quod a ſingulis floribus penſilia promit cornicula, in quibus ſemen eſt Melathio ſimile. Quod potum omnium ſerpentium morſibus præſidiū eſt. Calculoſis & ijs qui vrinæ ſtillicidio vexantur, aut concretum ſanguinem cum lotio reddunt auxiliatur. Sed Apij ſemen ſeruſ factum poſtea bibendum eſt.

De Ammio. CAP. LXVIII.

Mmi Latini Ammiū Alexādrinū, nonnulli Aethiopicū, quidam regium Cuminum appellant. Plerique diuerſarum naturarū eſſe Aethiopicum Cuminum & Ammiū exiſtimant. Vulgo notū eſt, ſemen exile, multo minus Cumino, Origanum reſpiens. Eligendum eſt purum, minime ſurfuſum. Vis ei excalfactoria, ſeruens & exiccans. Facit ad tormina, vrinæ difficultatem, ſerpentium ictuſ cum vino potum. Menſtrua ciet. Miſcetur derodentibus cantharidum medicamentis; quæ Ecdoria vocant, vt inde exortis vrinæ

DE MEDICINALI MATERIA

difficultatibus resistat. Sugillata cum melle tollit. Colorem potu aut illitu mutat in pallorem. Suffitum cum vua passa aut resina vulvas purgat.

De Coriano. CAP. LXIX.

Orium aut Corianum Aegyptij Ochion vocant. Vulgaris est notitiæ. Vim refrigeratoriā habens. Quare illitum cum pane aut polēta, ignibus sacris, & vlcerebus quæ serpunt medetur. Epinyctidas cum melle vel vua passa, testium inflammationes, carbunculosq; sanat. Cum faba fresa strumas & tubercula discutit. Tineas interaneorum expellit, semen cum passo potum. Genituram adauget. Largius tamen sumptum, mentem non sine periculo mouet. Quare continuo & copiosiore vsu abstinendum. Succus cum cerusa, spumave argenti, necnon aceto & rosaceo illitus, ardentes summæ cutis inflammationes emendat.

De Hieracia. CAP. LXX.

Hieracia magna, alijs Sonchites, Romanis Lampuca, Pœnis Sithileas, caulem emittit asperum, subrubrum, spinosum, cauiū, folia, ex interuallis rariuscule diuisa, similia Soncho per ambitum, luteos flores in oblongis capitulis. Vim refrigerandi habet & modice substringēdi. Vnde illita, stomacho aestuanti, inflammationibusq; prodest. Succus erosionem sorbitione mitigat. Hærbā cum radice illita, vibratis a scorpione idibus auxiliatur.

De Hieracia parua. CAP. LXXI.

Hieracia parua, quam aliqui Sonchiten, alij Entimon agrion, Romani Intybum syluestre vocant, folia ex interuallis habet diuisa in ambitu, Cauliculos teneros, virentes, in quibus lutei flores orbem circinantes emicant. Vim suam ad eadem ad quæ superior impendit.

De Apio. CAP. LXXII.

Atium Apium ad eadem quæ Corianum conuenit. Inflammationibus oculorum cum pane aut polēta illinitur. Aestuantem stomachum mulcet. Mammarum duriciam reprimat. Vrinam ciet, siue crudum siue coctum edatur. Decoctum eius radicisq; potu, venenorum noxæ resistit, quum vomitiones excitet. Alium cohibet. Semen vehementius vrinam pellit. Contra serpentium venena, aut epotam argenti spumam auxiliatur. Inflationes discutit. Ammisceatur medicamenti quæ dolorū leuamēta præstant, Theriacis quoq; ac tussis remedijs.

De Eleoselino. CAP. LXXIII.

Leoselinum quod a quibusdam Pedinon, ab alijs Hydroscelinon agrion, Romanis Apium rusticum appellatur. In

humidis nascitur. Satiuo grandius & ad eadem efficax.

De Oreoselino. CAP. LXXIIII.

Reoselinon quod aliqui Petroselinon sylvestre appellant,
 o Aegyptij Anonim, caule est palmum alto, ab radice tenui ex-
 eunte. Ramis & capitulis cicuta, multo tamen tenuioribus,
 semine cumini, oblongo, acri, & odorato, tenui. Nascitur in petrosis &
 montibus. Vrinam cit semine ac radice in vino potis. Menses tra-
 hit. Antidotis necnon medicamentis vrinam cientibus, & excalfacto-
 rijs, inferitur. Nec hallucinari nos oportet existimantes oreoselinum
 esse, quod in saxis prouenit. Aliud enim est Petroselinum.

De Petroselino. CAP. LXXV.

Petroselinum in Macedonia prouenit, in praeceptis locis. Se-
 mine Ammij, odoratiore, sapore acri, aroma olente. Vrinam
 cit ac menstrua. Contra stomachi & coli inflationes & tor-
 mina prodest. Laterum, renum, & vesicae doloribus in potu subuenit.
 Ammiscetur antidotis vrinam cientibus.

De Olusatro. CAP. LXXVI.

Ipposelinum aliqui Grielon, alij Agrioselinum, Latini Olu-
 h satrum appellat, aliqui Smyrnion, quauis aliud sit, quod pro-
 prie Smyrnion dicitur, vt paulo post referemus. Est autem
 maius, & satiua apio candidius. Caule alto, cauo, molli, habente velu-
 ti lineas. Folijs latoribus, in puniceum vergentibus, coma Rorisma-
 rini. Dependentibus in cacumine corymbis, anteq̃ deflorescat. Ea semi-
 ne turget nigro, oblongo, acri, solido, aromatico. Radix demittitur te-
 nuis, odorata, candida, quae os commendat. In vmbrosis & palustri-
 bus nascitur. Olerum generis vt Apium. Radix cruda cocta ue estur.
 Folia cum caulibus decocta maduntur, & per se aut cum piscibus pra-
 parantur, crudaq̃ muria condiuntur. Vim hanc habet vt poto semi-
 ne ex multo vino mensis ciat. Rigentes calfacit potu aurillitu. Vri-
 nae stillicidio auxiliatur. Radix eisdem praestat effectus.

De Smyrnio. CAP. LXXVII.

Myrnion quod in Cilicia Petroselinum vocant, passim in
 f Amano monte gignitur. Caulem habet apij, & stolones mul-
 tos, folia latoria, pinguis, ad terram infracta, robusta, odore
 medicato, cum quadam acrimonia iucunda, colore in luteum languen-
 scente. Capitibus caulium orbiculatis vt anethi. Semine brassicae, ro-
 tundo, nigro, acri, myrrhae sapore. Ita vt alterum alterius loco cedat.
 Radix quoq̃ odorata, gustu acri. Fauces mordet, succosa, mollis. Cor-
 tex eius foris niger, intus viridis aut subalbidus. Nascitur in saxosis et
 collibus, atq̃ squallidis, & limitibus terrenis. Vis radice, haerbae & se

DE MEDICINALI MATERIA

minis excalfacere. Folijs muria maceratis ad obfonia vtuntur. Aluū
 fiſtunt. Radicem contra ſerpentium iĉtus bibere conuenit. Tuſſes &
 orthopnœas mitigat. Vrinæ difficultati medetur. Recentes tumores,
 collectiones, duriciaſq; diſcutit. Illita vulnera ad cicatricem perducit.
 Partus abortu vitiat, ſi ſeruſacta ſubiſciatur. Semen, lienis renum &
 veſicæ vitijſ prodeſt. Mēſes & ſecundas pellit. Cōmode datur iſchi-
 adicis in vino. Inflationes ſtomachi lenit. Sudores ciet & ruſtus.
 Semen peculiariter datur hydropicis in potu, & contra februm cir-
 cuitus.

De Elaphoboſco. CAP. LXXVIII.

Ræci elaphoboſcon, aliqui Elalphicon, alij Nephron, alij
 g Ophigenion, nonnulli Ophioſtonon aliqui Herpyxen, alij
 Limen vocant, Romani cerui ocellum, Aegyptij Chemin,
 Aphri Aſchancam. Fœniculaceus caulis eſt, aut Rorimarino ſimilis,
 geniculatus, folijs duum digitorum latitudine, vt Terebinthi prælon-
 gis, aliquantum aſperis, circumſcraſtis. Adnata multa caulis habet fe-
 rentia umbellæ Anethi ſimiles, & ſemina eiſdem, ſtorem ſubluteum.
 Radice ternum digitorum longitudinis, & craſſitudinis vnus, candi-
 da, dulcis, eſui apta. Caulis tener pro olere manditur. Contra ſerpen-
 tium iĉtus, datur ſemen in vino. Fama autem eſt hoc pabulo, ceruas ſer-
 pentium moribus reſiſtere.

De Fœniculo. CAP. LXXIX.

Oeniculum ſi hæba edatur aut ſemen cum priſana bibatur,
 f mammas lacte replet. Comæ decoctum in renum doloribus
 ſubditum proficit, quippe quod vrinam excitet. Contra ſer-
 pentium iĉtus in vino conuenienter bibitur. Menſes ciet. In febribus
 nauſeam & ſtomachi feruorem, ex aqua frigida potum ſedat. Contritæ
 radices & cum melle illitæ, morſibus canum medentur. Succus caule
 & folijs exprimitur, & in ſole ſiccatus in medicamenta adiſcitur, quæ
 ad excitandam oculorum aciem commodè temperantur. Extrahitur
 etiã ſemine viridi ramuliſq; & radicibus prima germinatione inciſis.
 In Iberia ſuccum reddit gummi ſimilem. Caulem medium dum hæ-
 ba floret ruſtici demetunt, igniq; admouēt, quo facilius vi caloris exu-
 dans, gummi remittat. Quod efficacius ſucco eſt ad medicamenta ocu-
 lorum.

De Erratico fœniculo. CAP. LXXX.

Ræci hippomarathrum, aliqui Marathin, alij Marathrum
 g agrion, Aegyptij Sampſoth, Magi Thymarnolion, Latini
 fœniculum erraticum, aliqui Mion, Galli Siſtrameor. Sylue-
 ſtre eſt fœniculum, magnum. Fert autem ſemen Canchry ſimile. Cuius

radix iucunde olet, potaq; stranguriæ medetur. Menſes impoſita ciet. Ventrem fiſſit, radice aut ſemine poto. Contra ſerpentium morſus auxiliatur. Calculos comminuit. Regiũ morbum expurgat. Lactis abundantiam facit. Decoctum foliorum hauſtum, foeminas a partu purgat. Traditur aliud Hippomarathri genus longo exili & anguſto folio, ſemine coriandri, rotũdo, acri, & odorato. Excalfaciendi naturam habet, & viribus foeniculo reſponder. Ad omnia infirmius.

De Dauco.

CAP. LXXXI.

Aucum aliqui Dircaũ vocant. Creticum, folijs foeniculo d ſimile, minoribus & tenuioribus, caule dodrantali, vmbella coriãdri, flore albo, ſemine acri, candido, hirsuto, ſuauiſſimi odoris in mandendo. Radix digitali craſſitudine & palmi longitudine adoleſcit. In ſaxoſis naſcitur, & locis ſole illuſtratis. Aliud eius genus ſylueſtri Apio ſimile, acre, odoratum, aroma olẽs, ſeruẽtis guſtus. Probatiffimum Creticum. Tertium aſſignatur genus folijs coriãdri, floribus albis, capite & ſemine anethi, muſcario paſtinacæ, ſemine oblongo ceu cumini, acri. Omnium ſemen excalfacit potum. Vrinam mẽſes & partus extrahit. Torminibus liberat. Veterem tuſſim mitigat. Phalangiorum morſibus potum in vino auxiliatur. Tumores illitu diſcutit. Seminis dumtaxat in alijs generibus inualuit vſus. In Cretico etiam radicis. Quæ maxime cõtra venenatorum iniuriam in vino bibitur.

De Delphinio.

CAP. LXXXII.

Elphiniũ Græcis Diachyſis, alijs Diachyſtos, alijs Paralyſis d alijs Camarus, alijs Hyacinthus. alijs Delphinias, alijs Neoradion, aut Solandron, aut Cronion, Romanis Bucinus minor vocitatur. Surculos emittit a radice vna ſeſquipedales, aut maiores, a quibus folia exeunt parua, tenuia, diuiſa, prælonga, quæ Delphinorum effigiem repræſentant. Vnde tractum nomen eſt. Flos violæ albæ nõ diſſimilis, purpureus, & ſemen in ſiliquis, milio proximũ. Quo non aliud vtilius bibi poteſt, ab ſcorpione percuffis. Aiunt enim obiecta hæba, ſcorpiones reſolui atq; ignauos torpeſcere. Semota vero ea, ſeſe recolligere. Prouenit in aſperis & apricis.

De Altero Delphinio.

CAP. LXXXIII.

Lterum eſt Delphiniũ quod Romani Bucinum vocant, ſuperiori ſimile, ſed folijs & ramis longe gracilius. Viribus eisdem pollet, ſed non ita efficacibus. a

De Pyrethro.

CAP. LXXXIII.

pyrethrum aliqui Dorycnion, alij Pyrinon, alij Pyroton aut p Pyrothron, alij Arnon pyriten, Magi Pyriten, Romani

DE MEDICINALI MATERIA

Saliuarem vocant. Folia caulemq; emittit vt Daucum syluestre & fœniculum, vmbellamq; Anethi circinatæ rotunditatis. Radix longa est pollicis crassitudine, gustu feruidissimo. Pituitam elicit. Ideo in dolore dentium decocta in aceto, colluto inde ore, auxiliatur. Mansa pituitam extrahit. Sudores ciet, peruncto ex oleo corpore. Diuturnis rigoribus efficax. Contra perfrictiones membrorum, resolutio nescq; eximie conducit.

De Rosmarino.

CAP. LXXXV.

Vo Rosmarini genera. Alterum fructiferum, aliquibus zea
d aut Campsanema appellatum. Cuius semen Canchrys vocatur. Folia fœniculi habet, crassiora & latiora, in rotæ speciem humi sparsa, iucunde olentia, caulem cubiti altitudine, aut maiorem, multis cōcauum alis. In cacumine vmbellam in qua semen copiosum, candidum, sphondylo simile, rotūdum, angulosum, refinaceum. Quod in mandendo linguam exurit. Radix thus redolet, candida, prægrandis. Est & alterum omnino consimile, semen ferens latum, nigrum vti sphondy lion odoratū, minime exurens, radice foris nigra, intus alba. Verum id quod sterile dicitur illorū plane similitudinē refert. Sed neq; caulem neq; florem neq; semen promit. Nascitur in saxosis & asperis. Trita omnium hærbæ communiter hæmorrhoidum profluvia sistit. Sedis inflammationes & condylomata mitigat. Concoquit strumas & abcessus, qui ad maturationem ægre perducuntur. Siccæ radices cū melle vlcera purgant. Torminibus medentur cum vino potæ. Et contra serpentium morsus conueniunt. Menses & vrinas cient. Veteres tumores illitu discutiunt. Tam radices q̄ hærbæ succus adiecto melle illitus, oculorum aciem exacuit. Potum semen ad eadem pollet. Si comitiale malum sentiatur, aut vetus pectoris vitium, auxilio est. Regio morbo laborantibus cum vino & pipere datur. Sudores mouet cum oleo perunctum. Ruptis & conuulsis prodest. Podagris cum loliacea farina & aceto tritum illinitur. Purgat vitilignes, addito aceto q̄ acerrimo. Semine in potionibus vtendum, eius quidem quod Canchryn non ferat. Quippe illud sua acrimonia arteriam exasperat. Rosmarinum cum erica nasci, folijs lactucæ syluestris, asperioribus, candidioribusq; radice breui, Theophrastus author est. Potumq; id ipsum alterutra parte purgare.

De Canchry.

CAP. LXXXVI.

Anchrys vim habet exalfaciendi & vehemēter exiccandi.
c Quare abstergetibus medicamentis inferitur. Cōtra oculorū fluctiones capiti illinitur, ita vt tertio die soluiatur.

De Rosmarino coronario. CAP. LXXXVII.

r Osmarinū quo coronarij vtūtur, ramos mittit tenues, & circa eos folia minuta, densa, lōga, exilia, subter incana, superne virentia, graui odore. Excalfa&oria vi præditum est. Regiū sanat morbum, si decoctum in aqua ante exercitationes bibatur, & vbi laborans exercitationi se crediderit, in balnea descendat, & merum potet. Ac opis gleucinoq; vnguento ammisceri solet.

De Sphondyljo. CAP. LXXXVIII.

f Phondylium aliqui Arangen vocant, alij Phalāgion, alij Asterion, nonnulli Nefyrin aut Sphōdylin, quidam Chosrodanon, aut Oenanthen, Romani hærbam rutinalē, Aegyptij Apfaphear, Magi Osirin. Folia Platani & Panacis habet. Caulis foeniculaceos, cubitali altitudine, aut amplius assurgentes, in quorum cacumine semē duplex Sefeli simile, sed larius, candidius & magis paleaceum, grauis odoris. Flores eius albi aut pallentes. Radice Raphani candida. Nascitur in palustribus & aquosis. Potum semen pituitam per aluum extrahit. Medetur iocineris vitijs, regio morbo, comitialibus, orthopnoicis, vuluarum strangulationi. Vetusos suffitu reuocat. Cum oleo cōmode infunditur capitibus phreniticorū, & lethargicorum, Item capitis doloribus. Cum ruta illitum serpentia vlcera colibet. Datur radix contra regium morbum, & iocineris vitia. Circumrasa eadem callos fistularum derodit. Recentis floris succus exulceratis auribus, purulentisq; accommodatur. Qui cæterorum succorum more exprimi, dein recondi solet.

De Ferula. CAP. LXXXIX

c Viridi Ferula medulla pota vtilis est ad cruentas excretionēs, celiacosq;. Contra viperarum morsus in vino datur. Erumpentem naribus sanguinem indita sistit. Semen potum torminosi auxiliatur. Sudores ciet vncto ex oleo corpore. Caules si edantur, capitis dolores faciunt. Muria condiuntur. Ferula itaq; caulem profert ternum sæpe cubitorum, folia foeniculi, longe asperiora, & latiora. Qua ab imo caule vulnerata, Sagapenum efficitur.

De Peucedano. CAP. XC.

p Eucedanum aliqui Agriion vocant, alij Agriophyllon, Magi bonum dæmonem, Romani Satariam. Caulem emittit tenuem, gracilentum. Fœniculo similem. Comam ha-

DE MEDICINALI MATERIA

bet statim ab terra foliosam spissamq. Flore luteo, radice nigra, crassa, firma, graui odore, succosa. Gignitur in montibus opacis. Tenera radix cultello conciditur, profluensq; e plaga succus vmbra mandatur. In sole siquidem confestim euanescit. Colligitur capite prius & naribus rosaceo perfusis, ne capitis dolor premat, et vertigo sentiat. Assa ta radix vtilior fit. Tam lac quam succus radice & caulibus extrahi solet, sicuti e Mandragora. Verum inefficacior lacte succus habetur, et velocius expirat. Interdum etiam concreta inuenitur lachryma, thuris similitudine, caulibus radicibusq; adhærens. Præfertur succus e Sardonis & Samothrace, colore ruffo, odore graui, feruens gustu. Ex oleo et rosaceo illitum potest lethargicis, phreniticis, vertiginosis, comitialibus, & longis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis, conuulsis. Omnibus in vniuersum vitij nervorum, ex oleo & aceto illitum prodest. Eius olfactu respirant vuluæ strangulatus, & veternosi reuocantur. Incensum serpentes abigit. Aurium doloribus conuenienter ex rosaceo instillatur. Cauernis detium inditum, mitigat dolorem, Cōtra tussim efficacissime ex ouo assumitur. Suspirijs, torminibus, & inflationibus subuenit. Ventrem leniter emollit. Lienem absorbit. Difficiles partus mire adiuuat. Facit ad vesicæ cruciatus, & renum distensiones potum. Vuluam aperit. Radix ad eadem vtilis est. Sed inefficacior. Eius decoctum bibitur. Farina eius sordida vlcera purgat, & vetera cicatrice obducit. Squamas ossium extrahit. In carata & calfacientia malagmata additur. Eligi debet recens, esu difficile, firmum, odoris plenum. Succus ad potiones amaris nucibus aut ruta aut pane calido aut anetho resoluitur.

De Gith seu Melanthio. CAP. XCII.

Iht ex Græcis aliqui Melanthiū, alij Mecona agrion melan-
 g na, Romani Papauer nigrum appellant. Exiguus frutex est
 saepe binos palmos excedens. Folijs vt Senetionis minutis,
 sed multo tenuioribus. Capitulo in cacumine tenui, ceu papaueris ob-
 longo, intercurfantibus intus membranis. Quibus semen includitur
 nigrum, acre, odoratum, quod panibus inspargitur. Capitis dolori-
 bus illitum fronti, subuenit. Discutit recentes oculorum suffusiones,
 tritum ex Irino, & infusum naribus. Tollit lepras, lentigines, duricias,
 tumoresq; vetustos cum aceto illitum. Circumscarificatos clauos excu-
 tit cum veteri vino impositum. Dentium doloribus decoctum cum
 aceto & teda prodest. Teretes ventris tineas expellit, perundo ex
 aqua umbilico. Destillatione laborantes adiuuat, tritum in linteo
 & olfactum. Vrinam & menstrua ciet, multis diebus sumptum.

Et lac extrahit. Difficultatem spirandi cum vino potum leuat. Phalangiorum moribus ex aqua drachmæ pondere haustum auxiliatur. Incenso serpentes fugantur. Tradunt largius epotum enecare.

De Laserpitio & Lasere. CAP. XCIII.

Aserpitium in Syria, Armenia, Media, & Libya nascitur, caule ferulaceo, quem Maspetum vocant. Folij apio simili-
 I bus, lato semine. Radix excalfacit. In cibis ægre concoquitur. Vesicæ noxia. Sugillaris illita cum oleo, & strumis, ac tuberculis cum cærato, medetur. Ischiadicis conuenit cum Irino aut cyprino cærato. Excrecentibus circa sedem tollendis, illinitur cum putamine mali punici & aceto decocta. Venenis pota resistit. Os cõmendat, cibis aut sali permista. Laser e radice atq; caule scarificatis colligitur. Præfertur autem ruffum, translucēs, myrrhæ æmulum, non porraceū, odore valens, suauis gustu. Quod dilutum facile albescit. Syrenaicum si quis degustarit, humorem toto corpore ciet, blādissimo odore, adeo vt ne os quidem gustanti nisi paululū spiret. Medicum & Syriacum minus viribus valent, & grauiorem reddunt odorem. Laser omne anteq̃ siccescat adulteratur sagapeno, aut fabæ lomēto. Quod maleficiū depræhenditur gustu, odore, visu, & madefactione. Caulē aliqui Silphion, radicem Magudarin, & folia Maspeton vocauere. Efficacissimum Laser, mox folia, postremo caulis. Acrē vim habet. Inflationes facit. Perundas cum aceto pipere & vino alopecias sanat. Oculorū aciem exacuit. Incipientes suffusiones, illitum cum melle dissipat. Carnernis dentium in dolore inditur, aut cum thure in linteo circumligatur, aut cū hyssopo ficis coctis in posca, os colluitur. Ijs prodest quos bestia in rabiem efferata momorderit, vulneribus immissum. Valet aduersus venena telorum, & animalia omnia, quæ virus eiāculantur, potum aut illitum. Scorpionum plagis oleo dilutum circumlinitur. Gangrænīs præcoercitis immittitur. Et cum ruta, nitro, & melle, vel per se carbunculis. Clauos callosq; prius circumratos vellit. Cærato aut aridorum ficuum carne præmollitū, recentes Lychenas ex aceto sanat. Et excrecentia in carne polyposq; si aliquot diebus cum attramento sutorio aut erugine illinatur. Extuberantia cum forfice extrahit. Veteribus faucium scabrics opitulatur. Grauem subitoq; irrauescentem vocem, dilutum aqua sorbitione confestim expedit. Vuā illitum cum melle reprimat. Anginis ex aqua mulsā vtilissime gargari-
 zatur. Vescētes eo lætiore colore mangonizat. Tussi commode in sorbili ouo datur, & pleuriticis in sorbitionibus. In fellis suffusione, & aqua inter cutem cum aridis ficis. Rigores discutit cum vino

DE MEDICINALI MATERIA

pipere & thure potum . Neruorum contractionibus opisthotonicisq;
datur oboli pondere deuorandum. Hærentes gulæ hirudines, gargarizatum cum aceto decutit. Ad lac intus coagulatum bibitur . Comitibus ex aceto mulso proficit. Menfes ciet cum pipere & myrrha potū. Cœliacos adiuuat in acino vuæ sumptum . Cum lixiuio autem potui datum repente conuulsis ruptisq; prodest. Ad potiones resoluitur, nucibus amaris, aut ruta & calido pane. Foliorum succo ad eadem proficitur, sed multo inefficacius. Cum aceto mulso manditur, ad expediendam arteriam, maxime cum vox retunditur. Eo cum laetucis vtuntur, exitq; in vicē erucæ. Fertur & altera Magudaris in Lybia nasci . Radix Laserpitio similis, sed minus crassa, acris & fungosa. Ex qua non profluit succus. Eiusdem cum lasere facultatis.

De Sagapenio. CAP. XCIIII.

Agapenium sarulacæ herbæ succus est, quæ in Media nascitur. Optimum est translucens, fuluo forinsecus colore, & intus albo, nescio quid inter laser & galbanum redolens, gustu acri. Prodest laterum & pectoris doloribus, tussibus vetustis, conuulsis & ruptis. Crassam pulmonis pituitam expurgat. Datur comitialibus, opisthotonicis, lienosis. Item cōtra neruorum resolutionem, perfrictiones, & febrium circuitus in potu. In vnguenta probe admittitur. Menfes pellit. Sed sætum exanimat, cū hydromelite potum. Prodest ex vino haustum serpentium ictibus. Olfactum ex aceto vuluarū strangulatus excitat. Oculorum cicatrices, offusam caliginem, hebetudines, suffusionesq; detergit. Resoluitur succi modo, ruta, aqua, & amaribus nucibus, aut melle, aut calido pane.

De Euphorbio. CAP. XCV.

Vphorbia Libyca arbor est ferulæ speciē habens, quæ in monte Atlante iuxta Mauritaniam inuenitur. Ea acerrimo succo turget. Cuius eximiū seruorē expauescentes incolæ, ouillos vêtres elutos, arbori circūligant, & eminus caulē contis incidūt. Confestimq; e plaga perinde atq; vase quodā, in vētriculos copiosus lactis humor effluit, præter id quod sparsi in humū, vulnus eiacular. Duo succi genera. Vnū Orobi magnitudine, sarcocolæ modo emicat. Alterū in vētriculis cōcrefcit atq; vitreū spectatur. Eligendū est translucēs & acre. Euphorbiū adulterat sarcocollæ & glutini mistione. Sed difficile quidē experimētū. Quippe cū leui gustu, os accēfū diu detineat, adeo vt quicquid ori obijciatur plane Euphorbium respiciat. Eius inuentio tēpore Iubæ regis Libyæ cognita extitit. Succus illitu suffusiones discutit. Potus tota die exurit. Quare melli collaryisq; pro acrimonia

niæ ratione ammisceri debet. Coxarum doloribus prodest in odorifera potione haustus. Squammas ossium eadem die eximit. Verum evitantes necesse est, linamentis aut cæratīs communire corpus, quo ossa conuestiuntur. Aliqui memoriæ prodiderunt, percussos a serpente nihil molesti passuros, si incisa osse tenus capitis cute, intritus succus infundatur, vulnusq; postea consuatur.

De Galbano.

CAP.

XCVI.

g Albanum succus est nascentis in Syria ferulæ, quod nonnulli Metopium vocant. Maxime laudatur cartilaginofum, merum, thuris effigiem præbens, minime lignosum, retinens nõnihil adiecti seminis aut ferulæ, graui odore, neq; humidum neq; aridum. Adulteratur faba fresa & ammoniaco. Galbanū excalfacit, vrit, extrahit, discutit. Menses ac partus trahit, appositu vel suffitu. Lentiginēs aceto & nitro perūctas tollit. Deuoratur ad tussim veterem, difficultatem spirandi, suspiria, rupta, conuulsa. Aduersatur toxicis potū cum aceto & myrrha. Simili modo sumptum mortuos partus extrahit. Imponitur lateris doloribus & furunculis. Comitiales & vuluæ strangulatus & vertiginosos olfactu suscitatur. Si vratur fugat nidore serpentes, & perundos feriri non patitur. Serpētes cum oleo & sphondylo circumpositum necat. Dentium dolorem oblitum aut cauernis inditum mitigat. Vrinæ difficili prodesse existimatur. Resoluitur ad potiones amaris nucibus, aqua aut ruta, aut calido pane, mulsave. Alias meconio, ære vsto, aut felle liquido. Si purgare galbanū voles, in feruentem aquam demittito. Namq; cum liquefactum fuerit, eius fordes fluitabunt. Quas hoc modo facile separabis. Mundo linteo alligatum in fistili aut æreā pixide ita pendeat, vt imum vasis ne tangat. Opertoq; vase in feruidam aquam demittito. Sic enim syncarū, veluti per colum eliquescet, & lignosum in linteo remanebit.

De Ammoniaco.

CAP.

XCVII.

a Mmoniācū hærba est, ex qua Ammoniācū fit suffimen quod tymiama vocāt, aliqui Agazyllon, alij Criotheum, alij Heluistrum, Romani guttam appellāt. Ferulæ succus est, quam iuxta Cyrenen Aphrica gignit. Cuius fruticē cum radice Agasyllim vocant. Probatum bene coloratum, ligni & calculorum expers, thuris similitudine, minutis glebis, defum, syncarum, nulla sordē spurcatum, castoreum odore imitans, gustu amarum. Hoc genus trausma idest friaturam appellant. Quod vero terram & calculos collegit, Phryama quod significat misturam. Gignitur in Aphrica iuxta Ammonis oraculum, succum stillante ferulacea arbore. Mollit, extrahit, calfacit. Tubercula duriciaq; discutit. Porum aluum soluit. Partus extrahit

DE MEDICINALI MATERIA

Lienem consumit, drachmæ pondere haustum. Articulorum coxendicumq; doloribus liberat. Auxilio est anhelatoribus, orthopnoicis, comitialibus. Item quibus humor in pectore coit, si cum melle delingatur, aut cum prisanæ succo sorbeatur. Cruentam vrinam pellit. Albugines oculorum absterget. Genarum scabriciam absument. Tritū autem cum aceto & impositum, iocineris lienisq; duricias sedat. Discutit tofos, qui in artubus cōcalluerunt, cum melle aut cum pice illitum. Lassitudines & coxendicum dolores eo perungi vtile est, cum nitro & cyprino oleo vice acopi.

De Sarcocolla. CAP. XCVIII.

Arcocolla lachryma est arboris in Perside nascentis, pollinithuris similis, ruffa, gustu amara. Vulnera glutinat. Oculorum fluxiones inhibet. Emplastris inseritur. Adulteratur ammisso gummi.

De Glaucio. CAP. XCIX.

Laucium succus est herbæ quæ in Hierapoli Syriæ nascitur, folijs fere corniculati papaueris, pinguioribus tamen, in terram sparsis, odoris tetri, gustus amari. Tota croceo succo madet. Folia in olla fictili semifrigidis clibanis calcaciunt indigenæ, vsq; dum flaccescant. Deinde contusis succum exprimunt. Cuius est vsus ad oculorum medicamenta. Vt pote cum inter initia refrigeret.

De Glutino. CAP. C.

Lutinium quod Xylocollan, alij Taurocollan vocant, præstantissimum Rhodiaceum, quod ex bubulis corijs conficitur. Id candidum est & translucens. Nigrū vero minus probatur. Resolutum in aceto, impetigines leprasq; cutis delet. Ambustis igni ex aqua calida impositum, pustulas erumpere non patitur. Vulneribus prodest melle aut aceto madefactum.

De Glutino piscium. CAP. CI.

Luten piscium, venter est piscis cetacei. Præstat candicans, natione ponticū, subasperum, carens squammis, & quod celerrime liquefit. Vtile emplastris, capitis & leprarum medicaminibus, & tetanochris, quæ cutem faciei erugant & extendunt.

De Visco. CAP. CII.

Isfum optimum est recens, intus porraceum, extra fuluum, quod asperini nihil, aut fursurosi concœperit. Fit acinis in robore nascentibus, buxæ fruticis folio. Contusum acinum lauant, & postea in aqua decoquunt. Sunt qui commanducando ipsum efficiant. Gignitur quoq; in malo, pyro, & plerisq; alijs arboribus. Quinetiam inuenitur in quorundam fruticum radicibus. Emollit,

discutit, extrahit. Parotidas, tubercula, cæteraſq; collectiones, ad ma-
turationem perducit. Cum refina autem & cæra pari, epinyctidas in
ſplenio ſanat. Vetera vlcera ſuppurationeſq; quas cacoethe vocât, ex
thure mollit. Lienē cū calce, Gagate, aut Aſio lapide, impoſitum ab-
ſumit. Cum ſandaraca, aut auripigmento illitum vngues extrahit.
Miſtum cum calce & vini ſæce, ſuam vim intendit.

De Aparinæ.

CAP.

CIII.

Parinen aliqui Ampelocarpon, alij Omphalocarpon, non-
a nulli Philanthron vocant, ramaſam hærbam & quadran-
gulam, ex interuallis orbiculato foliorum ambitu, vt in ru-
bia. Flos albus, ſemen durum, rotundum, cōcauum, album, vmbilici fi-
gura, aſperitate veſtium tenaci. Ea paſtores coli vice vtuntur, ad exi-
mendos e laſte pilos. Seminis caulium ac foliorum ſuccus, potu con-
tra viperarum phalangiorumq; morſus auxiliatur. In ſuſu aurium do-
lori medetur. Hærbæ cum axungia trita ſtrumas diſcutit.

De Alyſſo.

CAP.

CIIII.

Lyſſon aliqui Aſpidion, alij Aplophyllon, alij Accyſiton,
a alij A deſeton nuncupant. Fruticoſa hærbula eſt, vnicaulis,
rotundis folijs, fruſtu duplicium ſcutorum effigie, in quo eſt
ſemen, quadam tenuis latum. In mōtib; & aſperis locis emicat. Eius
decoctum ſingultus ſine febris, potu diſcutit. Idem efficit ſi quis eā aut
teneat, aut odoretur. Cum melle trita, vitia cutis in facie, & lentigines
emendat. Contuſa in edulio, rabiei canis mederi putatur. Domib;
appenaſ ſalutaris eſſe creditur. Et hominib; atq; animalib; ſcincit,
amuletum. Purpureo linteo circumligata pecorum morbos abigit.

De Aſclepiade.

CAP.

CV.

Sclepiadem aliqui Ciſſion, alij Ciſſophyllon, nomināt. Ra-
a mos emittit longos, folia hederæ, radices numeroſas, tenues,
odoratas. Floris virus graue. Semen ſecuridacæ. Naſcitur
in montib;. Radices ex vino potæ tormētib; auxiliantur, & con-
tra ſerpentium iſtus. Folia aduerſus vuluæ mammaramq; vlcera, quæ
cacoethe vocant, illinuntur.

De Atraſylide.

CAP.

CVI.

Traſylis quam aliqui Amyron vocant, alij Cnicon ſylue-
a ſtem, alij Aſpidion, Magi Aphedron, Aegyptij Chenon,
Romani Præſepium, aliqui ſuſum agreſtem, alij Colum ru-
ſticam, ſpina eſt Cnico ſimilis, folia multo longiora ferens, in ſum-
mis virgis, magna parte nuda, aſperaq;. Quæ ſœminæ pro ſuſis vtun-
tur. Capitula in cacumine ſpinis horrent. Flos luteus. Quibuſdam in
locis purpureus inuenitur. Radix tenuis ſuperuacua. Coma, ſemen &

DE MEDICINALI MATERIA

folia cum pipere & vino teruntur vtilissime contra scorpionum ictus. Percussos tradunt quamdiu ea teneatur hærba, nullum experiri dolorem, ipsumq; deposita, statim recrudescere.

De Polycnemo. CAP. CVII.

Olycnemon quidam Clinopedion, alij Polygonaton, alij
 p Iouis colum, alij Echeonymon vocât. Frutex est furculosus, folijs Origani, caule Pulegij, geniculis multis intercepto, sine umbella, tenui tamē in cacumine corymbo, boni odoris & acris. Veneribus agglutinandis recens aut aridum cum aqua, efficaciter illinitur. Sed quinto die solui debet. Ad vrinæ stillicidia ruptaq; cum vino bibitur. Edocuit experientia contritos in vino albo ramulos, ijs qui affectibus laborant, quæ violentiæ vocantur, magno esse præsidio.

De Clinopodio. CAP. CVIII.

Linopodion aliqui Cleonicon, alij Ocimoides, alij zopyron vocant, fruticem folijs serpyllo similem, furculosum, dum palmorum altitudine. Nascitur in petrosis. Flores marubij, ex interuallis specie lectipedum præbent. Bibitur hærba & succi eius decoctum, ad conuulsa, rupta, strangurias, serpentium ictus. Menfes & partus pellit. Et penfiles verrucas quas Acrochordonas vocât, eijsit aliquot diebus potum. Alium fislit decoctum ad tertias, potumq; si febrim sentiunt ex aqua. Alioquin ex vino.

De Leontopedalo. CAP. CIX.

Leontopedalon aliquibus Leontopodion, alijs Leuceoron, alijs Leontiō, alijs Doris aut Dorideris, alijs Lychnis agria alijs Pardale, alijs Horybethron, alijs Rhapeion, Romanis Patabelclon, aut semen leoninum dicitur. Caulem emittit dodrantalē, aut altiore, plurimis alis concavum, & in cacumine semina duo aut tria, in siliquis ciceris modo. Flores fremio similes, punicei coloris. Folia brassicæ, sed papaueris diuisura. Radicibus nigris rapæ similibus, torosis. Nascitur in aruis & segetibus. Radix auxiliatur serpentium ictibus ex vino pota. Nec alia res celerius dolorem finit. Miscetur ischiadicorum clysteribus.

De Teucrio. CAP. CX.

Eucrion siue vtralijs placet Teucris, Hærba est virgæ referens effigiem, Trifaginis similitudine, tenui folio, non multū a cicere alieno. Hæc in Cilicia iuxta Getiadem Scissademq; vbertim provenit. Recens cum posca, aut aridæ feruifictæ ius, potum licet nem poterit absumit. Lienosis cum aceto & ficis illinitur. Item serpentium moribus ex aceto solo, siue ficis.

LIBER TERTIVS

78

De Trifagine.

CAP.

CXI.

c Hamædrys Græcis, alijs Chamædrops. Latinis Trifago dicitur. Sunt qui eam Teucrion appellauere, propter eam quæ cum Teucrio seruat similitudinem. Nascitur in Petrosis & asperis. Frutex dodrantalis, folia habens exigua, amara, effigie & diuisura quercus. Flore pene purpureo. Carpitur semine prægnans. Recens in aqua decocta, potu tussibus, indurato lienî, vrinæ difficultati, incipientibus hydropicis, auxiliatur. Cit menses. Partus extrahit. Lienem ex aceto pota consumit. Aduersus serpentium venena ex vino, potu illituq; efficacissima. Trita digeritur in pastillos ad supradicta. Purgat vetera vlcera cum melle. Cum oleo illita caliginē oculorum discutit. Natura eius est calfacere.

De Leucade.

CAP.

CXII.

l Eucas montana, latioribus q; vrbana folijs, semine acriore, amariore, ori ingrato. Efficacior tamē q; satiuâ habet. Vtraq; ex vino contra animalium venena, præcipue marinorum, opitulatur.

De Lychnide.

CAP.

CXIII.

l ychnis coronaria quam aliqui Arthanaton vocant, alijs Acy-
lonion, alijs Ballariō, alijs Geranopodion, quidā Corymbiō,
aliqui Taurion, alijs Scepstrū aut Maloion, Aegyptij Seme-
on, Magi Sanguinē Apocathemenes, Romani Genicularē aut Bala-
riam, Flore est albæ violæ simili, quo corollæ fastitantur. Cōtra scor-
pionū iētus semen in vino potum auxiliatur.

De Syluestri Lychnide. CAP. CXIIII.

l ychnis syluestris, Tragonoton, alias Atocion, alias Hieraco-
podion, aut Lampas vocatur. Aegyptijs Semura, Magis
Apocathemenes Taurus, Romanis Agreste intubum. Om-
nia vrbana similis. Bilem per aluū detrahit, semine duabus drachmis
poto. Iētis a Scorpione subuenit. Aiunt huius hærbae appositu, scor-
piones torpescere & inertes prorsus reddi.

De Lilio.

CAP.

CXV.

g Raci Crinon basilicon vocāt, alijs Crinanthemon, alijs Calli-
rion, Magi Martis sanguinem. Osthanes auram Crocodili,
Aegyptij Simphæphon, quidam Tialon, Latini Liliū, ali-
qui Rosam iconis. Syri Safa. Aphri Abiblabon. Lilia coronamen-
tis se dedūt, Lyria a quibusdam vocata. E quibus vnguentum tempe-
ratur, quod aliqui Lirinū, alijs Sufinū appellant. Nervos & priua-
tim vuluæ duricias emolliens. Folia hærbae illita contra serpentium
iētus auxiliatur. Feruēfacta ambustis proficiunt. Aceto cōdita vulne

DE MEDICINALI MATERIA

ribus opitulantur. Succus adiecto melle aut aceto, in æreo vase coquitur, conuenienti medicamento vetustati vlcerum, & ad recentia vulnera. Inassata radix & ex rosaceo trita igni ambusta sanat. Vuluam emollit. Menses ciet. Vlcera cicatrice obducit. Cum melle detrita neruis præcis luxatisq; medetur. Vitiliginis, surfures, & lepras emendat. Vlceraq; in capite manantia expurgat. Abstergit faciem & erugat. Teritur in aceto cum Hyoscyami folijs & farina tritici, mulcêdis testium inflammationibus. Semen potū moribus serpētium aduersatur. Ignibus sacris semen & folia cum vino illinuntur. Tradunt & rubra esse Lilia. In Syria autem & Pisidia Pamphiliæ efficacissima, vnguentis nascuntur.

De Ballote seu Marrubio nigro. CAP. CXVI.

Alloten nomine alio nigrum Marrubiū, aut magnū vocant, **b** aliqui Nophthan, alij Notianoscemin, alij Nosprallon, alij Nothera, alij Nochein aut Nosteli, alij Nophrim, alij Gnoturim, Romani Vlcerariam aut Marrubium nigrum, alij Cāthurinū, Aegyptij Asphon, Magi Ifionis sanguinem. Caules ædit quadrangulos, nigros, subhirsutos, complures ex vna radice. Folijs maioribus q̄ Marrubij, hispidis, intercedente spatio, subrotundis, graue olentibus, apiastro proximis. Vnde aliqui Apiastrum eam vocauerunt. Caulibus albis orbiculato florū ambitu, qui rotæ speciē præbeat. Vis eius efficax aduersus canis morsus, folijs ex sale illitis. Feruenti cinere flaccescunt folia, vt condylomata reprimant. Purgant & sordida vlcera cum melle.

De Apiastro. CAP. CXVII.

Elissophyllon Græci, alij Melithæum, alij Melithænā, alij **m** Meliphyllon, alij Erythran, Latini Apiastrum aut Citraginem, Galli Merfūmorion vocant. Id sibi nomen vlturpauit, quoniā apes ipsa hærba delectatur. Cauliculi & folia Ballotæ, de qua paulo ante diximus similia essent, nisi minora tenuioraq; nec ita hirsuta spectarentur. Citreum malum olent. Folia cum vino pota aut illita profunt contra iktus Phalangiorum scorpionumq;. Item aduersus canis morsum. Decocto eorūdem gratia, foueri prodest. Defessionibus fœminarum ad ciundos menses conuenit. Dentes eodem in dolore coeluuntur. Dysentericis infunditur. Fungorum strangulationibus folia addito nitro, potu auxiliantur. Torminibus & orthopnoicis delinctu. Illita cum sale strumas discutiunt. Vlcera purgant. Articularios dolores illita sedant.

LIBER TERTIVS

79

De Marrubio.

CAP.

CXVIII.

Raffion e Græcis aliqui vocāt, alij Eupatorium, alij Phyl-
 p lophares, alij Tripedilon, alij Camelopodion, Aegyptij
 Asteropen, Magi taurisanguinem, aliqui Aphedron, Latini
 Marrubium, aliqui Labeoniam, Aphri Atierberziam. Frutex est ab
 radice ramosus, candicans, subhirsutus, quadrangularibus ramis. Fo-
 lium pollicem æquat, subrotundum, hispidum, rugosum, gustu amaro.
 Semen in caulibus, et ex interuallis flores verticillato ambitu, asperi.
 Nascitur prope ædificia, & ruderata loca. Huius folia sicca, cum se-
 mine decocta in aqua, aut viridium succus datur cum melle suspiriosis,
 tussientibus, & ad tabitudinem redactis. Crassam e pectore pituitam,
 cum sicca Iri eiicit. Mulieribus a partu nō purgatis datur, vt mēstrua
 & secūdas extrahat. Item in difficili partu, & his qui venena hauserūt,
 aut a serpentibus demorſi sunt. Veficam renesq; lædit. Folia cum melle
 illinuntur sordidis vlceribus purgandis. Pterygia nomasq; sistūt. La-
 terum dolores mitigant. Succus folijs contusis expressus, & sole co-
 ctus ad eadem pollet. Cum vino & melle illitus, oculorum claritatem
 adiuuat. Naribus regium morbum expurgat. Aurium doloribus cō-
 uenienter instillatur, per se aut cum rosaceo.

De Stachye.

CAP.

CXIX.

Tachys frutex est, Marrubio similis, sed longior. Folia ferēs
 f numerosa, hirsuta, rara, prædura, cana, odoris iucūdi, & com-
 plures virgas ab radice exeuntes, Marrubio cādidiores. Na-
 scitur in mōtibus & asperis. Vim habet excaſfactoriam & acrem. Fo-
 liorum decoctum potu pellit mēstrua & secundas.

De Phyllitide.

CAP.

CXX.

Hyllitis quam aliqui Phyllin, alij Acaulon, alij Syluestre la-
 p pathum vocitant, folia promit Rumici familia, longiora, &
 p viridiora, sena aut septena, quæ parte anteriore læuia cernun-
 tur, a tergo autem pensiles quasi vermiculōs ostendunt. In vmbrosis,
 & opacis hortorum ambulationibus emicat, gustu acerbo. Neq; caulē
 neq; semen profert. Folia in vino pota serpentium morſibus aduerſan-
 tur. Quadrupedibus per os infusa auxilio sunt. Et si dysenteria aut res-
 soluta alius exercet, potui dantur.

De Phalangio.

CAP.

CXXI.

Halangium a quibusdam Phalāgition vocatur, ab alijs Leu-
 p cacantha. Ramuli sunt ei duo, pluresve, in diuersa tendentes,
 p flos candidus, Lilio similis, multas incisuras habens. Semine
 nigro, lato ad lenticulæ dimidiatæ figuram, multo tenuiore. Radice
 parua, tenui, hærbacki coloris, dū a terra eruitur. Prouenit in collibus

DE MEDICINALI MATERIA

Huius folio semine flore cum vino potio, auxiliatur contra scorpionū phalangiorumq; ictus. Tormina quoq; discutit.

De Trifolio.

CAP. CXXI.

Ræci Triphyllon, alij Oxphyllon, alij Menyanthes, alij
 g Asphalion, alij Cnicion vocant. Romani Trifolium, aut
 acutum aut odoratum. Frutex supra cubiti altitudinem at-
 tollitur, virgas habens tenues, iunceas & nigras, e quibus ramulares
 enascuntur appēdiculæ, quæ in terna singulis germinationibus exeunt
 folia, Loto arbori similia. Ijs recēter enatis rutæ odor inest. Vbi autē
 adoluerunt, bitumen olent. Florem ædit purpureum, semen quadamte-
 nus latum, subhirsutum, ex altera extremitate exertum veluti cornicu-
 lum gerens. Radix tenuis, longa, valida. Semen & folia in aqua pota
 pleuriticis, urinæ difficultati, comitialibus, & ijs qui aquæ inter cutē
 principia sentiunt, sceminis quoq; vuluæ vitio oportunis, auxiliā-
 tur. Menses cit, ternæ dragmæ e semine dari debent, e folijs vero qua-
 ternæ. Cōtra serpentium ictus trita folia & ex aceto mulso pota, præ-
 sidio sunt. Tradunt aliqui totius fruticis, radicis, foliorumq; decoctū
 fotu dolores eorum finire, quos serpētes percusserint. Qua autem aqua
 huiuscemodi, sanatus quis fuerit, si ea quispiā alius foueatur, qui vlcus
 habuerit, perinde afficitur vt a serpente demorsus. Quidam terna folia
 aut semina in tertianis, cum vino potui dedere, & in quartanis quater-
 na, vt quæ febrium circuitus discuterent. Radix antidotis inferitur.

De Polio.

CAP. CXXII.

Olium montanum, aliqui Theuthrion, alij Feuxaspidon, alij
 p Achaemenin, alij Ebenitin, alij Melosmon, nōnulli Belion,
 quidam Leontocharon vocant. Duo genera eius. Monta-
 num cui Teuthrion nomen est, & cuius est vsus. Tenuis frutex est, candi-
 dus, neq; palmo altior, semine refertus. Capitulo in cacumine quandā
 corymborum speciem præ se ferente, paruo, canis hominis simili, gra-
 uiter olente, non sine quādam suauitate. Alterum fruticosius non vsq;
 adeo valens odore, & viribus infirmius. Potum feruefacti ius auxilia-
 tur serpētium ictibus. Hydropicis, morbo regio, & lienosis ex aceto.
 Stomachum male habet. Caput doloribus afficit. Alium & menses
 ciet. Substratum suffitum v e serpentes abigit. Illitum vulnera conglu-
 tinat.

De Scordio.

CAP. CXXIII.

Cordium aliqui Scorbion, alij Pleuritin, alij Dysosmon, alij
 f syluestrem Calaminthen, quidam Chamædryn, alij Mithri-
 danion, Magi Podotis sanguinem, Aegyptij Apho, Roma-
 ni Trifaginem palustrem appellant. In mōtibus & palustribus nasci-

tur, folijs Trifaginis, maioribus, nō sic in ambitu diuifis, aliquātū Alia redolentibus, gustu amaris & adstringentibus. Quadrangulis caulibus, subrubro flore. Hærbæ vim excafcatoriam habet. Vrinam cit. Coctæ recens aridæ cum vino, aduerfus venenatos serpentium morsus bibitur. Ad stomachi quoq; rofiones, dysenteriam, & vrinæ diffcultatem, binis drachmis cum hydromelite. Crassamen purulētum pectore expellit. Facit aridæ farina ad veterem tussim, rupta, conuulsa, si cum nasturcio melle & resina misceatur in eclegmate. Inflammata mor dice præcordia cærato excepta, recreat. Cum aceto acri aut aqua, podagris conuenienter illinitur. Menses imposita mouet. Vulnera conglutinat. Vetera vlcera purgat, & ex melle ad cicatricem perducit. Sicca excrementia in carne cohibet. Succus ad eadem vitia bibitur. Inter prima efficax Ponticum natione, Creticumq;.

De Tussilagine, CAP. CXXV.

Echion Græci, quidam Richion, alij Petrinam vocant, alij
 b Peganon, alij Pithion, alij Pagonaton, alij Chamæleucen, *rac dyne*
 alij Procheton, alij Arcophyton, alij Chamægiron, Aegyptij Saarthan, Latini Tussilaginem, quidam Pharphariam aut Pustulaginem, Bessî Asa. Folia ei sunt maiuscula q̃ hederæ, sex aut septem a radice, subalbida a terra, superne virentia, in plures angulos exeuria. Caulis palmū altus, flos luteus. In vere, flore & caule cōfestim exurit. Inde nonnulli his vacare existimauerunt. Radix tenuis est & superuacua. Nascitur in amœnis & riguis. Folia ex melle trita ignisacro & omnibus inflammationibus illitu medetur. Aridæ fumus per infundibulū hianti ore raptus, hos sanat qui sicca tussi atq; orthopnœa infestantur. Pectoris vomicas rumpit. Eundem effectum præbet suffrata radix. Decocta in hydromelite & pota emortuos partus eiicit.

De Artemisia. CAP. CXXVI.

Artemisia ramosa Græcis quibusdā Monoclonos, alijs Toxitesia, alijs Ephefia, alijs anadiorios, alijs Sozusa, alijs Lycophryx. Magis hominis sanguis, alijs Crysanthemum Romanis hærbæ regia, aut Arthemisia, alijs Rapiū, aut Tertana, Gallis Pona, Dacis Zuoste dicitur. Magna ex parte in maritimis nascitur. Absinthij modo fruticosa, maioribus & pinguioribus folijs, ramisq; Tenuior autem flore est paruo, tenui, candido, graue olente. Aestate floret. Sūt qui in mediterraneis Vnicaulis nomine appellēt, tenuē hærbulā, simplici caule & minuto, floribus scatente, flauo colore. Hæc iucundiorē q̃ præcedens efflat odorem. Vtraq; excafcacit, extenuat. Feruentia conuenienter in muliebres defessus adiiciuntur, ad detrahendos menses, partus, secundasq;. Item ad præclusiones vuluæ, & eiusdem in-

DE MEDICINALI MATERIA

flammationes. Calculos comminuunt. Remorata[m] vrinā cient. Men-
ses pellunt pubi illitæ. Succus vuluæ inditus ex myrrhā eadem quæ
infectio trahit. Coma tribus drachmis eorundem educendorum gra-
tia bibitur.

De Artemisia tenuiore. CAP. CXXVI.

Ltera tenuioribus folijs, in sepibus & cultis, iuxta aquarum
ductus, nascitur. Cuius flores & folia cōtrita. Samplici odo-
rem reddūt. Si quis stomacho laboret, hærbam cum amygda-
lino oleo bene contundat, in malagmatis lentorem, & stomacho im-
ponat, sanitati restituetur. Qui neruorum dolore cruciantur, si succum
ex rosaceo illinant, sanantur.

De Ambrosia. CAP. CXXVII.

Mbrofia quam Romani caprum syluaticum vocant, quidā
Botryn, alij Apium rusticū, Aegyptij Merseon. Tenuis fru-
tex est ramosus, trium fere palmorum, folijs rutæ, circa imum
caule[m] exiguis. Cauliculi seminibus, perinde quasi racemulis grauidi,
nunq̃ florem pariunt. Olore vinoso, suauī. Radice tenni, sesquipedali.
Coronātur ea Cappadoces. Vis eius reprimere ac repellere. Erillituz
adstringere humores qui in aliquam partem incumbunt.

De Botrye. CAP. CXXVIII.

Otrys fruticosa hærbæ est, lutea tota, & in multas alas spar-
sa. Semē circa ramulos prouenit. Folia Cichorio similia. To-
ta suauem odorē spirat. Quare vestimētis interponitur. Inue-
nitur in torrentium ripis. Pota orthopnœas mulcet. Hanc cappado-
ces Ambrosiam vocant, alij Artemisiam.

De Geranio. CAP. CXXIX.

Eraniion aliqui Peloniten, alij Trica, alij Geranogerōta, Ro-
mani Vchinastrum, Aphri Lescen appellāt. Folijs Fremij, di-
uisuris longioribus, radice rotunda, dulci. Quæ drachmæ pō-
dere in vino pota, vuluæ inflationes discutit.

De Altero Geranio. CAP. CXXX.

Eraniū alterū, aliqui Myrrhin, alij Oxyphyllon, alij Car-
damomum, alij Origanum vocāt, Magi Hierobryncas, La-
tini gruina[m], aut pulmoniam, aut cicotriam. Caulibus minu-
tis & pilosis sesquipedalibus. Folijs maluæ. In summis alijs sursum
spectantia gruum capitula insunt, cum suis rostris, aut canini dentes.
Nullius in medicina vsus.

De Gnaphalio. CAP. CXXXI.

Naphalion, alij Hires, alij Ampetocon, alij Anaxiton, alij
Anaphalin, Aegyptij Semeon, Galli Gelafonen, Latini cen-

LIBER TERTIVS

81

tūculū vocant, quidā tucularē, alij Albinū. Cuius folijs mollibus minutisq; pro tomēto vtūtur. Bibūtur efficaciter folia in vino austero ad dysenteria.

De Typha. CAP. CXXXII.

typha foliū ædit cyperidi simile, caulē albū, læuē, æquabilē, florē in cacumine ambiētē, densū, qui in pappos soluitur, quod lanuginem aliqui nominant. Huius hærbae flos, suillo adipe eloto exceptus, ābustis medetur. Gignitur in palustribus & aquis stagnantibus.

De Circea. CAP. CXXXIII.

Ircæ quā & dircæā aliqui vocant, folijs est hortensis solani Agnaris crebris, flore nigro, pusillo, copioso. Semine millij nascente in quibusdam corniculis. Dodrātali radice, triplici ferme aut quadruplici, candida, odorata, exaltatiōe. Nascitur in apricis, saxis & vērto perflatis. Radicis tusæ triēs, in sextarijs tribus vini dulcis, per diem & noctem maceratur, potuq; triduo vuluas expurgat. Semen sorbitionibus datum, lacte, mammas nutricum explet.

De Oenanthē. CAP. CXXXIII.

Enanthe quam aliqui Cerascomion, alij Leucanthon vocant. Folia habet pastinacæ, florem candidum, caulem crassum, palmi altitudine. Semē atriplicis. Radicem magnam, in multa rotunda capitula extuberantem. Nascitur in petris. Caulis eius & folia, cum melle & vino pota secūdas eiiciunt. Radix e vino vrinae stillicidio conuenit.

De Conyza magna. CAP. CXXXV.

Onyza magna aliquibus cynozematitis, alijs Danais, alijs Tanachion, aliquibus Phycos, alijs Ichis, alijs Dinofmos, Magis Brephodonos, quibusdā anubias, nōnullis hedemias, Aegyptijs Ceti, Romanis militaris aut deliarium, aut febrifuga, alijs fraginosa nuncupatur.

De Conyza parua. CAP. CXXXVI.

Onyza duo genera. Quæ parua vocatur, odore præstantior est. Maior vero frutice altior, & folijs latioribus, graui odore. Vtriusq; folia oliuæ similia, hirsuta, pingua. In maiore caulis binum cubitorum altitudine attollitur. In minore pedem æquat. Flos squallidus, lutei aut fului coloris. Qui in pappū abit. Radices superuacua. Suffitu substratuq; frutex animalia fugat. Culices abigit, & pulices necat. Folia cōuenienter illinuntur serpentium plagis, & tulerculis, ac vulneribus. Flos cum vino ad menses partusq; eiiciendos bibitur. Item contra vrinae stillicidia, arquat morbum, & tormina. Comitiales potus ex aceto adiuuat. Decoctum in deflectionibus medetur vuluæ malis. Impositus succus abortum facit. Ex oleo efficaciter rigoribus oblinitur. Capitis dolores tenuis illita sanat.

DE MEDICINALI MATERIA

De altera Conyza. CAP. CXXXVII.

Stet tertiū Conyza genus, quod aliqui paruā, alij Paniō, alij

c Libanotidē. Magi cronō vocāt. Caule crassiore, ac molliore.

Folijs q̄ paruæ maiusculis, minime pinguis, & maiore minor, multo grauioris odoris & iniucundioris. Sed inefficacior. Prouenit locis nō riguis. De Lilio syluestri. CAP. CXXXVIII.

8 Raci Hemerocallen, alij Hemerocatalacton, alij Crinō agri on, alij Crināthemon, alij Porphyranthes, alij Bulbum hæ-

maticon, alij Anticantharon, Romani bulbum, aut Lilium syluestre, aut marinū, Aphri Abiblabon vocant. Folium & caulem habet Lilij, porraceo colore. Flores in caule per singulos exortus, terni aut quaterni erumpunt, Lilij diuisura, quoties dehiscere cœperunt. Colore perq̄ pallido. Radix magna est atq; bulbosa. Quæ pota aut cū melle & lana in pessa apposita, aquam educit & sanguinem. Folia tria mammarum inflammationes a partu contrahas, oculorumq; collectiones mitigant. Radix & folia igni ambustis vtilissime illinūtur.

De Viola alba. CAP. CXXXIX.

1 Eucoion ex Græcis aliqui Basilion vocant, Latini violam albam, aliqui augustiam, nōnulli violam autūnalem, aut passarinam. Vulgaris est notitiæ, sed in floribus differentia

quædam. Namq; aut cærulei, aut albi, aut purpurei, aut lutei inueniuntur. Lutea vero præcipui in medicina vsus. Huius aridi flores feruescunt in defensionibus, valent contra vuluæ inflammationes. Et mēstrua expellunt. Sanant oris vlcera cum melle. Cum cærato rimas sedis. Semen duum drachmarum pondere ex vino potum, aut cum melle indistum, menses, secundas & partus extrahit. Radices cum aceto illitæ lienem reprimunt Et podagricos iuuant.

De Cratæogono. CAP. CXL.

0 Rataëgonum, siue vt alijs placet Cratæonon, folijs tritico simile est, multis calamis ex vna radice emicantibus, multorumq; geniculorum. Semine milij. Nascitur in opacis & frutetosis, summopere acre. Traditum est a quibusdam, quod si bibat ieiuno ore, ter in die post mēses purgatos, tribus obolis in cyathis aquæ duobus mulier, ante conceptum quadraginta diebus, & vir modo con-

fimili, totidē diebus ante coitum hauriat, virilis sexus partū futurū.

De Phyllo. CAP. CXLI.

2 Hyllon aliqui Elæophyllō vocāt. Nascit in faxis, sed quod

p Thelygnō vocāt, est veluti muscus, folio oliuæ, magis hærbacei coloris, Caule tenui ac breui. Radice minuta. Flore candido. Semine papaueris simili, maiore. Sed arrhenogonon cætera huic si

mile, solo fructu distat. Habet enim vuas deflorētibz oleis non diffimiles. Arrhenogonon potu, masculi sexus facere partus, vt thelygonō fœminei proditur. Horū Crateuas auctor est. Sed huiusmodi historia tenus, mihi produxisse videtur.

De Testiculo Canis. CAP. CXLII.

Testiculus Canis quem græci Orchin, aut Cynoforchin vocant, folijs circa caulē mollis oleæ similibus, in terra stratis, longioribus, angustis, læuibus. Caule dodrantali, floribus purpureis, radice bulbosa, oblonga, oliuæ modo angusta, duplici ordine, superiore quæ plenior est, inferiore, quæ mollior ac rugosior. Eduntur radices coctæ, vt bulbi. Ex quibus si maiore edāt viri, mares generari dicuntur. Si minore fœminæ, alterū sexū. Addūt, in Thessalia molles mulieres in lacte caprino bibere, ad stimulos coitus. Aridæ vero ad inhibendos. Et alterū alterius potu resolui. Nascitur in petrosis & sabuletis.

De altero Testiculo. CAP. CXLIII.

Testiculus qui alio nomine Serapias, Andrea auctore vocatur, quoniam radix inter pauca utilis fit, folijs est porri, latioribus, oblongis, pinguibus, ex alarum sinu inflexis. Caule palmeo, floribus pene purpureis. Radice testiculis simili. Quæ illi tumores discutit. Vlcera purgat, & serpere eadem non paritur. Abolet fistulas. Et illitu inflammationes lenit. Aridæ radices nomas inhibent. Sanantq; oris putredines, & vlcera cacoethæ. Aluū sistunt e vino potæ. De hac, eadem quæ de testiculo Canis, produntur.

De Satyrio. CAP. CXLIIII.

Athyrium aliqui Trifolium vocant, quoniam tria fert folia, ad terram infracta, Rumici aut Lilio similia, minora tamen ac rubra. Caulem cubitalem, nudū. Florem Lilij effigie, candidum, radicem bulbosam, mali magnitudine, fuluam, intus vt ouum candidam, gustanti dulcem, & ori non ingrati. Quam in vino nigro austero bibere conuenit, contra opisthotonum. Utendū ea dum concumbendi incessit cupiditas. Siquidem ea, promores ad venerem fieri affirmant.

De Satyrio Erythronio. CAP. CXLV.

Athyriū Erythronion, aliqui Erythraicon, alij Melion aqueum, alij Entaticon, alij Priapicon, aut Satyricon, aliqui Satyri testiculum appellant, Latini molorticulum veneris. Semine lini, maiore, duro, læui, splendēte. Quod fertur, non secus atq; Scincus libidinem excitare. Corticis radicis gracili, ruffo. Intus autem album includitur, sapore dulci non ingrato ori. In mōtis & apricis nascitur. Venerem vt produnt, si omnino manu teneatur radix, stimulat. Eoq; magis si bibatur in vino.

DE MEDICINALI MATERIA

De Hormino.

CAP.

CXLVI.

Orminum satium a Latinis Geminalis, a Dacis Hormia
 h dicitur. Folijs est Marrubio similis, caule semicubitali, qua-
 drangulo, circa quem eminentiæ filiquis similes prodeunt,
 quæ ad radicem spectant, in quibus diuersum semen recluditur. Siqui-
 de in syluestri rotundum, fuscumque inuenitur. In altero nigrum, & ob-
 longum, cuius est vsus. Ad venerem stimulamdam, cum vino bibi vo-
 lunt. Purgat cum melle argema albuginesque. Illitum ex aqua tumores
 discutit. Eo etiam extrahuntur aculei, ex corpore. Idem effectus est illi-
 tæ hærbæ. Syluestre magis viribus pollet. Quare vnguentis præfer-
 tum gleucino permiscetur.

De Securigada.

CAP.

CXLVII.

Edysaron vnguentarij pelecinum id est Securigadam vocat.
 h Fruticosa est, folijs ciceris. Semen rufum in filiquis fert, corni-
 culorum modo aduncis, quod ancipitem securim æmulatur.
 Vnde nomē accepit. Amarum gustu. Stomacho vtile in potu. Addi-
 tur in antidotis. Cum melle ante coitus subditum, concipiendi spem
 adimit. Nascitur in segetibus & hordeis.

De Onosmate.

CAP.

CXLVIII.

Nosma aliqui Osmeden, alij Ononin, alij Phlonytin appel-
 o lant. Oblonga folia habet, ad similitudinē anchusæ, longitudine
 quattuor digitorum & duum latitudine, mollia, in terra iacētia.
 Sine caule, sine semine, sine flore. Radice nititur longa, tenui, infirma, ru-
 bescēte. Gignitur in asperis. Folia in vino pota partus extrahūt. Præ-
 gnans si eam supergrediatur, abortum facere dicitur.

De Nymphæa.

CAP.

CXLIX.

Nymphæa nascitur in paludibus, & stagnantibus aquis, folijs
 n ciborio minoribus, & longioribus. Alijs in summa aqua, alijs
 demersis, pluribus ex radice prodeuntibus. Flore lilijs simili,
 albo, & in medio crocos habente. Cum defloruerit, ut rotundum ma-
 lum, aut papaueris caput, extuberat. Nigro semine, denso & lato, lenti
 gustus. Caulis est laevis, niger, minime crassus, ciborio cognatus. Ra-
 dix nigra, scabra, clauæ similis. Quæ autumno secatur. Sicca cum vino
 pota cœliaci dysentericisque auxiliatur. Lienē absumit. Radix stomachi
 ac vesicæ doloribus illinitur. Vitilignes ex aqua emendat. Impos-
 sita cum pice, alopecij medetur. Eadem contra veneris insomnia bibi-
 tur. Siquidem ea prorsus adimit. Pota assidue aliquot diebus, genita-
 le infirmat. Idem semen potum efficit. Nymphææ nomen sibi vendi-
 casse videtur, quoniam aquosa amet. Plurima inuenitur in Helide, in
 Anygro amne, & in Beorix Haliarto.

LIBER TERTIVS

55

De altera Nymphæa.

CAP. CL.

St & altera Nymphæa, cuius flos Blephara dicitur, folijs ante didæ. Radice alba, scabra, flore luteo, nitente, rosæ simili. Huius semen & radix, contra sceminarû profluuiâ efficaciter ex vino nigro bibuntur. Nascitur in Thessalia amne peneo.

De Androsace.

CAP.

CLI.

Androsaces, sunt qui Picrada appellât, alij Leucen, alij Thassiam. Hæba est amara, tenues spargēs iuncos, sine folijs. Folliculos in capitulis habens, in quibus semen continetur. Gignitur in Syriæ maritimis. Ea drachmis duabus in vino pota copiosam hydropicis vrinam ciet. Idem effectus est semini pota, & hæbæ decocto. Podagris vtiliter illinitur.

De Splenio.

CAP.

CLII.

Splenium aliqui Scolopendrium vocant, alij Splenion, alij Hemionium, alij Pteryx, alij Lonchitum, alij Arurion, alij Phrygiam, aut Phrygitum, aliqui Philtrodoten, Magi mustellæ sanguinem. Folijs est multis, Scolopendræ animali similibus, ab radice vna prodeuntibus. Nascitur in parietibus, saxiq; filiceis, & opacis. Nec caulem nec florem nec semē habet. Folia filiculæ modo diuiduntur. Subter flauescencia hirsutaq; superne viridia. Vim hanc habent folia in aceto feruefacta, vt per dies quadraginta pota, lienem absumant. Quibus etiam contritis lienem ex vino illini oportet. Stranguriæ & regio morbo prodest. Singultum sedat. Calculos in vesica cōminuit. Conceptum adimere creditur, per sese aut cum muli liene appensa. Tradunt noctu, silente luna, huius rei gratia effodiendam.

De Hemionitide.

CAP.

CLIII.

Hemionitis quam aliqui Splenion vocant, folium emittit Draunculi, lunatū. Radicibus cohæret multis, tenuibus. Nunq̃ flores neq; semen neq; caulem gignit. In petrosis nascens, austero sapore. Ea ex aceto pota lienem absumit.

De Anthyllide.

CAP.

CLIIII.

Anthyllis quam quidam Anthemida vocât, alij Eræthemion, alij Leucanthemon, alij Soranthin, alij Campestem florem. Romani Solastrum, duplex est. Quædam enim lenti similis, folijs mollibus, rectis ramulis, palmi altitudine, radice parua, tenui. Nascitur in salis terris, & a sole illustratis, non insulso gustu. Altera est folijs ramulifq; trifragini similis, hirsutioribus tamen, breuioribus & asperioribus. Flore purpureo, odoris admodū grauis. Radice Cichorij. Pota drachmis quattuor vrinæ difficultati renibusq; plurimū prodest. Tritæ, vuluæ pituitas emolliūt, cū rosaceo & lacte impossitæ. Vulneribus medentur, quæ autem trifraginis similitudinem refert,

DE MEDICINALI MATERIA

pota cum aceto mulso comitiales sanat.

De Anthemide.

CAP.

CLV.

a Nthemida aliqui Leucanthemon, alij Heranthemon, quoniam vere floreat, alij Chamæmelon, quoniam mali odorem habeat, nonnulli Melanthemon, alij Chrysocomam, alij caliam, Romani mallium, Aphri asteriphen appellat. Genera eius tria, tantum flore distantia. Rami palmum non excedunt, fruticosi, alis multis, concavi. Tenuibus ramulis, rotundis capitulis, floribus in medio aureis, forinsecus orbiculato ambitu, candidis, melinis aut purpureis, magnitudine foliorum rutæ. Nascitur in asperis, & iuxta semitas. Coligitur vere. Vinum habent radices flores & herba excalfaciendi extenuandi. Potu & infusione, pellunt menstrua, partus, urinam, calculosque. Aduersus inflationes & ilei tormenta bibuntur. Bilem suffusam expurgant. Locinerum vitia sanant. Decocto earum vesicæ fouentur. Ex omnibus his generibus ad calculos efficacissima est, quæ florem purpureum habet, cuius amplitudo maiuscula est. Hæc proprie Heranthemon vocant. Ea cui Leucanthemo nomen est, itæ quæ Crysanthemum dicitur, vehementius urinam ciunt. Aegilopijs illitæ medentur. Comamanducatæ vlcerum eruptiones in ore, sanant. Nonnulli in clysteribus ex oleo vruntur. Teruntur in farinam ad abigendos febrium circuitus. Flores & folia recondi debent, & priuatim tusa, in pastillos digeri. Radix quoque siccare, dumque ingruit necessitas, binæ partes herbarum dari, modo floris aut radices pars una, modo contra, floris partes duæ & herbarum una, permutatim duplicato pondere alternis diebus. Bibere autem oportet in vino mulso diluto.

De Parthenio.

CAP.

CLVI.

p Arthenium aliqui Amaracon vocant, alij Anthemida, alij Leucanthemon, alij Camæmelon, alij Chrysocalin, alij Melabathron, nonnulli campestem florem, Romani Solisseculum, aliqui millefolium, Hetrusci Cautam, Aphri Thamath. Folijs est coriandri, tenuibus, flore per ambitum albo, intus melino, odore graui, sapore amaro. Siccatur cum aceto mulso aut sale potum, non secus atque Epithymum, & bilem & pituitam detrahit. Sufpiriosis prodest & melancholicis. Herba sine flore a calculosis & anhelatoribus magna vtilitate bibitur. Valet decoctum ad insedendum in duricia vulvarum & inflammationibus. Illinitur sacro igni & collectionibus cum flore.

De Vphthalmo.

CAP.

CLVII.

b Vphthalmon quidam cachlam vocant, alij Balsamenā, Magi hæmoran, alij mercurij genituram, alij Aphthitis semen, aut mnesitheum, Romani cappacoraniā, Aphri narat. Te

nues emittit cauliculos mollesq; folia fœniculi, luteum florē Anthemide maiorem, oculi similitudine. Vnde nomē traxit. Circa opida nascitur, & in campestribus. Flores cum carato tritici tumores duriciasq; discutiunt. Aiunt epotam post exitum a balneis, regio morbo correptis, colorem tractu temporis reddere.

De Pœonia.

CAP.

CLVIII.

Aeonias mas siue glycyfide, Græcis aliquibus Pētooron dicitur, alijs Orobeliō, quibusdā Orobax, alijs Hæmagogō, alijs Pæsæden, alijs Monogenion, alijs Menion, alijs Pæonion, alijs Panthiceratos, alijs ideī dastyli, alijs Aglaophotis, alijs Theodonion, alijs Selenion. Magis Selenogonō, alijs Phthifis, Romanis casta. Caulis altitudine sesquipedis adolescit, comitantibus multis stolonibus. Huius duo genera. Mas folia iuglandis habet. In fœmina vero, Smyrni more diuiditur. Summo caule siliquas emittit veluti græcas nucs. In quibus, quum dehiscit, multa granula rubra, acinis punicorum similia, inueniuntur, & in medio nigra, quinque aut sex purpurea. Radix maris tenuis, digitali crassitudine, & palmi longitudine, gustu adstringens, alba. Fœminæ radicibus ceu glandes circiter septem aut octo inhærent vt in hastula regia. Fœminis a partu non purgatis sicca radix datur. Ciet menses nucis græcæ magnitudine pota. Sic vêtis doloribus cum vino auxiliatur. Valet cōtra regiū morbum & renum ac vesicæ dolores. Decocta in vino aluum sistit. Rubra grana rubentis menses sistunt, decem vel duodecim pota in vino austro & nigro. Stomacho & erosionibus eius esse prodest. A pueris pota, initia calculorum eximunt. Grana nigra auxiliantur suppressionibus nocturnis, vuluæ stragulationibus, & matricis doloribus, quindecim numero pota, in aqua mulsa aut vino. Nascitur in altissimis montibus & promontorijs.

De Lithospermo.

CAP.

CLIX.

Ithospermō alij Aegonychō vocāt, alij Leontion, alij Leoninum lapidem, alij Gorgonion, alij Tantalitin, alij Diosporon, Romani Columbam. Daci Gonolerā, alij Heracliam. A feminis duricia nomē accepit. Folijs est oliuæ longioribus, & latioribus. Tacent humi quæ ab radice exiliunt. Ramulis furculosis, rebus, tenuibus, firmis, crassitudine iunci. In quorum cacumine bifidi exortus, cauliculorum speciem exhibent. Folijs longis, inter quæ paruum semen, rotundum, erui magnitudine, duricea lapidea. Nascitur in asperis & æditis locis. Vim hanc habet vt semine cum vino albo potocalculos frangat, pellatq; vrinam.

DE MEDICINALI MATERIA

De Phalaride.

CAP.

CLX.

Halaris cauliculos emittit, quales zea, & minutis ac nullius
 p vsus radicibus, multos, duum palmorum, geniculis cinctos.
 Semen candidum, oblōgum, milij magnitudine. Tunditur,
 et in aqua aut vino succus ad vesicæ cruciatus vtilissime bibitur. Se-
 men cochleari mensura potum ad eadem efficax est.

De Rubia.

CAP.

CLXI.

Rythrodanū aliqui Teuthrion, alij Dracanon, alij Cinnaba-
 c rim, Latini Rubiā, Etrusci Lappam minorem, Aegyptij
 Sophobi vocant. Radix rubra est, qua tinguntur lanae. Vna
 sponte provenit. Altera feritur vt in Thebana Galileā, & Rauēna I-
 talia. In Caria inter oleas, vt in aruis, solo creditur. Hāc nō sine quā-
 stu ferunt. Namq; maximum ex ea sentiunt prouentum. Asperi caules
 & quadranguli, longi, Aparinae nō dissimiles, robustiores, & multo
 maiores. Folijs per interualla certa circū articulos, stellatim decussa-
 ris. Semen eius rotundum, inter initia viride, mox rubrum, postea cum
 ematuruit nigrū. Radix tenuis, lōga, rubra. Vrinam ciet. Qua de cau-
 sa regio morbo opitulatur, pota cum aqua mulsa. Item Ischiadicis &
 resolutis. Crassam copiosamq; vrinam pellit, nonnunq; & sanguinem.
 Bibentes tamen quotidie lauari oportet, & excrementorum quā red-
 duntur differentiam spectare. Aduersus serpētium morsus, succum ex
 vino bibere prodest. Semen ex aceto potum lienem absumit. Impossi-
 ta radix trahit partus, menses, secūdāsq;. Albā vitiligini, illita ex ace-
 to medetur.

De Lonchitide.

CAP.

CLXII.

Onchitis quæ Cestron aut Medusa alio nomine dicitur, lati-
 I ne venerea aut Lanceola, folia habet latioris porri, rubētia,
 plurima, ad radicem circumfracta, veluti in terram procum-
 bentia, pauca in caule. In quo flores ceu galericuli hiantibus comicis
 personis similes, nigri, & velut e ristu albam exerentes linguam, quā
 ad labrum inferius semē promat, lanceæ simile, triangulum. Vnde sibi
 cognomentum arrogauit. Radix dauci. Nascitur in sitiētibus & aspe-
 ris. Radix ex vino pota vrinam ciet.

De altera Lonchitide.

CAP.

CLXIII.

Ltera est Lonchitis, quam aliqui asperam Lonchitin, Latini
 a Longinā, aut Calabrinam dicūt. Folia Scolopēdrij emittit.
 Sed asperiora maioraq; ac multo magis diuisa. Vulneribus
 mirum in modum prodest. In eisq; inflammationes excitari non pati-
 tur. Pota ex aceto lienem absumit.

LIBER TERTIVS.

85

De Althæa.

CAP. CLXIII.

Lthæa quam alij Althiocon, alij Ibiscū vocant, in syluestriū
 a maluarū genere est, cui folia vt Cyclamino rotunda, lanugi-
 ne canescunt. Flore rosaceo, bicubitali caule. Radice lenta, in-
 rus alba. Althæa appellatur q̃ inter primas sit vtilis, & pluribus pol-
 leat remedijs. Decocta enim in vino aut aqua mulsā, in potu efficax est
 contra vulnera, parotidas, abscessus, mammarum inflammationes, at-
 tritus sedis, inflationes, neruorum rigores. Siquidem discutit, & ex-
 coquit, rumpit, & ad cicatricem perducit. Cocta vt dictum est, adiecto
 suillo adipe, aut anserino, terebinthinave, vt malagmatis lentor fiat, sa-
 cit ad vuluæ inflammationes, præclusionesq̃ in pessis subdita. Deco-
 ctum eodē fungitur munere. Onera vuluæ reliquiasq̃ a partu extrahit.
 Decoctæ succus ex vino potus, succurrit vrinæ difficultati, calculoso-
 rum cruditatibus, dysentericis, ischiadicis, tremulis, ruptis. Dentium
 mulcet dolorem, cū aceto decocta, colluto inde ore. Viride semen sic-
 cumq̃ tritum, vitilignes in sole perunctas emendat. Eodem cum oleo
 peruncti, a venenatis non feriuntur. Valet contra dysenteriam & san-
 guinis reiectiones, aluiq̃ profluuium. In posca aut vino decoctum bi-
 bitur, cōtra omnes vesparum, apum, similiūq̃ aculeatos ictus. Folia
 cū olei momento, morfibz & igni ambustis illinuntur. Constat aquā
 trita radice addita, sub diuo addensari

De Alcea.

CAP.

CLXV.

Lcea syluestrium maluarum generi assignatur. Folia habet di-
 a uisa, Verbenacæ proxima, caules treis aut quattuor, cortice
 cānabino vestitos. Florem rosæ, paruum, radices albas, latas,
 quinq̃ aut sex, cum plurimum cubitales. Quæ cum vino aut aqua po-
 tæ dysentericis ruptisq̃ medentur.

De syluestri Cannabe

CAP.

CLXVI.

yluestris Cannabis quā aliqui Hydrastinam, Romani termi-
 f nalē vocāt, virgas fert Althææ similes, minores, nigriores
 & asperiores, cubiti altitudinem æquantes. Folio satiuæ, ni-
 griore & asperiore, flore Lychnidis, subrubro, semine & radice Al-
 thææ. Decocta radix, illitu inflāationes mulcet. Tumores discutit.
 Tofos articulorum dissipat. Huius cortex, torquendis funibus accom-
 modatus.

De satiuā Cannabe.

CAP.

CLXVII.

Atiuā Cānabim aliqui Cānabion, alij Schinostrophon, alij
 f Asterion appellarūt, plātam magni in vita vsus, ad robustis-
 simos funes faciendos. Folijs mali, graui odore, caulibus pro-
 ceris, inanibus, semine rotundo. Quod largiore cibo genituram extin-

DE MEDICINALI MATERIA

guit. Succus ex ea recente cōueniēter auriū doloribus instillatur.

De Anagyri.

CAP. CLXVIII.

Nagyris quā aliqui Acopon, alij Anagyron, alij Agnaco-
 a pon vocant, frutex est arboris instar, grauis odore, folijs agni
 virgiscq; flore oleris. Semē in corniculis nō breuibz gignit,
 subrotundum, firmum, versicolori facie, simile renibus, quod durefcit
 per messes. Tenera folia tumores illitu reprimunt. Si partus hæreat, &
 secundæ mensesq; morentur, drachmæ pondere bibuntur in passo. Sic
 et suspiriosis dantur, & contra capitis dolores in vino. Difficulter pa-
 rientibus adalligantur, ita vt a partu statim auferantur. Radicis cor-
 tex concoquendis discutiendisq; adhibetur. Semen commanducatum
 vomitiones vehementer ciet.

De Cepæ.

CAP. CLXIX.

Epæa portulacæ similis est, sed nigriora habet folia, & radicē
 c tenuem. Folia in vino pota, vrinæ stillicidio, & vesicæ scabie
 laborantibus, opitulantur. Maxime id præstat, si cum deco-
 ro radicum Asparagi bibatur.

De Alismæ.

CAP. CLXX.

Lisma alij Alceā, alij Damassonion, alij Acyrō, alij Lyron,
 a appellant. Folia ei plantaginis, nisi angustiora essent, lacrimo-
 sa, cōnexaq; in terram, caule simpliciter tenui, cubito altiore,
 capitibus thyrsi. Flore tenui, candido, pallefciente, radicibus tenuibus,
 vt veratri nigri, acribus, odoratis, pinguibz. A quosos amat trañtus.
 Radix si drachma vna aut altera bibatur, his cōuenit qui leporem ma-
 rinum deuorarūt, aut a rubetis ranis demorsifunt, aut opium hauerūt.
 Torminibus atq; dysenterix, per se aut cū pari modo Dauci, potui da-
 tur. Conuulsis & contra vitia vuluæ prodest. Hæba sistit aluum. Mē-
 strua pellit. Tumores illita mitigat.

De Onobrychide.

CAP. CLXXI.

Nobrychis quæ Græcis aliqui Onobrochilon, alij Eschaf-
 o menē, alij Corion, alij Chamæpityn, Romani opacā, alij Bri-
 chilatam, alij Loptrā, alij Iocinale, Daci Aniassexe appellāt.
 Folia habet lentis, longiora paulo, caulem dodrantalem. Florem pur-
 pureum, radicem parua. Nasçitur in vlginosis. Hæba suapte vi fi-
 trita illinatur, tubercula dissipat. Cum vino pota strangurias sanat. Il-
 lita ex oleo sudores mouet.

De Hyperico.

CAP. CLXXII.

ypericū alij Androsamō, alij Coriō, alij Chamæpithyn ap-
 h pellāt, quoniā semē odore resinā imitatur. Surculaceo frutice,
 dodrātali, rubente. Folio rutæ, flore albæ violæ simili, qui di-

gitis tritus sanguineū succum remittit. Qua ex causa Androsæmon cōgnominatur. Subhirsuta filiqua, & tereti, hordei magnitudine, semine intus nigro, resinosi odoris. Gignitur in cultis & asperis. Urinam cit. Menstrua pellit appositum. Tertianis quartanisq; cum vino potum liberat. Semē triginta diebus haustum, ischiadicis medetur. Folia cum semine illita ambusta sanant.

De Ascyro.

CAP. CLXXIII.

a Scyrum quod a quibusdam Ascyroides nominatur, hyperici genus est, magnitudine distans, fruticosius, maiores habet ramos, rubentia folia, tenuia. Flores luteos & fructum resinofum, hyperico non absumilem. Cuius attritu digiti fere cruentantur. Qua de causa Androsæmum vocauere. Vfus seminis ad ischiadicos. Potum in hydromelitis sextario biliosa recrementa amplissime detrahit. Sed assidue dare oportet, donēc sanitati restituantur. Illinitur & ambustis efficaciter.

De Androsæmo.

CAP. CLXXIIII.

a Androsæmon siue ut alij appellauere Ascyron, aut Dionysiadem, ab hyperico ascyroq; differt, quod surculosum ac tenuius sit. Rubentes rami, & folia rutæ duplicia, aut triplicia. Quæ trita vinoso succo manant, Complureis alas habet in cacumine, in versus vtrinq; digestas. In quibus flores pusilli lutei & in calyculis semen Papaueris nigri, insignis lineis. Huius comæ tritæ resinofum odorem reddunt. Semen drachmis duabus potum, biliosa excrementa pellit. Ischiadicis medetur, sed a purgatione aquam exorbere oportet. Hærbæ ambustis illita medetur. Vulneribus sanguinem cohibet.

De Cori.

CAP. CLXXV.

c Oris quod aliqui hypericon vocant, frutex est folio ericæ, rubro, pinguiore, ac minore, non altior palmo, suavis, odoratus, acris. Potum semen menses trahit & urinas. Contra Phalangiorum morsus ex vino potum auxilio est. Rigoribus ex pipere, opisthotonicis ex oleo, aptissime illinitur. Radix vino decocta potaq; defectis opem ferre creditur. Sed laborantem inter potandum q̄ optime cooperiri licet. Siquidem corpus totum desudabit, ex qua re pristina agilitatem recuperabit.

De Aiuga.

CAP. CLXXVI.

g Ræcis chamæpitys, alijs pitysoryfis, alijs Orizelon, ijs qui pontū incolūt Olocyron, alijs Bryonia sylvestris, Athenis Ionia, Euboicis Sideritis, Magis mineræ sanguis, Latinis Aiuga aut cypripū, Dacis Dochela appellatur. Hærbæ in terra repēs incurua, folijs semperuiui minoris, multo tenuioribus, hirsutis et pin-

Chamæpitys
Orizelon

DE MEDICINALI MATERIA

pinguioribus, circum ramos defis. Olore pinus, flore tenui, luteo, vel candido, radicibus cichorij. Folia septem diebus in vino porta, regio morbo medentur. Et quadraginta diebus ex hydromelite, ischiadicos sanant. Dantur peculiariter urinæ difficultatibus, iocineris & renum vitij. Torminosis prosunt. Ea apud heracleam pōticam, perinde atq; antidoto contra aconitum vtuntur, bibentes decoctum. Ad antedicta illinitur, cum polenta iure decocti subacta. Trita in farinam & cum fico in pilulis sumpta, aluum emollit. Excepta melle cum æris squama & refina purgat. Apposita ex melle vuluæ vitia extrahit. Mammarum duricias discutit. Vulnere glutinat. Vlcera quæ serpunt cum melle illita cohibet.

De altera Aiuga.

CAP. CLXXVII.

a. Lterum est genus Aiugæ, cubitalibus ramis, in anchoræ speciem incuruatis, prætenuibibus, coma præcedentis, flore candido, semine nigro. Hæc pinū redolet. Tertia mas nominatur, paruula, folijs exilibus, albis, scabris, caule aspero, cādido, luteis floribus, semine iuxta alas. Resipit hæc pinum. Vim eandem obtinet, sed non vsq; adeo efficacem.

Pedacij Dioscoridis Anazarbei
de medicinali materia

Tertij Libri

F I N I S

LIBER QVARTVS. 87
 PEDACII DIOSCORIDIS ANAZARBEI
 DE MEDICINALI MATERIA LI-
 BER QVARTVS, IOANNE
 RVELLIO SVSSIO
 NENSI IN-
 TERPRE
 TE.

I

N superioribus libris amantissime Ari-
 tradidimus de odoramentis, oleis, arbori-
 bus, vnguentis, animalibus, frumentis, o-
 leribus, radicibus, succis, hærbis, semini-
 busq;. In hoc autem quarto differemus de
 radicibus & eis quæ restant hærbis.

De Betonica.

CAP.

I

Estron Psychotrophon vocitatur, quoniã frigidis locis inue-
 niatur. Latini Betonicam appellât. Hæba est, caulem ferēs
 tenuem, cubiti altitudine, aut maiorē, quadratum, folia quær-
 cus, mollia, longa, in ambitu diuisa, odorata, prope radicem maiora.
 In summis caulibus, semen veluti Satureiæ spicatum inest. Decerpta
 huius folia siccantur, plurimos ad vsus. Radicibus nititur vt veratri
 tenuibus. Quæ ex hydromelite in potu, pituitosam vomitionem euo-
 cant. Folia dari debent ruptis, cōuulsis, mulieribus vuluæ malo opor-
 tunis, & ad laxandos vteri strāgulatus, drachmæ vnius pondere cum
 hydromelite. Tres in vini sextario drachmæ, contra serpentium mora-
 sus ebibuntur. Hæba magna vtilitate illatis a serpente vulneribus il-
 linitur. Aduersus etiam venena drachma ex vino pota conuenit. Præ-
 sumpta ea, si venenum hauriatur, nihil nocebit. Vinam ciet. Aluum
 subducit. Medetur comitialibus & infanis pota ex aqua, & iocineris
 lienisq; vitijs, drachmæ pondere in aceto mulso. Concoctionem adiu-
 uat, si quis ea sabæ magnitudine secundum cœnam cum melle cocto de-
 uorarit. Modo confirmili accide rustatibus propinatur. Stomachicis
 eam manducare & succum deuorare proderit, si postea dilutum vinum
 forbeatur. Datur sanguinem excreantibus tribus obolis, cū diluti vini
 aut lactis cyatho. Ischiadicis, renum & vesicæ doloribus ex aqua. A-
 quæ intercutem binis drachmis ex hydromelite. Regio morbo laborā-
 tes recreat. Menses pellit, drachmæ pondere cum vino pota. Aluum
 purgant drachmæ quattuor potæ, in hydromelitis decem cyathis. Fa-
 cit cum melle ad tabem & purulētam excreationem. Folia sicca tritaq;
 fidili vase reconduntur.

DE MEDICINALI MATERIA

De Bretanica.

CAP.

II.

b Retanica aut Vettonica, folia habet syluestris lapathi, sed nigriora, & densiora, gustu adstringentia. Radicem tenuem & breuem. Caulem paruū emittit. Folijs exprimitur succus, qui igni aut sole cogitur. Vim habet adstringentem. Priuatim depascentibus oris & tonsillarum vlceribus accommodatam. Valet etiam ad reliqua, quibus adstrictione est opus.

De Vettonica.

CAP.

III.

v Ettonica nascitur in pratis & montibus, locis mundis, & opacis, circa frutices. Animas hominū & corpora custodit, nocturnas ambulationes, & loca sancta. Grauius somnis resistit. Ad omnem medendi vsum commendata. Radicem habet rubram, odoratam, porracea folia, medio eorum puniceo, in recto calamo triangula, floribus in cacumine purpureis. Farina recentis vulneribus capitis indita, dolorē finit. Vulnera glutinat. Fracta ossa extrahit. Sed quotidie imponi debet, dum persanescant. Dolori capitis medetur, si iure decocti perfundatur, aut temporibus cum bitumine illinatur, aut radix suffiatur.

De Lysimachia.

CAP.

IIII.

I ysimachia, quā aliqui Lytron appellant, caules emittit cubitales altioresve, fruticosos, tenues, prodeūtibz geniculatim folijs, tenuibus, salicis figura, gustu adstringētibus, flore rufescenti aut aureo. Gignitur in aquosis & palustribus. Foliorum succus adstringēte sua vi sanguinis reiectionem supprimit. Dysentericis potui datur, aut infunditur. Menstrui abundantiam sistit, in pefso. Sanguinis profluuiū subuenit, si nares ea hærba obturentur. Vulnerum cruorem cohibet. Acerrimum nidorem suffita reddit. Qua de causa serpentes fugat, & muscas interficit.

De Sanguinaria ceu polygono.

CAP.

V.

p Polygonum arifhen, aliqui Polygonatum appellant, alij Cynochalam, alij Heraciam, alij Asphalton, alij Chiliophylon, alij Clena, alij Polycarpon, alij Carcinethron, alij Teuthalida, alij Myrtopetalon, alij Cnopodion, alij zaritheā, alij Pedalion, Aegyptij Telphin, aliqui Stēphin, Magi genituram herois, alij qui vnguem muris, Latini Sanguinariam aut feminalem, Aphri Chulum. Ramos habet teneros & molles, frequentibus geniculis cinctos, qui per terram vt gramen repunt. Folia rutæ, sed molliora planioraq;. Semine sub omnibus folijs turgescēte. Vnde marem appellari volūt. Flos ei cādīdus, aut puniceus. Vis epoti succi est spissare ac refrigerare. Prodest cruentæ excreationi, cholerae, alui fluxionibus, & vrinæ

Stillicidio . Vrinam aperte ciet . Cum vino potus, contra serpentium morsus auxiliatur . Datur in febribus per horam ante significationes . Fœminarum profluvia impositu sistit . Idem succus purulentis auribus instillatur . Facit eximie ad genitalium vlcera , cum vino adiecto melle decoctus . Stomachi feruori, sanguinis reiectionibus, vlceribus quæ serpunt, ignibus sacris, collectionibus, tumoribus, & recentibus vulneribus folia illinuntur .

De Sanguinaria fœmina . CAP . VI .

f Anguinaria fœmina fruticat vno caule, arūdinine teneræ similibi, densis geniculis, & in se tubarum modo factis, tuberibus articulorū eminus, torulisq; cingentibus . Folijs picæ . Radicis nullus vsus . Nascitur in riguis . Huic quoq; spissandi refrigerandiq; natura, ad eadem valens sed inefficacior .

De Polygonato . CAP . VII .

p Polygonatum nascitur in montibus, frutice cubito altiore, folijs lauri, latioribus, & læuoribus, sapore mali coronei, aut punici, cum quadam adstrictione . Flores per singulos foliorum exortus promit, candidos, folijs numerosiores incepta a radice supputatione . Radicem habet albam, mollem, longam, crebro geniculatam, densam, graueolentem, digitum crassitudine æquantem . Quæ vulneribus efficaciter illinitur . Quinetiam maculas in facie delet .

De Clematide . CAP . VIII .

c Lematis Græcis, alijs Phyleteriō, ab alijs Daphnoides ab alijs Smyrnoides, aut polygonoides appellatur . Læto pinguiq; solo prouenit, iuncos spargens exiguos . Folia lauri figura & colore, multo minora . Folia cum caulibus in vino pota, alui profluvia & dysenterias sedant . Subdita in p̄sso cum lacte & rosa ceo aut cyprino, cruciatibus vuluæ medentur . Dolores dentium comamanducata finit . Imposita serpentium moribus iuuamentum præstat . Fertur etiam contra aspidum ictus ex aceto pota opitulari . Gignitur solo inculto .

De altera Clematide . CAP . IX .

c St & altera Clematis, quā aliqui Epigetin, Aegyptij Philæcrion, Romani Ambuxū vocitant . Viriculos emittit rubescientes, lentos, folium gustu admodum acre, ac exulcerās . Repit per arbores vt Smilax . Semen tritum pituitam bilemque detrahit, in aqua aut hydromelite potum . Folia eius illita, lepras purgant . Cum Lepidio conditur ad cibos .

DE MEDICINALI MATERIA

De Polemonia.

CAP.

X.

P Olemonia alij Phylætheria, Cappadoces Chiliodynamin appellat. Ramis exilibus in versus vtrinque digestis. Folijs paulo quã Ruta maioribus, ac longioribus, calaminthæ aut sanguinariæ proximis. Quibus in summis corymbi dependent, nigro semine. Radice cubitali, albicante, radiculæ simili. Nascitur in montosis & asperis. Bibitur in vino radix contra serpentes & dysenteriam. Et ex aqua aduersus urinæ difficultatem & coxendicum cruciatus. Datur ex aceto drachmæ pondere lienosis. Eadem scorpionis plagæ alligatur. Tradunt eum qui radicem gestauerit, a scorpione non feriri, eumque si idus sit, nihil molesti passurum. Dentium dolorem mansa mitigat.

De Alo.

CAP.

XI.

f ymphyton petreon id est alus, nascitur in petris, ramis tenuibus, paruis, origano similibus, capitulis thymi, furculosum totum, odoratum, gustu dulce, saluam ciens. Longa radice, subruffa, digitali crassitudine. Decoctum in aqua mulsa & potum pulmonis vitia purgat. Sanguinem reiicientibus & renu malis ex aqua datur. Ad dysenteriam rubramque scæminarum profluvia in vino decoctum. Ad conuulsa vero & rupta ex aceto mulso bibitur. Quin & com manducatum sitim sedat. Faucibus asperis subuenit. Vulnere recentia enterocelasque coaglutinat, & illitu cohibet. Carnes autem cum symphyto decoctæ coalescunt.

De Altero Symphyto.

CAP.

XII.

e St & aliud Symphyton quod aliqui pecton, Romani Soldaginem vocant. Id caulem emittit bicubitalem, aut maiorem, crassum, leuè, angulosum, inanem, quasi fungosum, circa quæ breui interuacante spacio, folia exeunt angusta, linguæ bubulæ proxima, oblonga, hirsuta, caule secundum angulos quosdam striato. Folijs tenuibus ex alarum sinu prodeuntibus. In quibus flores lutei, rutaceis similes, & verbasci semina emicant. Tam caulis quam folia, aspera lanugine horrent, tactusque pruritum concitant. Radices demittuntur foris nigrae, intus candidæ, viscosæ. Quarum est usus. Tritæ & potæ cruentis excreationibus, ruptisque proficiunt. Recentia vulnere illitæ coaglutinât. Carnes quoque si concoquantur, cogunt additæ. Inflammationibus præsertim sedis, cum senectutis folijs, vtiliter illinuntur.

De Holoste.

CAP.

XIII.

h Olosteon quadrantalisis hærbula est, humi repens, folijs viticulisque coronopo aut gramini proximis, gustu adstringentibus. Radice, alba, prætenui usque in capillamentis speciem, longitudine quattuor digitorum. Nascitur in collibus terrenis. Usus eius

adrupta in vino pota. Nā & carnes coguntur, decoctionibus addita.

De Stoebe.

CAP.

XIII.

Toebe quam alij Tobion, Romani stipam vocant. Vulgaris est notitiæ. Cuius semen & folia stringunt. Quapropter decoctum dysentericis infunditur. Auribus quoque purulentis instillatur. Illita folia oculis ab ictu cruentis profunt. Erumpentis sanguinis impetus, cohibent.

De Volucro.

CAP.

XV.

Ræci clymenon vocant, alij Calycanthemon, alij Peryclymenon, alij Helyophyes, nonnulli Hepatin, alij Milacem, alij Anatolicon, alij Dyticon, alij merginē, Latini volucrū, aliqui volucrum maius. Aegyptij oxioni. Clymenion quod & ago non, id est sterile, nūcupant, caulem fert fabæ, quadratum, folia plantaginis, folliculis supra caulem in sese inflexis, iridi & poliporum cirris non ab similibus. Probatissimum est e montibus. E frutice toto cum radice succus exprimitur, qui ad sanguinis reiectiones, in potu efficax est. Celiacos rubraque foeminarum profluuia, refrigerando infrenat. Sanguinem naribus erumpentem suppressit. Trita folia aut filiquæ recentibus vulneribus impositæ, ea ad cicatricē perducunt.

De Periclymeno.

CAP.

XVI.

Ericlymenon aliqui Aeginā, alij Cylmenon, alij Carpathon, alij Splenion, alij Epetin, alij Axinam maiorem, nonnulli clematin, alij Myrcinen, alij Calycanthemō, Magi polion veneris, Aegyptij turcon, Romani volucrū maius, Aphri lanath appellant. Simplex fruticat, ex intervallis parua folia habens, ipsum amplectentia, subcandida, hederacea. Inter folia surculi exeunt, in quibus baccae, hederæ similes. Flos fabæ, candidus, aliquantum rotundus, & quasi in foliū procubens, semen durū, & quod difficile euellatur. Radice rotunda, crassa. Nascitur in aruis ac sæpibus, cōuoluens se adminiculis, propter assidentibus. Semen eius postquam ematuruit collectum, & in umbra siccatur, drachmæ pōdere datur in vino quadragenis diebus, ut licnem absumat, ac molestiā discutiat. Sed vrinā ciet, statim a sexto die cruentā. Orthopnoeæ & singultui prodest. Partū accelerat. Folia sunt eisdem viribus prædita. Quæ tricenis septenis diebus epota, sterilitatem facere produntur. Perunctis ex oleo febrium rigores abigunt.

De Tribulo.

CAP.

XVII.

Ribulus aliquibus Bucephalus, alijs Tauroceros, Romanis tribulus aquaticus dicit. Tribuli genus unū terrestre, folijs ad effigiem portulacæ, tenuioribus viticulis, in terra stratis, spinis secundum folia rigidis, præduris. Iuxta amnes & domicilia nascit. Est

DE MEDICINALI MATERIA

& alterū genus aquis familiare, quod in fluminibus natū comā exerit, aculeos condens. Folijs latis & pediculo longo. Caule parte summa q̄ ima crassiori. Capillamenta quædam indidem exorta spicantur. Semen durum, ab altero non abhorrens. Vterq; refrigerantis & inspissantis est naturæ. Ideo inflammationes omneis cataplasmate adiuuat. Vlcera in ore erumpentia, putredines, gingiuas, tonsillasq; per sanat. Succus ex his colligitur ad oculorum medicinas. Semen dum recens bibitur, calculosis iuuamētum affert. Drachma terrestris tribuli pota, illi ita ve, iētos a vipera recreat. Contra venena cum vino aptissime bibitur. Decoctum eius sparsum pulices necat. Thraces qui ad Strymona amnē habitant, virēti tribulo equos sagināt, & e dulci semine & esculentō panem quo vescuntur faciunt.

De Sarxiphago. CAP. XVIII.

Arxiphagō aliqui Sarxiphragō, alij Empetron, Romani saxifragiam vocant. Frutex est surculosus, in petris & asperis locis nascens. Coctus in vino, mox potus, febricitantibus opitulatur. Stranguriæ prodest. Singultum sedat. Calculos vesicæ frangit, & vrinam ciet.

De Limonio. CAP. XIX.

Imonion aliquibus Potamogiton appellatur, alijs Neuroides, alijs Lonchitis, alijs Rapionion, Myrsis Mendruta, Syris Meuda, alijs Lycosemphyllon, alijs Heleborosemata, alijs Scyllion, Magis lupi cor, Romanis viartū nigrum, quibusdam tinabulum terræ, Gallis iubarū, Dacis dacina. Folia habet betæ, tenuiora & longiora, decem, sæpe plura, caulem tenuem, rectum, vt in lilio æqualem, seminibus scatentem, quæ gustata adstringunt. Semen tritum & ex vino acetabuli mēsurā potū, dysentericis celiacisq; prodest. Rubra sceminarum profluvia sistit. Nascitur in pratis & palustribus.

De Lagopo. CAP. XX.

Agopus hæba, quam aliqui Leporis cuminum appellāt, sistit aluum in vino pota, aut in febrī ex aqua. Eadem inguini adligatur, in inflammatione. Nascitur in segetibus.

De Medio. CAP. XXI.

Edion aliqui medicam appellant, alij Triphyllon, alij Clemathion, nonnulli Osmō, quidā Trigonon, alij Cybelliō, alij polyphyllon, Romani Trifoliū odoratū, Aegyptij Epaphon. Medion in faxis & opacis nascitur. Folia habet Iridis, caulē tricubitalē, & in eo florē grandē, purpureū, rotundū, semine cnici minuto, radicem dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbo. Quæ trita in

LIBER QVARTVS

90

farinam & ex melle decocta, rubros mēses fœminarum sistit, eclegmate per aliquot dies sumpto. Semen in vino potum mēstrua pellit.

De Epimedio.

CAP.

XXII.

Pimediū ab alijs Erincos, ab alijs Tryas, a nōnullis Polyrhizon, a Romanis vindiſta nominatur. Caulis est non magnus, hederæ folijs, denis atq; duodenis, neq; florem neq; fructum ferens. Radice tenui, nigra, graui odore, gustu ſatuo. Nascitur in humidis. Folia cū oleo trita, imposito cataplasmate, māmas increſcere non ſiunt. Radix cōceptū adimit. Folia quinis drachmis, poſt mēſtruas purgationes quinque diebus in vino pota, præſtant mulieribus ne concipiant.

De Gladiola.

CAP.

XXIII.

yphion, aliqui Anaſtorion, alijs Phaſganon, alijs Machæron, alijs Arion vocāt, Romani gladiolam, quidam genitalē. Nomen inde accēpit, q̄ foliū, gladij præbeat ſpeciem. Iridi ſimile erat, niſi minus & anguſtius videretur, & gladij modo mucronatum, neruoſumq; . In caulem exit cubitalem, in quo purpurei flores, in ordinem digeſſi, inter ſe diſtant. Rotundo ſemine, radicibus geminis, vna bulborum modo ſuper alteram inſidente. Quarum inferior gracilis eſt, ſuperna vberior. Nascitur in aruiſ. Pars ſuperior radicis cum thure illita, admiſto vino, ſpicula & aculeos e corpore extrahit. Panos cum lolij farina & hydromelite diſcutit. Qua dere huiuſmodi emplaſtris inferi ſolet. Menſes impoſita trahit. Superiori radice ex vino pota, venerem ſtimulari, & inferiore ſumpta ſterileſcere tradunt. Superiorem quoq; vtiliter infantium enterocelis, cum aqua potui dari præcipiunt.

De Sparganio.

CAP.

XXIII.

Parganion aliqui Xiphidiō, alijs Bolon vocāt. Folia gladiolæ, ſed ardiſora & in terram magis procumbentia. In ſummo caule pilulæ prominent, in quibus ſemen. Contra ſerpentis venena, radix cum vino datur.

De ſylueſtri Iride.

CAP.

XXV.

iris ab aliquibus Iris agria, ab alijs Cacos, a Romanis Gladiolus, aut Iris agreſtis, a Dacis Caprus diciſ. Folia habet Iridis, latiora, & in turbinē mucronata, quorū medio caulis erūpit, craſſus, cubitalis, ex quo ſiliquæ triāgulares depēdēt. In quibus purpureus ſlos, in medio puniceus. Semen in folliculis, ſimile fabis, rotundum, rubrū, acre. Radix longa, geniculata, ruſſa. Cōtra capitiſ vul-

DE MEDICINALI MATERIA

nera, fractaq; efficax est. Aculeos & spicula omnia citra, molestia ex-
trahit, adiecta floris æris tertia parte, & radice cetaurij ac mellis quin-
ta. Tumoribus & collectionibus illita cum aceto medetur. Radix ex
passo bibitur, ad cōuulsa, rupta, coxendicū dolores, strangurias & alui
profluuia. Semē tribus obolis potū, vrinā vehemētius impellit, & cū
aceto lienē absūmit.

De Anchusa. CAP. XXVI.

Nchusam aliqui cantanchusam vocant, alij Libycā, alij Ar-
chibelson, alij Alcibiadion, alij Onophyllō, alij Porphyria-
da, alij Mydusam, alij Calyca. alij Noncam, Aphri Bu-
nesath. Anchusa quæ alio nomine calyx, aut Onoclia appellatur, folia
habet lactuæ acuti folij similia, hirsuta, aspera, nigra, multa, quoquo
versum humis paria, spinis horrida. Radici crassitudo digitalis. Quæ
æstate prouenit, manus inficit sanguineo colore. Læto solo nascitur.
Radix adstrigit. Ad ambusta & vetera vlcerā, ex oleo & cæra efficax
est. Igni sacro cū polenta medetur. Lepri & vitiliginibus illinitur ex
aceto. Partus extrahit, vuluæ indita. Eius decoctū renū vitijs, lieni &
bile suffusus datur, & si febris sit, ex aqua mulsā. Sistūt aluū folia in vino
pota. Radice pigmentarij vtuntur ad spissamenta.

De alia Anchusa. CAP. XXVII.

St & alia quam aliqui Alchibiadion, aut Onochiles appella-
rūt. Hæc a priore distat, q; minora habeat folia, sed simili mo-
do aspera, ramulos exiles, florem purpureum, radices rubras,
oblongas. Quæ messibus sanguineum succum fundūt. In sabulosis na-
scitur. Vis ei folijsq; inest, quæ contra virus cū reliquorū serpentū, tū
maxime viperarū, auxilietur siue cibo, siue potu, siue alligatu. Nam si
quisquam mandens in serpentis os inspuat, cum necabit.

De alia Anchusa. CAP. XXVIII.

St & alia huic haud dissimilis, semine puniceo, minore. Cu-
ius semen māducatū, si in serpētis fauces inspuatur, eā interfi-
ciet. Radix acetabuli mensura cū hyssopo & cardamomo po-
ta, latas vētris tinea excutit.

De Lycopsi. CAP. XXIX.

ycopsis quæ a nonnullis Anchusa vocatur, lōgioribus q; la-
tūca constat folijs, asperioribus, latioribusq;, crassis, ad radi-
cis caput recidētibus. Caule lōgo, recto, scabro, hirsutis adna-
tis, multis, cubitalibus, flore paruo purpureo. Radice rubra & ad-
stringente. Nascitur in campestribus. Cū oleo radix illita vulneribus
medetur, et cum farina hordeacea ignibus sacris. Sudores perūcta mo-
uet, adiecto oleo.

LIBER QVARTVS

91

De Echio.

CAP.

XXX.

Chion aliqui aridam, alij Alcibiadion, Romani alcibiadum nominant. Folia habet prælonga, hirsuta, subalbida, an- chusæ proxima, minora tamen, subrubra, & pingua, spinulis tenuibus horridula. Cauliculos exiles, numerosos, minuta- que utroque latere folia, in versus digesta, nigra, in summo caule minuscula. Flores secundum folia purpureos, in quibus semina capiti viperarum similia insunt. Radix nigricat, digito tenuior. Quæ non percussis modo a serpentibus ex vino prodest, sed eos qui antea biberint feriri non patitur. Folia & semen, idem præstât munus. Lumborum dolores sedat. In vino aut forbitione sumpta lac extrahit.

De Ocimaistro.

CAP.

XXXI.

Cymoides aliqui & hanc Echion vocant, alij Scorpiuron, alij Sparganon, alij Althæam, alij Amaranthida, alij Probat hæam, alij Elaphion, alij Antiminõ, alij Porphyriada, alij Augion, alij Nemesion, alij Pphiletæron, alij Hyænoposolon, alij Thyrsitin, alij Themutin, alij Misopathos, Latini Ocimaistrû. Folia fert ocimi, & ramos dodrâtales, hirsutos, filiquas hyoscyamo similes semine ut gith nigro prægnantes. Vim habet semen in vino potum, qua viperarum cæterarumque serpentium moribus medeatur. Datur ischiadicis cum melle vino myrrha et pipere. Radice niritur tenui et superuacua.

De Erino

CAP.

XXXII.

Rinon aliqui Hydreron, aliqui Ocymoides vocant. Nascitur apud fontes et fluuios, folijs Ocymi, sed minoribus parte superna diuisis, quinis senisve, dodrantalibus surculis flore candido, semine nigro, et acerbo. Folia et caules lacteo succo turgent. Semen drachmis duabus, in quattuor mellis cyathis, oblitum oculorum fluxiones cohibet. Succus cum sulphure et nitro instillatus, aurium dolores sedat.

De Gramine.

CAP.

XXXIII.

Grostin aliqui Egiron, alij Amaxiûn, Aegyptij anuphi vocant, Latini gramen, aliqui Asyphylion, alij Sanguinalem, alij vniolam, Hispani apariam, Daci cotiatam, Aphri iebal. Gramen geniculatis serpit ramulis a quibus crebro radices spargit dulces, articulis præcinctas. Folia dura, & ut arundinis parue lata, in exilitatem fastigiantur. Ea que iumenta & boues pascunt. Trita radix illitu vulnera conglutinat. Decoctum eius in potu, torminibus medetur, & urinæ difficultatibus. Calculosa etiam vesicæ excrementa comminuit.

De Arundinaceo gramine.

CAP.

XXXIII.

St & arundinaceum gramen, priore multo maius, quod iumenta necare traditur, præsertim in babylone. Idque iuxta vias nascitur.

DE MEDICINALI MATERIA

De Gramine Parnasi. CAP. XXXV.

pp. 161
intra
Vod in Parnaso monte gignitur, densius fruticat, folijs hederaceis, flore odorato, cācido, semine paruo, nō inutili. Radicibus quinis aut senis, digitali crassitudine, cādidis, mollibus, & mirum in modum dulcibus. Succus si in vino cū melle pari, & myrrhæ dimidio decoquatur, adijcianturq; piperis & thuris tertiæ portiones, probatissimum erit oculorum medicamentum. Id in ærea pixide reconditur. Decoctum radice, idem quod hærba, præstat. Semen vehementius vrinam impellit. Alium vomitionesq; sistit. Natū in Sicilia gramen, quod incolæ Cinnam appellant, boues inflāmat, si eo virēti sæpe pascantur.

De Siderite. CAP. XXXVI.

fructus rari
Ideritin aliqui Heracleam vocant, Magi genituram aut sanguinem titani, alij Scorpionis vrinā, Pythagoras Parmirō, Andreas Xanthophanea, Osthanes boeophthalmon, Aegyptij sendionor, Romani vertemnium, alij Soleastrum, Aphri vdedonin. Folia habet Marrubij, sed longiora, satis ad frondem quærcus aut saluæ accedētia, minora tamen, & hirsuta. Caulēs ædit quadratos, palmum sæpe excedentes, non iniucundi gustus, aliquantūq; substringentis. In quibus per interstitia, orbiculatæ vertebrae vt in Marrubio spectantur. Et semen in eis nigrum. Nascitur in petrosis. Illita folia, sua pte vi, vulnera sine inflammationis periculo iungunt.

De alia Siderite. CAP. XXXVII.

a Lia Sideritis binū cubitorū, ramulis exilibus, folio Filicis, in ambitu vtraq; parte diuiso, pediculo lōgo, prodeūtib; e summo alarum sinu furculis, longis, tenuibus, capitulo in cacumine orbiculato, aspero, in quo semen continetur, q̄ Betæ rotundius alio quanto, ac durius. Huius vis foliorumq; ad vulnera præcipua.

De alia Siderite. CAP. XXXVIII.

Scandax
a Ideritin aliam esse tradunt, quam Crateuas Heracleam vocat, in macerijs & vineis nascentem, folijs coriani, a radice numerosis, dodrantalibus cauliculis, læuibus, teneris, in rubore candicantibus. Flore purpureo, paruo, gustanti amaro & viscido. Huius ea vis est, vt quamuis recenti vulnere imposita sanguinem supprimat.

multa folia
De Achillea. CAP. XXXIX.

a Chilleam aliqui Myriomorphon nomināt, alij Chiliophylon, alij Stratioticon, alij Heracleon, Latini supercalium verneris, alij Acron syluaticum, alij Militarem, alij Millefoliū

Aphri asterchillos, et aliqui Achilleam fideritin, Dodrantaes aut maiores, gerit scapos, fusorum effigie, quasi minutulis folijs circumdatos, crebris in latere, foliorum sectionibus, coriãdri similitudine, sub fuluo colore, odore multo, non insuauis, medicato, & viscido. Umbella in cacumine rotunda, floribus cãdidis, purpureis, & aurum æmulantibus. Prouenit lato solo. Trita coma sanguinolenta glutinat, & ab inflammationum periculo tuetur. Erumpentem sanguinem inhibet, & cruenta vuluæ profluuia in vellere. Decocto quoq; insident fœminæ fluctione vuluæ laborantes. Ad dysenteriam bibitur.

De Rubo.

CAP.

XL.

Atos a Græcis, ab alijs Cynosbatos, ab alijs, Selinorition, ab alijs Syntrophos, a Magis titani sanguis, ab alijs ibidis sanguis, a Romanis Rubus, ab alijs Sentes, a quibusdam morabaticana, a Dacis manthia, Aegyptijs hæmoos, alijs Ametros appellatur. Rubus notitiæ vulgaris. Vim habet ficcandi & adstringendi. Capillum tingit. Ramorum decoctum, potu aluum fistit, & fœminarū profluuia. Præsteris mor sui accommodatissimum. Gingiuas firmat. Oris vinijs folia commanducata medentur. Cohibent vlcera quæ ferunt. Vlceribus in capite manantibus, oculisq; procidentibus, remedio sunt. Condylomatibus & hæmorrhoidibus folia illinuntur. Cardiacis, & stomachi doloribus, trita conuenienter imponuntur. Caules cum folijs tunduntur, exprimiturq; succus, mox sole cogitur, singulari remedio, contra omnia, quæ modo dicta sunt. Mori in rubo nascentis, q̃optime maturi succus, ad oris medicamenta conuenit. Sistitur aluus præmaturi cibo, nec non flore in vino poto.

De Idæo Rubo.

CAP.

XLI.

Dæus Rubus appellatus est, quoniam passim in Ida proueniat. Est autem lōge tenerior priore, ac minoribus spinis horrens. Quanq̃ & sine spinis inueniatur. Eadem præstat quæ supradictus. Cæterum flos cum melle oculorum collectionibus commo diffuse illinitur. Ignem sacrum extinguit. Stomachicisq; ex aqua bibendus datur.

De Helxine idest murali hærbæ.

CAP.

XLII.

Elxinen aliqui Elitim vocāt, alij Canocerfæā, alij Amelxinē, alij Eufinen, nonnulli, Amorginen, alij Sucorachos, alij Pychuacos, alij psychouacos, alij Melæpelon, alij Cittæpelon, alij Cissamethō, alij Anatetamenō, Romani volutū lapparō, Aegyptij apap, alij Partheniō, alij Sideritin, alij Heracleā, nonnulli agriā, quidā Clibodiō, alij Polyonymō. Nascitur in sæpibus, vinetis, maceijs, & segetibus. Folia ei mercurialis adsunt, hisfuta, cauliculi leniter

DE MEDICINALI MATERIA

rubentes, & circa eos veluti semina aspera, adhærentia vestibus. Folia refrigerandi spissandiq; naturâ habent. Quæ ex causâ sanâr illitu ignes sacros, adusta, condylomata, incipiêtes panos, tumores, inflationesq;. Succus eius cû cerussa, ignibus sacris, & vlceribus quæ serpunt, aptissime illinitur. Imponiturq; podagris, cum hircino seu aut cærato cyprino. Veterem tussim adiuuat, cyatho hausto. Tonsillis inflammatione turgentibus, vtilissime & gargarizatur, & illinitur. Succus in aurium dolore infusus iuuamen præstat.

De Elatine.

CAP. XLIII.

e Latine folia habet Helxinæ, minora, rotundiora, pilosa, semipedalibus ramulis, quinis senisve, a radice foliosis, gustu adstringentibus. Nascitur in segetibus & cultis. Oculorum fluxionibus et inflammationibus auxiliatur, folijs cum polêta tritis et impositis. Eadem cocta sorbitionis vsu dysenteriam sistit.

De Eupatorio.

CAP. XLIIII.

e Vpatorium siue vt alijs placet hepatorium, aut hepatitis, fruticosa hærba est, vnum efferens caulem, lignosum, nigricantem, rectum, tenuem, hirsutum, cubitalem, interdum ampliorê. Folijs per interualla quinquifolij aut Cånabis similibus, quinquem partito aut amplius diuisis, nigricantibus, per ambitum serratis. Semen medio caule erumpit, pilosum, deorsum spectans, quod siccâtum velsibus inhæret. Contrita huius folia, & cum suillo adipe imposita, vlceribus quæ ægre cicatricem trahunt, medentur. Hærba aut semen in vino potum, dysenteria, iocineris vitijs, & serpentium ictibus, liberat. Nec desunt qui aberrantes, Artemisiam hanc appellarint, cum tamen longe alia sit, vti exposuimus.

De Quinquefolio.

CAP. XLV.

p Entaphyllon aliqui Pentapetes, alij Pentatomon, alij Pentadactylon, alij Pseudoselinum, alij Callipetalon, alij Xyloloton, nonnulli Xyllopetalon, alij Asphalton, alij Pentacænon, alij Thymianitin, Aegyptij Orphitebeocen, alij Enotrô, Magi Ibidis vnguem, alij Ibidis penam, alij Hermodactylon, Romani quinquifolium, Galli pempedulam, Daci propedulam appellant. Ramulos fert surculaceos, tenues, palmi magnitudine, in quibus semē, folia mentæ, quina singulis pediculis, raro plura, in ambitu serrata, flores ex luteo pallescetem, interdum auri æmulum. Nascitur in riguis, & aquarijs ductibus. Subrubram habet radicem, oblongam, veratro nigro crassiorê. Plurimis pollet remedijs. Ius radices decoctæ ad tertias, si in ore contineatur, dentium dolores sedat. Putrida oris vlcera, collutione sistit. Arteriæ scabricias, gargarizatu læuigat. Cōtra alui

profluuia, & dysenterias auxiliatur. Item articulorum coxendicumq; cruciatibus potum. Cocta in aceto & illita, serpentia vlcera cohibet. Strumas, tumores, duricias, abfessus, & distentiones discutit. Ignis sacros, reduuias, condylomata, psorasq; sanat. Teneræ radice succus, cōtra iocineris pulmonumq; vitia prodest. Item aduersum venena. Cū hydromelite autem vel diluto vino & piperis exiguo, bibuntur folia, contra febrium circuitus. In quartana quidem quaternum ramulorū, in tertiana vero ternum, in quotidiana vnus. Tricena quoq; folia, tricenis pota diebus, comitialibus profunt. Foliorum succus, tribus cyathis aliquot dies potus, celerrime regio morbo medetur. Illita cū mele & sale, tam vulneribus q̄ fistulis remedio sunt. Enterocelicis auxiliū præstant. Quinquefolium sanguinis profluuia & potu & illitu sistit. Ad expiationes, castimonias, & sanguinis eruptiones inciditur.

De Phœnice.

CAP.

XLVI.

Linna fœnicus

Hænicen aliqui rhon, alij Anchinopa, alij Phœnicoptea
 p ron, alij Rhonstachyos, alij Osthalen, Aegyptij Athnō nominant. Folia habet hordei, sed breuiora, & angustiora, spicā lolio similem, ramos digitorum senum, radici aduolutos, septenas octonasve spicas. In aruis testisq; recenter illitis nascitur, harum viriū compos, vt in vino austro pota, alui profluuiū & emanantem vulua sanguinem sistat. Vrinæ impetus infrenet. Sunt qui ad alligaram in puniceo vellere & suspensam, sanguinem suppressere prodant.

De Idæa radice.

CAP.

XLVII.

Dæa radici folia sunt ea quæ Rusco. Adhærent his veluti
 i exigui pampini, in quibus fios, Radix spissandi cohibendiq; naturam habet, his conueniēs, quibus ad strictione opus est. Pota citam aluum mensetq; & omnem abundantiam sanguinis sistit.

De Rhodia radice.

CAP.

XLVIII.

Ignitur rhodia radix in Macedonia, costo similis, leuior, in
 g æquabilis. Quæ cōtrita rosas redolet. Vtilissima capitis doloribus, si madefacta frōti & tēporibus cū nardo imponatur.

De Equiseto.

CAP.

XLIX.

Cauda equina

Quisetum Græci hippurin, alij Trimachion, alij Anabasin,
 c alij Cheredranon, alij Phædran, alij Iriandendron, alij gis, alij Scœniostrophon vocant. Aegyptij pherphram. Magi saturni cibum, Romani equinalem, alij equi salicem, aut Anabasion, alij Ephydron. In riguis & scrobibus nascitur. Cauliculi prodeūt inanes, geniculati, in se farcti, rubescētes, scabri, & iuncea circa eos folia, crebra, exilia. In sublime equisetum attollitur, vicinos arborum caudices

DE MEDICINALI MATERIA

scandens, obuolutumq; dependet, comis multis, nigris, vt equorum cauda. Radix lignosa, dura. Vis eius spissare. Quare sanguinē naribus erumpentē succus ipse fistit. Prodest dysentericis in vino potus. Vriam cit. Sanguinolēta vulnera glutinantur, tritis folijs & illitis. Tussim orthopnoeam ruptaq; adiuuat. Folijs in aqua potis, dissectiones vesicæ & intestinorum, enterocœlæq; in vnum coalescere, cogiq; feruntur.

De altero Equisetō. CAP. L.

Lterum Equisetum quod aliqui Equition, alij Chedran, alij
 a Gynon appellant. Caulis est rectus, cubitalis, aut maior, inanis. Comis per intervalla breuioribus, cādidioribus, & mollioribus. Id cum aceto tritum vulneribus remedio est. Eademq; fungitur facultate.

De Cocco seu infectorio. CAP. LI

Occū quo infectores vtuntur, frutex est furculosus, parvus,
 c cui grana ceu lentes adhærent, quæ electa congeruntur. Optimū gignitur in Galatia & Armenia. Deinde Asia & Sicilia. Vltimus ex omnibus Hispanicus. Vis huic spissandi. Vulneribus neruisq; præcis, cōuenienter ex aceto illinitur. Nascitur quoq; in Sicilia quarcubus, cochlearum exilium similitudine, quod illius regionis mulieres ore legunt & Coccum vocitant.

De Tragio. CAP. LII.

Ragium nascitur in Creta tantum insula, lentisco simile, & semine, folio & ramis. Singulis tamen minoribus. Succus ei laeteus, gummi non dissimilis. Semen folia lachrymaq; illitu spicula e corpore eijciunt. Omnia quoq; corpori impacta, euocant. Porta stranguriæ medentur. Calculos vesicæ frangunt. Menses trahunt. Modus in sūptione est, drachma vna. Fama est syluestres capras sagittis confossas, eius hærbae pabulo, spiculā excutere.

De alio Tragio. CAP. LIII.

St & aliud tragium quod tragoceros aliqui vocant, alij Scorpion, alij Garganon, Romani cornulacā, Daci Salīā, Aegyptij sober, Aphri Achæosim. Folia scolopendrij habet, & radicem syluestris raphani, tenuem, candidam. Quam crudam vel coctā esse dysentericis prodest. Folia autumno, hirci virus olent. Exinde sibi tragij nomen adoptauit. Prouenit in montibus, & præcipitijs.

De Trago. CAP. LIIII.

Stetiam hærba Tragos, quam aliqui scorpion aut Trago non vocant, maxime in maritimis nascens, palmum alta, aut amplior, fruticosa, humilis, oblonga, sine folijs, pusillis circa

ramos acinis ruffis, multis, magnitudine tritici, acuto cacumine, gustu multum adstringente. Racemorum grana decem ex vino pota, coeliaciis, et fœminis fluctione vuluæ laborantibus, auxiliatur. Tūduntur a plerisq; et in pastillos digerūtur, quibus vtuntur.

De Iunco CAP. LV.

Xyschinos aliquibus Schinos læuis, alijs Oxypternos, alijs
 o Solis superciliū, Romanis Iūcus marinus, aut manualis dicitur. Duo eius genera. Vnum læuis nominati, alterū acuti, qui in mucronē fastigiatur. Cuius etiam duo assignantur genera. Vnū sterile. Reliquum fert semen nigrum, rotundum, & crassiore constat calamo, carnosioreq;. Tertius est iūcus qui vocatur Oloschinos, prioribus carnosior, asperiorq;, qui similem fructum in cacumine parit. Semē vtriusq; tostum, ex diluto potum, sistit aluum, & rubra fœminarum profluvia. Vrinam cit. Capitisc; dolores facit. Quæ proxima sunt radicis folia, tenera conuenienter illinuntur, aduersus phalangiorum morfus. Aethiopici iunci semine, somnus allicitur. Sed modus in potione seruandus est, ne sopor fiat.

De Lichenæ. CAP. LVI.

Ichen qui faxis est familiaris, aliquibus Bryon appellatur.
 I Asperginosis petris adhæret, vt muscus. Qui illitus sanguinis profluvia sistit. Inflammationes arceat. Imperigini medetur. Iuuat regio morbo correptos, cum melle illitus, Oris & linguæ defluuiones inhibet.

De Parrhonychia. CAP. LVII.

Arrhonychia alij Adocetos, alijs Neuras, alijs Phrynion,
 a Romanis bouinalis, exiguus frutex in petris nascens, peplo similis, minor longitudine, maioribus folijs. Illita Paronychijs atq; duricijs remedio est.

De Chrysocomæ. CAP. LVIII.

Mryfocome, alijs Chryfitis, alijs Chrysanthemum, nonnullis amaranton, alijs Diospogon, Aphris dubath, vel buchumath, Romanis iouis barba appellatur. Palmi altitudine fruticat. Coma specie corymborū, hyssopo simili. Radice hirsuta veratri nigri modo, tenui, cyperum æquante, gustu nō iniucundo, ex austero dulci. In petrosis opacisq; nascitur. Radix exalfacit & adstringit. His conueniens, quos iecur aut pulmonis inflammatio male habet. Contra purgationes vuluæ, decocta cum hydromelite assumitur.

De Chrysogono. CAP. LIX.

Hrysogonon, aliqui Chrysospermon vocant, alij Daspin, alij Origanū, alij Arcophthalmon, Romani Arilariā. Dese

DE MEDICINALI MATERIA

fruticat, quærnis folijs, flore coronarij Verbalci. Radix vt rapum extuberat, intus ruberrima, foris nigra, quæ trita cum aceto, atq; impofita muris aranei morfibz auxiliatur.

De Elichryfo. CAP. LX.

Lichryfon quidam Chryfanthemon, nonnulli & id amaranthon vocant, quo Lymphas coronant. Ramulum habet candidum, virentem, rectum, firmum. Folia intercedentibus spacijs angusta, Abrotono similia, coma aureæ lucis, in orbem, umbellula rotunda, veluti ficcis corymbis dependentibus, radice tenui. Nascitur in alperis & torrentium alueis. Contra serpentium ictus, coxendicum dolores, vrinæ stillicidia, rupta q; coma e vino pota opitulatur. Ciet menses. Sanguinem concretum ventris ac vesicæ absumit, pota cum mulso folia. Ieiunis, trium obolorum pondere, sistit destillationes, data in vino albo diluto. Vestibus inseritur, vt eas ab erodētium iniurijs tueatur.

De Chryfanthemō. CAP. LXI.

Chryfanthemon aut chalcas, aliqui chalchitin vocāt, alij chalcanthon, alij chalcanthemon, alij Buphthalmon, Romani acanthan, Hetrusci garuleū, Aphri churfeten. Hærbæ est tenera, fruticosa, laues proferens caules, & multifida folia, flores supra modum splendentes, luteos, orbem oculi imitantes, vnde nomē traxit, Propter oppida nascitur. Cuius caules oleris vice manduntur. Flores cum cærato triti, steatomata discutere produntur. Regio morbo correptis, colorem breui reddit, si sequente longo balnei vsu, post exitum ebibatur.

De Agerato. CAP. LXII.

Geraton fruticosa hærbæ est, palmarum longitudine assurgens, simplex, humilis, Origano non dissimilis. Umbellam gerit, in qua flos bullis aureis emicat, elichryso minor. Nomen ei inditum est, quoniam diutissime flos, in sua coloris specie, cōseruetur. Vis decocti feruens. Huius vstæ nidor vrinam cit, et vuluæ duricias emollit.

De Verbenacæ. CAP. LXIII.

Erbenacam rectā, Græci peristereona vocāt, alij Trigonion, alij Bunion, alij Hierobotanen, alij Philrodoten, Aegyptij pempsempe, Magi Iunonis lachrymā, nonnulli mustellæ sanguinem, alij Sanguinem Mercurij, Romani Cristam gallinaceam, alij Pheriam, alij trixalidem, alij exuperam, aliqui hærbam sanguinalem. Nascitur in aquosis. Nomen ex eo duxisse videtur, quod columbæ circa hanc, perq; libenter versari soleant. Palmi altitudine et interdum am-

LIBER QVARTVS.

95

plius adolefcit. Folia e caule prodeunt incifa, & fubalbida. Ea fingulari ramo, radiceq; fola, conftare fæpius inuenitur. Folia cum fuilla adipe recenti, aut rofaceo impofita, vuluarum dolores finire putantur. Ignē facrum illita ex aceto reprimunt. Putrida vlcera cohibent. Vulnera glutinant. Veteraq; ex melle, ad cicatricem perducunt.

De Supina verbenaca. CAP. LXIII.

Vpinam verbenacam aliqui facram hærbam appellant, alij
f Erigeniō, alij Chamælycon, alij Sideritin, quidam Curitin,
alij Perſephonion, alij Iouis colū, alij Dichromon, alij Cal-
lefin, alij Hippariſon, nonnulli demetriada, Aegyptij pēphtheuphthā,
Pythagoras Eryſiſceptron, Romani cincinallem. Ramulos emittit cu-
bitales, aut maiuſculos, anguloſos, in quibus ex interuallis folia quæ-
cus, ſed minora anguſtioraq; eiſdē diuiſuris in ambitu, colore aliqua-
tenus cæſio. Radix longa, tenuis. Flores purpurei, graciles. Folia cum
radice in vino pota, illitave, aduerſus ſerpentes pollent. Eadem dra-
chmæ pondere cum thuris obolis tribus, in vini veteris hemina, qua
dragenis diebus ieiuo ore, contra regium morbum bibuntur. Vete-
res tumores & inflammationes mitigant. Sordida vlcera purgant. To-
ta in vino decocta tonſillarum cruſtas abrumpit. Oris nomas garga-
riſatu cohibet. Aiūt ſi aqua ſpargatur triclinium, qua maduerit, latio-
res conuiſtus fieri. Datur potandum in tertianis febribus, tertium a
terra geniculum, cum folijs circundantibus, quartanis quartum. Sacra
vocant hærbam, quoniam multum ad amuleta, expiationeſq; commen-
detur.

De Aſtragalo. CAP. LXV.

2 Stragalū aliqui Chamæſycen, alij Garalen, alij Onyca vo-
cant, Romani Pinum triuiam, aut ficum terræ, alij glan-
dulam, alij Thium, alij Nonariam. Aſtragalus paruus in ter-
ra frutex, folijs & ramis lupino ſimilis, flore purpureo, paruo, radice ro-
tunda, raphani modo grandi, quæ adnatas appendices, firmas habet,
nigras, præduras, veluti cornua inter ſe implicatas, guſtu adſtringen-
tes. Naſcitur in vêtofiſ, opaciſ, & inuallibiſ. Eo Mēphis Archadiæ
ſcatet. Aluum ſiſtit radix in vino pota. Urinam mouet. Vetus ſiſ vlce-
ribus, ſicca efficaciter inſpargitur. Sanguinē ſupprimat. Aegre propter
duriciam tunditur.

De Hyacyntho. CAP. LXVI.

h yacynthum aliqui Heloniam, alij porphyranthes, Roma-
ni vaccinum, alij vlcinum vocant. Folia habet bulbi, dodran-
talem caulem, minimo digito tenuiorem, hærbaceum, co-
mam procumbentem, ſorum purpureorum plenam, incuruam, radice

DE MEDICINALI MATERIA

bulbaceam. Quæ vt creditur, pueris cum vino albo illita, pubertatē coercet, & non panitur erumpere. Sistit aluum. Pota vrinam impellit. Phalangiorum moribus auxiliatur. Semen adstringentius est, theriacis expetitum. Regium morbum emendat, cum vino potum.

De Papauere erratico. CAP. LXVII.

Apauer erraticum quod Rhocæ vocant, nonnulli Oxytonon, Romani papaueralem, Aegyptij nanti, vēte quidem in aruis cū hordeo nascitur, flore protinus deciduo, vnde et nonnā apud Græcos accēpit. Folia erucæ aut origano aut cichorio aut thymo similia spectantur, sed longiora, diuisa, scabra. Iuncus ei caulis, rectus, cubitalis, asper, flos sylvestris fremij, puniceus, interdum albus, oblongum caput, sed q̄ fremij minus, semen rufum, radix longa, subalbida, minoris digiti crassitudine, gustu amara. Huius capita quinq; aut sex, in vini cyathis tribus ad dimidias decocta, potui dabis, quibus somnus accersuolus est. Semina acetabuli mensura ex aqua mulla pota, aluū leniter emolliūt. Ad idem præstandū mellitis rebus, & dulciarijs, ammiscetur. Folia cum calycibus illita, inflammationes sanant. Eorumdem fotu & perfusione, somnus allicitur.

De Papauere satiuo. CAP. LXVIII.

Apauer satiuū aliqui chamaelycen, alij oxytonon appellant, Romani papauer, Aegyptij nanti. E satiuo genere, quoddam hortensium est, cuius semen in panem densatur, qui sanis in vsu sit. Eo etiam ex melle prolesama vtuntur. Thylacitin vocant. Capitulum habet longum, & semen candidum. Sylvestre vero, caput infidens demissumq; et nigrum semē. Quod pithitis nominatur. Nōnullis tamen & ipsum rhocas dicitur, quoniam eius scapo lacteus succus emanat. Tertium magis sylvestre, & ad medicinas valētius, multo his longius, productiore capitulo. Omnium in commune natura refrigeratrix. Quare si capita ipsa & folia decoquantur in aqua, somnū fotu conciliabunt. Bibitur decoctum cōtra vigilias. Calyces cum polenta triti, & cataplasmatibus ammissi, ignibus sacris, & inflammationibus prosunt. Tunduntur quoq; virides, & digeruntur in pastillos, qui siccati ad vsum reconduntur. Capita quoq; in aqua coquuntur ad dimidias, iterumq; adiecto melle, dum humor coeat in eclegmatis lentorē. Id medicamentum in tussi, arteriæ fluctionibus, & celiacorum affectu, doloris leuamētum præbet. Efficacius tamen redditur, addito hypocyttidis succo, & acacia. Papaueris nigri semen tritum cū vino bibitur, contra citam aluum, & foeminarum profluuiā. In peruigilijs frōtē teporibusq; illinitur, ex aqua. Opīū eius, magis refrigerat, inspissat, siccaturq;. Sumptum erui magnitudine, dolorem finit, cōcoquit, & somnū

num allicit. Tussi atq; cœliacorum valetudini auxiliatur. Verum si copiosius hauriatur, nocet, cum lethargicos efficiens interimat. Ad dolores capitis, cum rosaceo perfusum efficax est. Aurium dolori, cū amygdalino, myrrha & croco instillatur. Inflammationibus oculorum cū torrefacto oui luteo proficit. Igni sacro & vulneribus cum aceto, podagris cū lacte mulieris & croco. Somnum accersit, subditū sedi pro balano: Optimum habetur graue, & densum, gustu amarum, odoratu soporiferum, quod facile aqua diluitur, læue, candidum, neq; asperum, neq; grumosum, quod inter colandū nō vt cæra coeat, et in sole diffundatur. Dein admotum lucernis non atra luceat flamma, extinctum deniq; odoris vim cōseruet. Sed opion glaucio, gummi, aut sylvestris lactuca succo, adulterant. Verum glaucio fucatum in dilutione croci colorem reddit, lactuceo succo fictū, exiliter spirat, & asperius spectatur. Gummi vitiatum, splendescit, & infirmum est. Nec desunt qui eo dementiae deuerint, vt adipem ei admiscerent. Fictili nouo torretur ad oculorum medicamenta, dum mollius, atq; rufius appareat. Diagoras, vt Erasistratus author est, vsum eius damnauit, oculorum lippitudinibus & aurium vitij infundi vetans, quoniam visus aciem heberet, & soporem gigneret. Addidit Andreas, illitos eo protinus excæcari, si nō adulteraretur. Mnesidemus vsum dumtaxat olfactandi probauit, quoniam ad conciliandum somnum conueniret, alioqui nobis vt noxiō interdicit. Quæ commentitia esse, experimento deprehenduntur. Siquidem effectus, virium huiusce medicamenti, fidem faciunt. Quare non alienum fuerit scriptis mandare, quonam modo is excipiat succus. Aliqui capita ipsa & folia tundunt, & prælo exprimunt, terentesq; in mortario, digerunt in pastillos. Id meconium vocatur multum opio ignauius. Porro opij faciundi ratio hæc est. Cum ros in eo exaruerit, cultro circūdante asterisco, ne penitus adigatur, ex obliquo in rectum summam cutem incidere oportet, lachrymam excurrentem, digito in concham abstergere. Nec multo post redire, vt cōcreta inueniatur. Etenim quæ tum, aut postero die etiā offenditur, in veterē pila teri debet, & in pastillos cogi. Cum tamē inciditur retrocedendum est, ne vestibus succus deradatur.

De corniculato Papauere. CAP. LXIX.

Apauer ceratidem idest Corniculatum, aliqui paralion, alij sylvestre Papauer, alij Thalassion, Romani fabulum marianum, Aphri Sifimacam vocant. Folia habet cādida, hirsuta, verbasco similia, in ambitu sylvestrium papauerum more serrata, caule non dissimili, flore luteo, calyculo sœnogræci, in corniculorum modū inflexo. Vnde nomen mutuatur. Semine papaueris, pusillo, nigroq;

DE MEDICINALI MATERIA

radice per summa cespitū, nigra, crassa. Nascitur in maritimis & asperis. Radici ea vis inest, vt in aqua decocta ad dimidias, coxendicum & iocineris affectus, potu sanet. Prodest his qui crassa quædam, aspera aut araneosa cum lotio reddunt. Aluum leniter purgat semen, acetabulo in aqua mulsa poto. Crustas emarginant, illita ex oleo folia, floresq;. Argema ac nubeculas iumentorum perunctas, abstergunt. Sunt qui glaucium, hoc papaueris genere fætari existimarunt, falsi quadam foliorum cognatione. Qui hoc papauer hauserit, non alia accidet, q̃ qui opium ebiberit. Cui eisdem succurritur auxilijs. Semen æstate dum siccum est, colligitur. Decoctum radice bibitur cum vino, sanatq; dysenteriam.

De spumeo Papauere. CAP. LXX.

Iterum papaueris genus, aphrodes idest spumeum vocatur, ab alijs Heracleum, caule dodrātali, folijs admodū paruis, radiculæ similibus, fructu inter ea candido. Nam hærbula alba est & spumea tota. Radice in summo cespite. Legitur æstate semen, cū integre adoleuit, deciditq; exiccatum. Datū acetabuli mēsurā in aqua mulsa, vomitione expurgat. Priuatim huiusmodi purgatio, comitialibus prodest.

De Hypecoo CAP. LXXI.

ypæcon, aliqui Hypopheon vocant. Nascitur in segetibus aruifq;, folijs rutæ, exilibus ramis. Natura eadem quæ papaueris succo.

De Apollinari & hyoscyamo. CAP. LXXII.

hyoscyamon, alij Pythonion, aliqui Dioscyamon vocāt, alij Adamāta, alij Adamenon, alij Hypnoticon, alij Emmanes, alij Aromon, nonnulli Dithiambrion, Magi, Pythagoras et Ostones, zeleo, Zoroastres Tiphomon, alij Raponticam, Romani apollinarem, Aegyptij Saphtho, Hetrusci fabulū, Galli byllinuntia, Daci dieliam. Frutex est caules emittens crassos, folia lata, oblonga, diuisa, nigra, hirsuta. Flores e latere caulis, ordine prodeunt, tanq̃ puni corum cytini, scutulis septi seminum plenis, vt papaueris. Tres eius differentia. Vna semine nigro, floribus pene purpureis, simillaceis folijs, cytinis præduris, & spinosis. Alterius semen subflauum, vt Irionis. Flores lutei, folia & filiquæ simpliciores. Ambo infaniam gignūt & soporem. Ideo in communi vsu damnātur. Tertium genus vt quod mitissimum esset, medici recepere, pingue, lanuginosum, molle, candidi floris seminisq;, in maritimis ruderibusq; nascens. In cuius deficiētis vicē, ruffum vsurpari oportet. Niger vt deterimus, improbat. Recenti semine, caulibus folijsq; tuis, succus in sole exprimitur, & exic-

cato humore, vsus ad annum vsq; prorogatur. Nam facile corruptio-
nem sentit. Extrahitur etiā separatim ex sicco semine, in aqua calida tu-
so, & obtrito. Succo autem liquamentum præstantius, & magis dolo-
res finit. Contusa hærba, addita trimestri farina, digeritur in pastillos,
& reconditur. Liquamentum primum, & quod a sicco semine exem-
ptum est, collyrijs quæ doloris sensum auferunt, commodissime inse-
ri solent. Cõtra acutas calidasq; fluctiones, dolores aurium, atq; vul-
uæ mala profunt. Cum farina autem aut polëta, oculorum, pedum, cæ-
terarumq; partium, inflammationes placant. Semen eadē præbet. Tuso
si, destillationibus, oculorum fluctioni, & doloribus, efficax. Contra
mensum abundantiam, & erumpentem aliunde sanguinem, oboli
põdere cum papaueris semine & aqua mulsâ, bibitur. Podagris subue-
nit, testibus inflatis, mammisq; tumentibus a partu, tritum ex vino il-
linitur. Alijs quoq; cataplasmatibus, quæ doloris leuamentum præstant,
ammisceri solet. Folia omnibus medicamentis dolorem sedantibus,
per sese, & ex polenta, vtilissime imponuntur. Recentia, ad mitigan-
dos omne genus dolores, oblinuntur. Cum vino ter quaterve pota, sa-
nant algidas febres, quas hepialos vocant. Cõcta olerũ modo folia, si
acetabuli mensura manduntur, mediocrẽ insaniam gignunt. Idẽ effi-
cere tradunt, si colo vlcus sentiente infundantur. Radice in aceto deco-
cta, dentes in dolore colluuntur.

De Psyllio.

CAP. LXXIII.

psyllion aliqui cataphysin, alij Cynocephalion, alij Chrysta-
lion, alij Cynomyam, alij Psyllerin, alij Sicelioticon, Siculi
comidijn, Romani hærbam pulicarem aut silbacium. Aphri
Vargugum appellant. Folijs coronopo non dissimilibus, hirsutis, lon-
gioribus, sarmentosa in totum hærbula, ramis dodrantalibus. Coma
a medio caule exoritur, duobus tribusve conuolutis in cacumine capi-
tulis, semine duro, nigro, pulicum simili. Vnde & nomen. In aruis &
incultis nascitur. Vis ei ad refrigerandum, inspissandum, & mollien-
dum conueniens. Articulorum morbis, parotidibus, tuberculis, tu-
moribus, vulsis, illitum auxiliatur. Imponitur in dolore capitis, cum
rosaceo aqua aut aceto. Enterocelis infantium, & prominenti vmbili-
co, illitum ex aceto, medetur. Teritur acetabuli mensura, & in aquæ
sextario madefactum, vbi concreuit aqua, illinitur. Siquidem vehemẽ-
ter refrigerat, & in feruentem aquam deiectum, calorem reprimat. Con-
tra ignes sacros efficax est. Fama est, si virens domum importetur, non
finere in ea pulices gigni. Cum adipe tusum, sordida vlcera, & quæ ca-
coethe vocatur, expurgat. Succo vermiculosis auribus, aut fluctione
laborantibus, ex melle prodest.

DE MEDICINALI MATERIA

De Hortensi Solano. CAP. LXXVII.

Solanum
h Ortenfium seu vrbānū Strychnon Romani Solanum vocant, alij Cacabalum, Aegyptij allelo, Galli scubulum, Aphri astrifmunim. Frutex cibus idoneus, exilis, pusillus, multis concavus alis, folio nigro, maiore q̄ ocimi, & latiore, fructu rotundo, viridi, qui post maturitatem nigricat, aut fulvescit. Hærbā innocens gustus. Natura ei refrigerandi. Quare folia vlcerebus quæ serpunt, & ignibus sacris, conuenienter cum polline potentæ illinuntur. Aegilopia, capitisq̄ dolores, trita & imposita sanant. Aestuanti stomacho auxiliantur. Parotidas, cum sale detrita illitu discutiunt. Valet succus eius aduersus ignem sacrum, atq̄ vlcera quæ serpunt, cum cerussa, rosaceo & argenti spuma, ad ægilopas cū pane, infantiū adustioni quam syriam vocāt, cū rosaceo perfusus proficit. In colyrijs, aquæ vel oui vicem exhibet, contra acutas fluxiones, suffusionesq̄. Aurium dolori instillatus prodest. Mensium abundantiam sistit, in velere subditus. Succus fuluo gallinarum in domibus oberrantium fimo subactus, & linteo appositus, ægilopijs præsentaneo est remedio.

De Veficaria. CAP. LXXV.

... veficaria ...
e St & aliud solanum, quod peculiari nomine Halicacabon, id est veficariā, aut Phylalida vocāt, folijs antedicto latioribus. Cuius caules, posteaq̄ adoleuerunt, humi prosternuntur, folliculis orbiculatis, fuluo intus acino, veficulis simili, rotundo, læui. Quo coronarij vtuntur, & corollas faciunt. Vim vsumq̄ hortensij solani habet. Verum cibus nequaquā expetitur. Regium morbū purgat, semine potō. Et vrinam pellit. Ex vtraq̄ hærbā succus extrahitur, qui ficcatus in vmbra reconditur, ad eadem valens.

De Solano somnifero. CAP. LXXVI.

f Olanum somniferum e Græcis aliqui Dircion appellant, alij Strychnon, alij Manicon, alij Dorycnion, alij Calliada, Romani Apollinarē minorē, alij Vlticanā hærbā, aut opsinē, Daci Cycolidē, Pæni Cacabū. Fruticat multis ramis, densis, lignosis, fractu contumacibus, pinguiū foliorū coronæq̄ mali similiū plenis, flore grādi, rubro, fructu in folliculis crocato, radice lōga, sub rubro cortice vestita. Nascitur in saxis non procul a mari. Radicis cor-

tex, in vino drachmæ pōdere potus, somnificā vim habet, opio mitio
rē. Semen vehemēter vrinā cit. Corymbi duodeci, hydropicis datur.
Si quid numero adijciatur, alienationem mentis faciunt. Remedio est
aqua copiosa mulla, potui data. Succus pastillis inseritur, & medica-
mentis quæ doloris leuamentum præbent. Decoctus in vino, si in ore
contineatur, dentium doloribus auxiliatur. Radicis succus, cum mel-
le illitus, oculorum hebetudines tollit.

De Manico solano. CAP. LXXVII.

Trychnon siue solanū Manicon, aliqui Persion, alij Thry-
on appellauere, alij Andron, alij Pentadryon, alij Enoron,
quidā Orthogyon. Huic folium crucæ simile, maius aliquā-
to, satis ad spinam quam pæderota vocant, accedens. Cauies a radice
eximios emittit, decem aut duodecim vlnarum altitudine adolescen-
tes, caput in cacumine oliua maius, & latius, & vt platani pillula, hir-
sutius, florem nigrum. Postq̃ eo exuitur, racemus exit rotūdis, niger,
denis aut duodenis acinis constans, similibus hederæ corymbis, vt
vua mollibus. Radice firmatur candida, crassa, caua, cubitali. Gigni-
tur in montibus vento perflatis, maritimis foueis, & vagis. Radix
drachmæ vnus pondere pota ex vino, facit species vanas, imaginesq̃
non iniucundas, obuersari. Sed duplicatus hic modus, ad treis vsq̃
dies mētis alienationē affert. Triplicatus interimitt. Remedio est aqua
mulla copiosius pota, & vomitione reiecta.

De Dorycnio. CAP. LXXVIII.

Orycnion Crateuas Halycacabon, aut caleā vocat. Frutex
oleæ nuper prodeunti, similis. Nascitur in petris non procul
a mari, ramis cubito minoribus, folijs oleæ similibus colo-
re, minusculis, firmioribus, præter modum scabris, flore candido, sili-
quis in cacumine ceu ciceris, densis, rotūdis, quinis intus aut senis se-
minibus, exigui erui magnitudine, læuibus, firmis, versicoloribus. Ra-
dix ad digiti crassitudinem & cubiti lōgitudinē adolescit. Id somni-
ferum esse constat. Copiosius haustum mortem adfert. Nec desuere,
qui dicerent, semen in amatoria expeti.

De Mandragora. CAP. LXXIX.

Andragora aliqui circæum, alij Xerantes, aliqui antim-
nion aut antimion, alij Bombochylon, nonnulli minon,
n. ij.

DE MEDICINALI MATERIA

Aegyptij Apemum, Pythagoras anthropomorphon, alij Aloe-
ten, alij Thridaciā, alij Cammaron, Zoroastres diamonō, aut Archi-
nen, Magi hemionos, aliqui Gonogeonas, Romani caninū malum,
alij terrestre malum, quidam antimelon, nonnulli dircæam, alij Cir-
cæam vocant, quoniam videatur radix ad amatoria conducere. Duo
eius genera. Niger, quæ fœmina existimatur, Thridacias appellatus,
angustioribus folijs, ac minoribus q̄ lactucæ, graueolentibus, in ter-
ra sparsis. Mala gerit luteis ouorum similia, pallida, odorata, in qui-
bus semen veluti pyrorum. Radicibus inhæret binis, ternisue, inter
se conuolutis, nigris foris, intus albis, carnosus, ingentibus. Verum
is Mandragoras caule viduus est. Alter candidus, qui mas dicitur,
nonnullis Norion vocitatus. Huius folia, magna, alba, lata, læuia vt
Betæ. Mala q̄ alterius duplo maiora, colore in crocum inclinante,
iucunde cum grauitate quadam olentia. Horum pomorum cibo, ali-
quantum opiliones soporantur. Radix, alterius similis, maior, &
candidior, orbata caule. Succus fit e cortice recentis radicis tuso, &
prælis subiecto, qui terendo coactus, fictili reconditur. Malis quoq̄
succus depromitur, sed aliquanto ignauior. Delibratur radix, & tra-
iectus lino cortex, ad vsum suspenditur. Aliqui radices in vino ad
tertias coquunt, & defæcatum ius seruant. Cyathosq̄ vno vtuntur,
in perurgilijs, & doloribus, & antesectiones vñtionesq̄, ne sentian-
tur. Succus duobus obolis ex mulso potus, vt Veratrum, per vom-
tiones bilem atram, pituitamq̄ extrahit. Verum potu largiore, vita
adimitur. Medicamentis ocularibus, & his quæ dolores finiunt, pes-
fis quoq̄ emollientibus, ammiscetur. Semioboli pondere inditus,
menses & partus expellit. Subditus pro balano, somnificus est. Ra-
dix ebur emollire fertur, quæ senis horis cum eo decocta fit, & ad ac-
cipiendam quam effingere optaueris formam, ipsum facile præstat.
Folia recentia conuenienter oculorum inflammationibus, & collectio-
nibus, quas vlcera citarunt, cum polenta illiuntur. Duricias om-
neis, suppurationes, strumas, & tubercula discutiunt. Stigmata si-
ne exulceratione delent, si quinis senisve diebus, sensim perfricentur.
Folia seruantur in murijs, eisdem ad vsus. Trita radix ignibus sa-
cris ex aceto, & serpentium ictibus ex melle aut oleo, medetur. Stru-
mas atq̄ tubercula, cum aqua dissipat. Articulorum cruciatus, cum
polenta sedat. Fit citra coctionem vinum e cortice radicis, ad hunc
modum. Ternæ minæ in vini dulcis metretā, coniiciuntur. Dātur ex
eo terni cyathi, ijs qui secari aut amburi debent, vt ante dictum est. Si-
quidem nullo tunc afficiuntur dolore. Sed veterno quodam pressis,
torpescunt. Mala soporem afferunt olfactu, & etiam si mandantur.

Item expressus ex eis succus. Nimio tamen odore percussus, obmutescunt. Semen malorum potum vulvas purgat, appositumque cum sulphure ignem non experto. Rubra foeminarum profluvia sistit. Scarificatis multipharum radicibus, erumpens lachryma, cauo vase recipitur. Est autem lachryma lacteo succo efficacior. Sed non ubique ut experientia docet, radices lacteum succum delachrymant. Alium tradunt esse mandragoram, nomine morion, in opacis iuxta specus enatum, folijs albi mandragoræ, minoribus, albis, dodrantalibus, in orbem circum radicem. Quæ mollis est & candida, paulo maior palmo, pollicemque crassitudine æquat. Tradunt eam in pane, ossa, obsoniove, drachmæ pondere deuoratam, non memoriam modo, sed usum quoque rationis intercipere. Obdormiscit enim homo, eo fere quo comederit habitu, sēsus impos, ternis quaternisve ex quo data est horis. Hac medici vtuntur, cum scindendi, vrendique necessitas adest. Antidotū esse volunt radicem cum manico solano potam.

De Aconito.

CAP.

LXXX.

Conitū aliqui Pardalianches, alij Cammoron, alij Thelyphonon, alij Myostonon, alij Therophonon vocant. Folia habet Cyclamini, aut cucumeris, tria aut quattuor, minora & subhirsuta, caulem palmo altū. Radix scorpionis caudam æmulatur, & alabastrum modisplendet. Torpescunt, ut fama est, scorpiones admora radice, stupentque. Qui rursus hellebori contactu, excitantur. Oculorum medicamentis leuandi doloris gratia adijcitur. Enecat pantheras, lupos, & feras omnes, in carnibus obiectum.

De altero Aconito.

LXXXI.

St & alterum aconitum, quod aliqui Cynostonon, alij Lycostonon appellant, alij Cyamon leucon, Romani Colomestrum. Huius genera sunt tria. Vinum quo vtuntur venatores, alia duo in usum suum vertere medici. E quibus tertium, quod ponticum nominatur, magna ex parte in Italia montibus iustinis exilit, a priore distans, quoniam folia faciat effigie platani, crebriore diuisura, longiora, & multo nigriora. Caulem filicis, læuem stylum cubitali altitudine aut ampliorem. Semen in filiquis oblongis recondit. Radices in modum squillæ piscis scirrorum nigrescunt. Quibus ad venationem luporum vtuntur. Insertæ siquidem crudis carnibus, et deuoratæ lupos enecant.

DE MEDICINALI MATERIA

De Cicuta.

CAP. LXXXII.

Oniō aliquibus ægynos, alijs Ethusa, alijs Apolegusa, alijs
 c Dolia, alijs Amaurosis, alijs Paralyfis, nonnullis Aphron,
 Quibusdam Creidion, alijs Coeten, alijs catechomenion,
 alijs Abioton, alijs Abseudes, alijs Ageomoron, alij Timoron, alijs
 Polyanodinos, alijs Dardanis, alijs cataplyxis, Ostanie Babathy, Æ
 gyptijs Apemphi, Romanis cicuta appellatur. Caulē edit genicula-
 tum, vt fœniculi grandem, in cacumine ramosum, folia ferulæ, angustio-
 ra, graui odoratu. Umbellæ in summo prodeunt, flores quoq; albi-
 cantes, & semē aniso candidius. Radice non alta, concaua. Cicuta le-
 tale venenum inest, suaq; vi refrigeratoria necat. Remedio est vini
 meraculi potus. Succus exprimitur cōtusis cacuminibus, priusq; semi-
 na & comæ siccescant, qui sole dēfatur in pastillos. Præcipuus ad me-
 dendi rationem vsus est aridi. Miscetur collyrijs, quæ leuandi doloris
 gratia temperantur. Ignēs sacros, & vlcera quæ serpunt, illitu resstin-
 guit. Hæba cum coma trita, & testibus circumlita, libidinum imagi-
 nationes in somno, cōpescit. Sed genitale resoluit. Lac puerperarum
 mammis apposita extinguit. In virginitate mammas coercet, & in-
 crescere non patitur. Pueris præstat vt eorum testiculi cibum non sen-
 tientes, intabescant. Efficacissima vis Creticæ, Megarenfis, mox Atti-
 cæ & in Chio & Cilicia nascenti.

De Taxo.

CAP. LXXXIII.

Milax a Græcis, Taxus a Latinis appellatur. Arbor abietis
 f magnitudine, & foliorum eiusdem figura. In Italia & Nar-
 bonensi Gallia Hispaniæ contermina nascens. Auiculæ quæ
 Italicæ taxi baccas deuorant, denigrantur, & qui ederint eandem homi-
 nes, alui profluvio corripuntur. Narbone tam præsentis est veneni,
 vt siqui dormiant sub ea; aut in eius vmbra subsideant, læduntur, & sæ-
 penumero moriantur. Quare de taxo hæc traduntur, vt ab ea cauea-
 mus.

De Apocyno.

CAP. LXXXIII.

Pocynon aliqui Cynanchon appellant, alij Pardalian-
 a ches, alij Cynomoron, alij Cynocramben, alij Cynothonon,
 alij Phaleon, alij Cynanchen, alij Oligoron, alij Hippo-
 manes, alij Onistin, alij Ophioscorodon, alij Cynaricæ, alij Elapho-
 scorodon, Magi paralyfin, Romani brassicam rusticam aut caninam.
 Frutex est paruis viticulis constans, male olentibus, fractu fere inui-
 dis, folio hederæ, molliore tamen, & per extremum acutiore, viscoso,

gravi odore. Id luteo succo turgēt. Siliquæ ceu fabarum, digiti longitudine protenduntur, semine intus albo, duro, paruo. Folia cū adipe in panes coacta, canes, lupos, & pantheras enecant in cibo data, & protinus eorum coxas resoluunt.

De Nerio seu Rhodendro. CAP. LXXXV.

Erion aliqui Rhododaphnen, alij Rhodendron, alij Spon-
 gica, alij Hamostarin, Romani Rhododēdron, Lucani Ie-
 manen, Aegyptij Scympham, Pœni Rhododaphnem; ap-
 pellauere. Erutex est vulgaris notitiæ, longioribus q̃ amygdala folijs,
 asperioribusq; flore in rosam conformato, fructu nuci græcæ simili,
 corniculato qui patefactus quādam floccorum speciem ostendit, Hy-
 cynthi pappos representantem. Radice longa, acuta, lignosa, gu-
 stanti salsa. Nascitur in amœnis, maritimis, amnibusq;. Flores & folia
 mulis, asinis & quadrupedum plurimis venena sunt, hominum vero
 contra serpentium morsus præsidia. E vino pota, eo magis ruta addita
 imbecillæ etiā animantes, vt pœcus & capræ, si aquam bibāt in qua
 folia ea maduerint, moriuntur.

De Fungis.

CAP. LXXXVI.

Vngorum differentia duplex. Aut enim manduntur, aut per-
 f. niciales sunt. Multis de causis venenosi gignuntur. Si enim
 clauus ferreus, in quo sit rubigo, aut panni marcor adfuerit.
 Aut si iuxta serpentis cauernam, arboreve, quæ pariunt noxios fru-
 ctus erumpant. Continent nescio quod strigmentum concretamq; pi-
 tuitam, terraq; eruti, q̃celerrime computrescunt, atq; marcere vi-
 riantur. Sed qui veneno imbuti non sunt, suauem in iuribus gratiam
 habent. Largius tamen sumpti nocent, & ægrius concocti strangu-
 lant, aut choleram morbum citant. Remedio est nitri potus, aut li-
 xiuum cum acida muria, aut feruesfactæ satureiæ aut Origani iuscu-
 lum. Debeilātur etiā gallinacei fimi potu ex aceto, aut eiusdem delin-
 ctu cum melle multo. Corpus alunt, sed ægre dissoluuntur, cum ma-
 gna ex parte integri ipsi, cum recrementis alui reiiciantur.

De Colchico.

CAP. LXXXVII.

Olchicon aliqui Ephemeron, Romani agrestem Bulbum
 c. vocant. Autumni exitu florem ædit croci, candicantē, ab eo
 tempore, folia bulbi, sed pinguiora, caulē palmo altū, ferentē
 rufum semen, radicem foris e nigra rufescentem, quæ delibrata, candi-
 da & mollis spectatur. Lacteo succo madet, atq; gustatu dulcis inueni-
 tur. Bulbus mediam habet rimam, fissuramq;, qua flos erumpit. Pluri-

DE MEDICINALI MATERIA

mun in Messenia, & Colchis, enascitur. Ea comesta, fungorum more, strangulando enecat. Hanc autem depinximus, ne a quoq̃ imprudenter, pro bulbo deuoretur. Miram enim incautis voluptatē affert. Remedia sunt eadem quæ fungis. Bubulum etiam lac potum auxiliatur. Itaq̃ cum adfuerit, non aliud desideratur auxilium.

De Ephemero. CAP. LXXXVIII.

Phemeron aliqui syluestre Irin appellant. Folia habet Lilij, sed tenuiora, caulem parem, florem candidum, amarum, semen molle, radicem vnam, digitali crassitudine, longam, adstringentem, odoratam. Nascitur in syluis & opacis. Huius radix dentibus præcipua, si decocto colluantur. Folia in vino cocta, discutiant tumores, & tubercula, quæ nihil adhuc humidi contraxerunt.

De Alfinæ. CAP. LXXXIX.

Alfinæ sive Alfinæ
 Linen aliqui Anthyllion. alij Myortochon, alij Myrtosplenon, Romani Muris auriculam, Pœni Labatholabat, nō nulli myos ota vocāt, quoniam musculorum aures folia imitantur. Lucis opacisq̃ gaudet, vnde alfine dicta est. Hæcerat eadē quæ Helxine, nisi folijs minor, minusq̃ hirsuta esset. Cum teritur, odorē cumis reddit. Vim refrigerandi adstringendiq̃ obtinet. Oculorum inflammationibus cum polenta illinitur. Succus aurium doloribus infunditur. Quin & emendat omnia quæ helxine idest muralis hærbæ.

De palustri Lente. CAP. XC.

Palustri Lente
 Ens palustris quam agriam aliqui, alij Epipteron, Romani Viperalem vacant. Inuenitur in aqua non fluente, muscus læticulæ similis, refrigeratoriæ naturæ. Propter quod conuenienter collectionibus, igni sacro, & podagris, illinitur per se, & cum polenta. Glutinat & procidentia puerorum interanea.

De semperuino seu Sedo magno. CAP. XCI.

Sedo magno
 Iزون maius, aliqui Aithales, alij Ambrosion, alij Chrysispermon, alij zoophthalmon, alij Bubophthalmon, alij Stergethron, alij Aeonion, alij Aichryson, alij Olochryson, non nulli Chrysanthemon, alij Protogonon, alij Boron, alij Notion. Magi Paronychiam, alij Chrystin. Romani ceriam cuspiā, aut iouis caulem nominant, alij Leapetes, alij Sedum maius, Aegyptij Pamphanes. Semperuium ideo nominatur, quoniam perpetuo folia vireant, cuius caules cubiti altitudinem implent, interdum excedunt, pingues, crassitudine pollicari, virētes, Characiæ titimali modo icti, folia carnosa, longitudine pollicari, in cacumine linguæ familia, alia in terram conuexa, alia in capite stantia inuicem, ita vt ambitu, effigiem imitent.

tur oculi. Nascitur in mōtibz, & testaceis. Supra domicilia etiam sc̄ritur. Eius vis refrigerare & adstringere. Medentur igni sacro, nomis, vlceribus quæ serpunt, oculorum inflammationibus, ambustis igni, podagris per se, & cum polenta illita folia. Succus capiti, in doloribus cum polenta aut rosaceo perfunditur. Datur in potu contra phalangiorum idus, dysenteriam, aluiq; profluuia. Teretes tineas potus in vino excutit. Subditus in vellere, mulierum abundantia fistit. Succus oculorum lippitudinibus, sanguinis vicio conceptis, inungitur.

De minore Semperuino. CAP. XCII.

Izoon paruum, alij Petrophyes appellant, alij Brotion, alij
 a Theobrotion, alij Crobysson, alij Chimerinen, alij Cerau-
 niam, Romani Vitalem, alij Semperuium, Aegyptij Eni-
 celtam. In petris, parietinis, & maceris, necnon scrobibus opacis nascitur, caulibus ab vna radice multis, tenuibus, crebro foliatis, exilibus folijs, rotundis, pinguibz, mucronatis, caule a medio emicante, palmum alto, vmbellam hærbidosq; flores & tenues gerente. Folia eisdem cum priore, viribus prædita sunt. Semperuium quod tenui constat folio, aliqui aizoon paruum, alij Petrophyes, alij Aizoon sylvestre, Romani Semperuium minus, appellant. Tertium videtur semperuii genus, quam aliqui Andrachnen agriam, aut Telephion vocauerunt, Romani illecebram, pusillis crassioribusq; folijs, hirsutis, portulacæ proximis. Vis ei excaustoria, acris, exulcerans. Illita cum axungia strumas discutit.

De Veneris vmbilico. CAP. XCIII.

Otyledon aliquibus Cymbalion, alijs Scytalion, alijs
 c pos Aphrodites, alijs terræ vmbilicus, alijs Stœchis, alijs Stergethron, Latinis vmbilicus veneris dicitur. Folio est in acetabuli formam tornato, ineuidenter concavo, breui in medio cauliculo, in quo semen inest, radice oliuæ modo rotunda. Succus cum vino circualitus, instillatusve, asperam carnis excrecentiam constringentem os vuluæ, reprimat. Inflammationibus, sacris ignibus, strumis, pernionibus, illitu auxiliatur. Stomachi ardorem refrigerat. Folia cum radice comesta, calculos frangunt. Vrinam cient. Hydropicis ex melle dantur. Hærbæ vtuntur ad amatoria.

De altero veneris vmbilico CAP. XCIIII

Et alterum genus eiusdem, cymbalion aliqui vocant, pingui-
 c bus folijs, latioribus, ligularum modo densis, circa radicem ambitum oculi describentibus, vt in maiore Semperuiuo, adstringentis gustus, cauliculo tenui, in quo flores & semina hyperici, radice maiuscula. Facit eadem, quæ semperuium.

DE MEDICINALI MATERIA

De Vrtica.

CAP.

XCV.

a Calyphen aliqui Cniden, alij Adicen, Latini Vrticam, Aegyptij Selephion, Daci Dyn appellant. A calyphen etiam alteram aliqui Cniphem, Romani Vrticam mollem vocant. Duo eius genera. Sylvestris asperior, latioribus, nigrioribusq; folijs, semine lini, sed minore. Altera non æque aspera, minuto semine. Folia utriusq; illita, canis moribus addito sale medentur. Gangrænas, carcinos, nomata, sordida ulcera, & quæ cacoethe vocantur, item luxata, panos, tubercula, parotidas, suppurationesq; sanant. Lienosis cum cæcæ to imponuntur. Faciunt ad profluuium narium cum succo trita, & narium indita. Menfes ciunt, eadem recentia detrita cum myrrha, & imposita. Procidentes vulvas, contactu resiliere cogunt. Semen potum expasso, venerem stimulat. Vulvam aperit. Cum melle delinctum, orthopnoeæ, lateris & pulmonum inflammationibus, prodest. Thoracem expurgat. Erodentibus medicamentis ammiscetur. Cocta cum conchis folia, aluum emolliunt. Urinas mouent. Inflationes discutunt. Decocta cum prîsana, vitia pectoris extrahunt. Mulierum menses euocant, cum myrrha modico pota. Inflammatione turgentem vnam, gargarisatus succus reprimat.

De Galiophi.

CAP.

XCVI.

g Aliophs, aut vt alijs Galeobdolon, vel Gallephos, Aegyptijs Aetopi, Latinis Vrtica labeo dicitur. Frutex in totum caulem & folia habet vrticæ, læuiora, & quæ grauem odorem trita reddant. Flore purpureo, tenui. Nascitur circa sepes, ædificia, ac semitas, vbique. Folia, caules, semen, succulq; duricias & carcinomata dissipant. Strumas, panos, & parotidas discutunt. Oportet bis in die tepidum ex aceto cataplasma imponere, & eius decocto fouere. Ad putrescentiam, gangrænas, & nomas, cum sale efficaciter illinuntur.

De Gallio.

CAP.

XCVII.

g Allion siue vt alijs Gallacion, aut Gallerion, nomen ex eo traxit, q̃ in contrahendo lacte, coaguli vicem impleat. Ramulum foliumq; habet aparinæ simillimum, rectum, florem in cacumine luteum, tenue, odoratum. Flos igni ambustus illinitur. Sanguinis profluuium sistit. Cæcæto rosaceo Gallion ammiscetur, insolutum vsq; dum albescat. Lassitudines reficit. Radix venerem concitat. Nascitur in palustribus.

De Senetione.

CAP.

XCVIII.

t Rigeron a Græcis vocatur, a Latinis hærbulum aut senetio, alias Erechrites. Cauliculo est cubitali, subrubro, folijs continuis, diuisisq; erucæ, sed minoribus multo, luteis floribus

qui celeriter difsecti, vanescūt in pappos. Nomen vero sibi vēdicauit, quoniā flores capillorū ritu, vere canescāt. Radice superuacua. Nascitur maxime in macerijs, & circū oppida. Folia cū floribus refrigerant. Quare illita cum vini modico, vel per se, testium & sedis inflammationes sanant. Quin & ex manna thuris medentur, cum reliquis vulneribus, tum ijs quæ nerui accēperunt. Illiti cum aceto pappi, idem munus præstāt. Verum recentes epoti, strangulant. Totus caulis si coctus in passo potui detur, stomachi dolores a bili contractos, persanant.

De Thaliastro.

CAP.

XCIX.

t Haliastron folia Coriandri habet, pinguiora paulo, caulem rutæ, in quo folia. Quæ trita, illitu antiqua vlcera ad cicatricem perducunt. Nascitur maxime in campestribus.

De marino Bryo.

CAP.

C.

m Aarinum Bryon, aliqui Balaryin, alij Iranen vocant. Nascitur in scopulis testaceisq; haud procul a mari, gracile, capillaceum, caulis expers. Præcipua ei spissandi vis, & collectiones cohibendi, & podagras, quas refrigerare opus fit.

De fuco marino.

CAP.

CI.

e Fucimarini generibus, quoddam latum, & alterum sublongius, & rubens. Tertium candidum, nascens in Creta, floridum valde, quod nulla corruptionis labe polluitur. Omnia vim habent refrigeratorem, non podagræ modo, sed etiam inflammationibus, in cataplasmatibus efficaciter vtilem. Verū ijs vti humidis cōuenit, priusq; exarescant. Nicander, puniceum aduersus serpentes dedit. Hoc fuco quidam putant, mulieres suum colorem mentiri. Cum tamen sit radícula eiusdem nominis, qua se fucant.

De Potamogetone.

CAP.

CII.

p Otamogetō alias Stachyites, apud Aegyptios Ertheuchis, Latine fatalis dicitur, folium betæ simile, hirsutum, paululum supereminēs extra aquam. Refrigerat & inspissat. Foliū pruriginibus vtile. Et contra veterum vlcera nomas. Nomen ex eo inditum est, q̃ palustribus & aquosis enascatur.

De Stratiote.

CAP.

CIII.

f Tratiotes in aquis nascens, aliquibus fluuiatilis Stratiotes nūcupatur, Aegyptijs Tibus, Magis Aeluri sanguis. Aquis supernatat, & sine radice viuit. Vnde cognomentum traxit. Hærbæ semper uiuo similis, ni maiora haberet folia. Quæ refrigerant. Sanguinē qui defluit a renibus, pota sistūt. Vulnere quæ inflammationem minantur, intumescere non sinunt. Ignibus sacris & tumoribus

DE MEDICINALI MATERIA

ex aceto illinuntur.

De stratiote Chiliophyllo. CAP. CIIII.

f Tratiotes Chiliophyllos, exiguus frutex, palmi altitudine, aut amplius assurgit. Folijs auicularum pennas imitantibus, breui admodum dissectoq; foliorum exortu. Folia syluestre cuminum simulant, præsertim breuitate, atq; scabricia, breuiora paulo, denfiore umbella, & pleniore. Surculos in cacumine gerit exiguos, & capitula in modum aneti, flores paruos, candidos. Nascitur in asperis agris, præcipue circa semitas. Eximij vsus ad vlcera vetera, recentiaq; profluentem sanguinem, & fistulas.

De Verbasco. CAP. CV.

p Hlomon Græci, Latini verbascum vocant. Differentiam duplicem habet, nigrum & album, in quo mas & femina intelligitur. Fœminæ igitur folia sunt brassicæ, pilosiora multo, & latiora, candida, caulis albus, cubitalis, aut amplior, subhirsutus, flores albi, aut ex luteo pallescentes, semen nigrum, radix longa, acerbæ, crassitudine digiti. Nascitur in campestribus. Verbascum qui mas appellatur, oblongius, albis folijs & angustioribus, tenui caule. Sed nigrum prorsus albo simile esset, nisi nigriore latioreq; cõstaret folio. Syluestre folia fert saluix, altæ virgæ, & lignosæ, & circa eas ramulos quales Marrubium, flores luteos, auræmulos. Sunt & Phlomidæ duæ, hirsutæ, rotundis folijs, humiles. Tertia Lychnitis appellatur, ab alijs autem thryallis, folijs ternis, aut quaternis, vel paulo pluribus, crassis, pinguibusq; apta ad lucernarum lumina. Radix priorum duarum adstringit, quare quod magnitudine ludicrum talum æquet, in alui profluvio, conuenienter ex vino datur. Decoctum ruptis, cõuulsis, fractis, antiquæ tussi, auxiliatur. Dētiū dolorem collutione mitigat. Verbascum cui flos aureus, capillos tingit. Et quocunq; abijciatur, blattas in se contrahit. Cocta in aqua folia, aduersus tumores, inflammationes oculorum, syderata vlcera, ex vino & melle illinuntur. Cū aceto quoq; vulneribus medentur. Contra scorpionū idūs, auxilio est. Sylvestris folia ambustis igni, sunt cataplasmata. Aiunt in folijs eius, quam fœminam dicimus, aridos ficus omnino non putrescere.

De Aethiopide. CAP. CVI.

a Ethiopis folia habet verbasco similia, perq; hirsuta, densaq; in orbem circa radicem imam redacta, caulem quadrangulū, scabrum, similem apiastro, aut arctio, multis concavum alis, semen erui magnitudine, geminum, in vno conceptaculo, radices numerosas, longas, plenas, glutinosas gustu, quæ siccæ nigrescunt duranturq; vt cornua possint videri. Plurima nascitur in Ida mōte Troadis,

& in Messenia. Auxiliatur purulentis excreationibus, Ischiadicis, pleuriticis, arteriæ scabricijs, decocta radix & pota. Quin & cum melle, eclegmatis vicem præbet.

De Arstio.

CAP.

CVII.

Ration aliqui potius Arsturon vocant. Similis est verbas

- a fco sôlijs, nisi quod hirsutiora & rotundiora sunt, caule longo, molli, semine cumini, paruo, radice tenera, alba, dulciq.

Decocta cum semine radix in vino, dentium dolorem mulcet, si continetur ore decoctum. Ambusta pernionesq; fouentur eodem. Bibitur aduersus coxendicum dolores, & stranguriam e vino.

De Personata.

CAP.

CVIII.

Rcion alij Profopida, alij Profopion, alij Aparinen, Latini

- a Personatam, aut Lappam appellant. Folia habet maiora etiâ cucurbitis, & hirsutiora, nigriora, & crassiora, caulē albican-

tem, quanq̃ & interdum vidua caule reperiatur, radice intus candida, foris nigra. Hæc drachmæ vnus pondere pota, cum pineis nucibus, purulenta & cruenta extussientibus auxiliatur. Trita dolores in artubus, astrictius vinctis illitu sedat. Folia vtiliter antiquis vlcerebus illinuntur.

De Petasite.

CAP.

CIX.

Erasites pediculus cubito maior, crassitudine pollicis, a quo

- p prægrande folium, galeri modo amplum, ceu fungus dependet. Contra phagedænas, & vlcera quæ cacoethe vocant, effi-

caciter illinitur.

De Epifactide.

CAP.

CX.

Pisactis ab alijs Helleborine, aut Borion, vocatur. Parua hæc

- e ba, fruticosa, exiguis folijs; Iocineris vinijs vtilis, & contra venena pota.

De Capno seu fumaria.

CAP.

CXI.

Apron, aliqui Corydalion, aut Corion vocat, alij sylvestre

- c Coridalion, alij Capnon in hordeis, alij Capniten, alij Mar-

mariten, alij Capnogorgion, alij Chelidonium micron, alij

Peristerion, alij Cantharida, alij Chalcocri, Romani Fumariam, Aeg-

gyptij Tucin. Fruticosa hærbula est, prætenera, Coriandri similis, fo-

lijs candidioribus, vndiq; numerosis, cineracei coloris, flore purpureo.

Huius succus claritatem facit oculis, delachrymationemq;. Vnde no-

men traxit. Illitu cum gummi, euulsas palpebras renasci prohibet. Cō-

manducata hærbili osam vrinam trahit.

DE MEDICINALI MATERIA

De Loto vrbana. CAP. CXII.

l Otum vrbanam alij Triphyllon, alij Libyon, alij Tripo-
dion, alij Tribolion vocant. Nascitur in hortis. Extractus
succus, addito melle, oculorum argema, nubeculas, ceterasq;
caligines discutit.

De syluestri Loto. CAP. CXIII.

f yluestris Lotus, quam aliqui Libyon, alij Triphyllon, Ro-
mani Trifolium minus appellant. Plurimum in Libya gigni-
tur, caule cubitali, & sæpe maiore, alis multis, folijs Trifolij
pratensis, semine sænigræci, multo minore, gustu medicato. Vim calfa-
ciendi & leniter adstringendi obtinet. Vitia cutis in facie, maculaq;
cum melle peruncta expurgat. Trita per sese, aut cum malux semi-
ne, in vino aut passo bibitur aptissime, contra dolores, qui vesicam ma-
le habent.

De Cytisso. CAP. CXIII.

c ytissus, quem aliqui Telinen, alij Lotum magnum, alij Tri-
phyllon, Romani Trifolium maius appellant, Frutex est al-
bus in totum, vt rhamnus, ramos spargens cubito longiores,
folia sænigræci, aut loti trifolia, minora, dorso medio prominente. Ea
digitis trita erucam olent, gustataq; cicer sapiunt. Folia refrigerant. Tu-
mores inter initia discutunt, si cum pane trita illinantur: Decoctum
potu vrinam ciet. Nonnulli quod apes allicit, prope aluearia ferunt.

De Aegyptia Loto. CAP. CXV.

c St & in Aegypto Lotus, quæ aquis provenit, plana irrigan-
tibus, caule sabæ, flore paruo, candido, Lilio simili, quem tra-
dunt occidere sole comprimere, occludiq; ad ortum autem ape-
riri. Adduntq; caput ipsum vespera aquis condi, & ad exortum solis
emergere. Caput quale papaueris, maximum, & intus grana ceu milij,
quæ Aegyptij exiccant, & in panes cogunt. Radicem lotidis hæc ha-
bet, mali cotonei similitudine, quæ cruda cocta q; mādatur. Decoctaq;
lutei oui speciem exhibet.

De Millefolio. CAP. CXVI.

m yriophyllon alij Melophyllō, alij Stratiotice, alij Achilli-
on, Latini Millefolium vocant, aliqui Supercilium veneris,
Galli Beliocandas. Caulis est tener, indiuiduus, vnica nixus
radice, plurimis folijs, sæniculo similibus. Vnde nomen accēpit. Cau-
lis flauescit, prædēsus, ac veluti ex industria delinatus. Nascitur in pa-
lustribus. Vulnera recentia ab inflammatione vindicat. Si vel viride,
vel ficcum ex aceto, oblinatur, Præcipitatis cum aqua & sale datur.

LIBER QVARTVS.

104

De Myrrhida.

CAP.

CXVII.

Myrrhis quam alij Myrrham, alij Conilen vocāt, simillima est
m cicutæ, caule folijsq. Radix ei oblonga, mollis, rotunda, cibo
non insuauis. Quæ pota in vino, phalagiorum moribus au-
xiliatur. Cir menstrua & partus. Subuenit & phthificis cocta in forbi-
tione. Aut quoq. eandem bis die terye potā ex vino, in pestilētia sa-
lutarem esse, & ne morbi contagia sentiantur, obfata.

De Myagro.

CAP.

CXVIII.

Myagron aliqui Melampyron vocāt. Hæba est surculacea,
m folijs rubiæ, pallidis, tripedanea. Semē oleosum, collo simi-
le. Quod cōtusum igni torrent, perunctisq. virgis ad lucera-
narum lumina vtūt. Hoc pingui, scabrias corporis læuigari, atq.
expoliri, constat.

De Onagra.

CAP.

CXIX.

Nagra siue Onothera, aut Onuris. Frutex est arboris instar,
o prægrandis, amygdalino folio, Lilio non dissimili, flore rosa-
ceo, magno, radice candida, pusilla, cum siccata est vinum olē-
te. Nascitur iu montibus. Aqua in qua radix maduerit, in potu data,
feras mitigat & cicures facit. Illitu quoq. tetra vlcera mulcet.

De Crissio.

CAP.

CXX.

Rission aliqui Buglossum magnum vocant, Romani Spinā
c mollem. Caulis est tener, duorum cubitorum, triangulo simi-
lis, anguli spinosi, per interualla molles, folia buglossio simi-
lia, maiora, subcandida, modice hirsuta, partibus extremis aculeata,
cacumē caulis orbiculatum, hispidum, in quo capitula purpurea, quæ
soluuntur in lanugines. Radicem huius loco laboranti adalligatam,
dolores varicum sedare Andreas scripsit.

De Astore seu inguinali.

CAP.

CXXI.

Ster ab aliquibus Bobonion appellatur, ab alijs Astericos,
a alijs Astenon, quibusdā Hyophthalmon. Romanis ingui-
nalis. Dacis Rathibis. Cauliculus lignosus, florem in cacu-
mine habens purpureum, luteumve, & in ambitu diuisum anthemidis
modo capitulum, pusilla in eo circa caulem folia, stellæ modo radiata,
oblonga, hirsuta. Feruenti stomacho, oculorum inflammationibus,
prociua sedi, ac inguinibus illitu auxiliatur. Tradūt purpureum flo-
rem, si ex aqua bibatur, anginis, & pueris comitiale malum sentienti-
bus, opitulari. Inguinum inflammationi recentem illinire conuenit.
Si aridus flos sinistra dolentis manu decerpatur, & inguinibus adlige-
tur, dolore liberat. Stellares huius radij noctu splendent, quapropter
qui ignari antea non viderunt, esse inane simulacrum arbitrantur. Me-

DE MEDICINALI MATERIA

dijs saxis & asperis exit. Inuenitur autem ab opilionibus. Crateuas rhizotomus hæc de ea refert, si viridis cum axungia vetere tūdatur, cōtra rabioforum morsus, turgentia guttura proderit. Suffitu quoq; serpentes fugat.

De Isopyro. CAP. CXXII.

Sopyron aliqui Phasiolon ob similitudinem vocant, quoniam foliū, quod est aniso simile, in pāpinos torquetur. Capitula sunt in summo caule, tenuia, plena seminis, melanthij gustū imitantis. Contra tussim, & cætera pectoris vitia, semen ex aqua mulsa bibitur. Hepaticis & sanguinem excreantibus vtile.

De Viola purpurea. CAP. CXXIII.

Iolā purpureā, aliqui Dasy podion, alij Priapeion, alij Ion sylvestre, alij Cybelion, Romani Violam purpureā vocant. Foliū habet hedera minus, tenuius ac nigrius, nec multo dissimile. Cauliculus a radice prodit, in quo flosculus, suauiter olens, purpureus. Opacis & asperis nascitur. Refrigerandi naturam habet. Folia per se & ex polenta illinuntur aptissime, stomacho æstuanti, & oculorum inflammationibus, sediq; procidēti. Aitū quod purpureū est in flore, anginis & comitialibus auxiliari, maxime pueris, in aqua potum.

De Caucalia. CAP. CXXIII.

Aucalia quæ leontice vocatur, folia fert magna, alba. E quibus medius caulis emicat, rectus, albus, florem ferens robori aut oleæ similem. Radix in vino madefacta vt tragacantha, delinctu aut māducatu per se tussibus, scabrics arteriæ, medetur. Grana quæ post excussum florem innascuntur, trita & cum cærato illita, faciem erugant, & cutem extendunt.

De Bunio napi genere. CAP. CXXV.

Vnion aliqui Aton, alij Añinen, alij Anemosphoron vocant. Magi Paradacry, Aegyptij Ersonen, Romani Scopā regiam, Aphrī Zigar, nonnulli Thepso. Caulē mādicit quadrangulum, digiti longitudine, in quo ramuli minutis folijs ac floribus scatent, folia proxime radicem apio similia, lōge tenuiora, coriandrinis proxima, flores aneti, semen odoratū, hyoscyamo minus. Vrinam ciet. Excalfacit. Secundas euocat. Lienī, vesicæ, renibus, vtile. Tā humidi, q̄ ficci, expressiq; succi caulibus folijs radicibusq; vsus inualuit ex aqua mulsa.

De Pseudobunio. CAP. CXXVI.

Seudobunion palmi altitudine fruticat, in Creta folia ramuloseq; napi ferens, acri gustu. Tormina, atq; stranguriam, laterumq; dolores, sanant quaterni ramī eius poti in aqua. Illiti

quoq; cum sale & vino, tepentes, anginam discutiunt.

De Chamæcisso.

CAP. CXXVII.

Hamæcissos, alio nomine Chamæleuce, alio Cissos acar-
 c pos, aut terræ corona, aut Selinitis, Latine hederæ pluuiatica
 dicitur. Folio est hederæ, tenuiore, longiusculo, ramulis qui-
 nis senisve, dodrantalibus, foliosis, flore violæ albæ simili, candidio-
 re, ac tenuioræ gustu supra modum amaro, radice tenui, cādida, inutili.
 Nascitur in cultis. Bibūt conuenientissime ischiadici folia, tribus obo-
 lis in aquæ cyathis tribus, tricenis quadragenisve diebus. Eodē pota-
 modo senis aut septenis diebus regium morbum purgant.

De Chamæleuce.

CAP. CXXVIII.

Hamæleuce lumborū doloribus propicia est, hærba virens,

c incuruis folijs furculisq; flore rosaceo.

De Buglossio seu lingua bubula. CAP. CXXIX.

Vglossum Magi ælurigonon, Osthanes tranochi, Aegyptij
 b Belor, Romani liguā bubulā, alij libaniū, Pœni Anasanaph
 vocāt. Nascitur in cāpestribus & vaporosis. Iulio mēse colli-
 gitur. Aiūt eā quæ treis tyrsos emittit cū semine & radice tritā, potāq;
 contra tertianos rigores prodesse, quæ quattuor ad quaternos. Ea in
 vino decoquitur. Hærba abcessibus vtilē esse volūt. Verbasco simile
 est, folium in terra sparsum, nigrius, asperum, bubulas imitās linguas.
 Quod in vinum deiectum, animi voluptates auget.

De Cynoglossio.

CAP. CXXX.

ynoglosson alij Phytton, alij Caballation, alij Splincion, alij

c Scolymon, Romani Liguā canis, aut caninā appellāt. Folia
 latifolia plātaginis habet, arctiora, minora, lanuginosa. Cau-
 le vacat, & humi sternitur. Prouenit in sabuletis. Folia cū suillo adipe
 veteri, medētur morfib; canū, alopecijs, & ambustis. Emollit aluū,
 decoctum hærba ex vino potum.

De Phyteumate.

CAP. CXXXI.

Hyteuma folia habet radiculæ, copiosum semen, perforatum

p radicem paruam, per summa terræ nitentem. Quā ad amato-
 ria conuenire nonnulli scriptum reliquerunt.

De Leontopodio.

CAP. CXXXII.

Leontopodion aliqui Zoonychon vocāt, alij Actonychon,

l alij Cemos, alij Damnamenē, alij Idiophytō, nonnulli Phyto-
 basilā, alij Crossiō, alij Crossophthoon, Magi Sāguinē Cro-
 codili, alij Crocomeriō, Aegyptij Daphnoenen, Romani Minericiū,
 alij Palladiū, alij flāmulā. Digitalis est hærbula, folia ferēs āgusta, lōgi-
 tudine ternū quaternūve digitorū, hirsuta. Quæ iuxta radicē spissiore

DE MEDICINALI MATERIA

flocco canescūt. Capitula in summo caule quasi dissecta, flores nigri, semen vsq̃ adeo spissā lanugine inuolutū est, vt sæpe fallat. Radice parua cohæret. Quam tradunt appensam ad amatoria prodesse, & tubercula discutere.

De Hippoglossō. CAP. CXXXIII.

Ippoglosson aliqui & id antirrhinon, alij Anarrhinon, nōnulli lychnida agriā vocāt. Frutex est folia habēs rusci figurā, & spinosam comā, & in summo ceu linguas cōlijs exētes. Capitis dolorē corona ex comis imposita minuit. Malagmatis radix succusq̃ ammiscetur. De Antirrhino. CAP. CXXXIII.

Ntirrhinon alij Anarrhinon, nonnulli Lychnida agriā appellāt, herbā caule & folijs anagallidi similē, flore albæ violæ, purpureo. Ideoq̃ syluestris anagallis nominata est, semine vitali nariū. Tradunt perunctos ea, cū cyprino oleo aut lilino, venustiores fieri, nec villo medicamento lædi posse, si quis appensum gesserit.

De Catanance. CAP. CXXXV.

Atanāce aliquib⁹ Dānamete, alijs Dionysias, alijs Thyrsiō, alijs Demos, alijs Cemos, alijs Crotion, Magis Archaras, alijs Arcopus, Romanis herbā filicula, alijs Datisca, Dacis Caropithla, dicitur. Ex eo genere vna, folia coronopi habet lōga, radicē iūci modo prætenuē, capitula fena, septenave, in quibus erui semen inest. Arescens in terrā flectitur, & se contrahit ad speciem vnguiū milui exanimati. Altera mali parua magnitudinē explet, radice exigua, colore figura & magnitudine oliuæ, folijs mollibus, diuisis, humi prostratis. Semen vt cicer in ramis dependet, multis foraminibus perforatum. Vtrāq̃ narrāt in amatoria expeti. Thessalicæ mulieris his vtri traduntur.

De Tripolio. CAP. CXXXVI.

Ripolion aliqui Psychen, alij Merida, alij Potamogitona, alij Stachyten, Romani Calliū marē nominant. In marinis nascitur locis, quæ allidit vnda, recedēsq̃ dimittit, neq̃ in mari neq̃ in ficco, folio glauo latiore, arido, palmeo caule, in mucrone diuiso. Eius, vt tradunt, flores colorē ter in die mutant. Mane cādidī, meridie purpurei, sero punicei, cōspiciuntur. Radice alba, odorata, callidi gustus. Quæ drachmis duabus in vino pota, aquā vrināq̃ per aluū extrahit. In medicamenta digeritur, quæ venena arcent.

De Adiāto. CAP. CXXXVII.

Diāton, alij Pollytrichon, alij Callitrichō, alij Trychomænes, alij Hebenotrichon, alij Argion, alij Corion enygron. Aegyptij Epier, Romani Cincinalem, alij terræ capillum, alij Superciliū terræ, Daci Phithophrithethela vocant. Pusilla gerit folia, similia coriandri, serrata. Cauliculi quibus exoriuntur, nigro colo-

re nitent, prætenues, palmum alti, folijs filicis, admodum exilibus, rædice superuacua. Neq; caulē neq; fructū, neq; florē profert. Decoctum hærbæ potū prodest, spirādi difficultati, suspiriosis, lieni, & felle suffusis, & vrinæ difficili. Calculos frangit. Aluū fistit. Serpentiū moribus auxilio est. Contra stomachi fluctiones in vino bibitur. Secundas ciet & menstrua. Sanguinis reiectiones inhibet. Contra serpentiū morsus crudū illinitur. Alopecias densat. Strumas discutit, furfures in facie, & manantia capitis vlcera, ex lixiuio emendat. Desfluentes capillos cōtinet, cum ladano & myrtino, & susino, aut hyssopo vinoq;. Decoctū eius cum lixiuio & vino infusum, idē præstat. Coturnices & gallinaceos pugnatiores facit, in cibos eorū additū. Seritur gratia vtilitatis pecorum. In spelūcis, vmbrosis, & palustribus, circa parietum aspergines, & fontium specus enascitur.

De Fidicula seu Trichomane CAP. CXXXVIII.

Trichomanes aliqui Pterion, alij Opteron, Romani Capillarem, alij Pinulam, alij Fidiculam, nonnulli & eā adianton appellāt. Nascitur eisdem in locis quibus adianton, filici simile, sed exilius, folijs lenticulæ, tenuibus, in ordinem vtrinq; digestis, aduersis inse, ramulis acerbis, fusco colore splendentibus. Eadem quæ & adianton præstare posse constat.

De Xanthio & lapa. CAP. CXXXIX.

Anthion aliqui Phasganon, alij Antirrhion, alij Chascanon, alij Choeradolettron, alij & hanc Aparinā nomināt.

Latini Lapam. Nascitur læro & pigui solo, & lacubus exicatis, caule cubitali, anguloso, pingui, prodeūtibz ex eo crebris alijs. Folia atriplicis habet insecta, nasciturium odore imitātia, fructum grādis oliuæ modo rotundum, & vt platani pilula spinosum, qui contactu vestibus adhærescit. Is ante collectus q̄ perfecte siccescat, tunditur, & fictili vase reconditur. Flauos autē facit capillos, si acetabuli instar repida aqua madescat, mox caput nitro ante perfrictum illinatur. Alij in vino tundūt, & ita asseruant. Semen aptissime tumoribus imponitur.

De Avena. CAP. CXL.

Ægilops aliquibus sitoselos, alijs Siphō, alijs Bromos, Romanis Avena dicitur. Hærbula folia tritici habens, sed molliora, in summo capite semina bina ternave, rubra, quibus aristæ quasi capillacæ, exeūt. Illita cum farina hærbæ ægilopijs medetur. Duricias discutit. Succus farinæ ammixtus, siccat & eorūdem gratia reponitur.

De Bromo Auenæ genere. CAP. CXLI.

Romos hærbæ quam aliqui Siphonion, alij Acrospelon vocant, Auenæ similis est, exiccatoriam vim habens. Deco-

DE MEDICINALI MATERIA

quitur cum sua radice in aqua ad tertias, & iuri colato par modus mellis adijcitur, rursus incoquitur, dum liquidi mellis crassitudo fiat. Linteum eo humore imbutum, & naribus inditū, contra graueolentiam vlcerum efficax est. Aliqui tritam aloen addunt, & eo modo vtitur. Cum ficcis rosis cocta in vino, grauem oris halitum emendat.

De Glauce.

CAP. CXLII.

Laux cytiso & lēticulæ folijs similis, quæ superne virēt, auresq; candidiora spectantur. Ramuli a terra exiliunt quini senive, tenues, ab radice dodrātem alti. Flores ceu violæ albæ purpurei exeunt. Nascitur iuxta mare. Coquitur cū hordeacea farina, sale & oleo in sorbitione, ad reuocandam extincti lactis vbertatem.

De Polygala.

CAP. CXLIII.

Olygala palmi altitudinē petit. Folijs lēticulæ, gustu adstri-
cto, quæ pota lactis abundantiam facit.

De Osyri.

CAP. CXLIIII.

Syris frutex est niger, lentus, ramulos ferens tenues, & in his folia quaterna, quina senave, ceu lini, nigra in initio, dein colore mutato rubescentia. Decoctū eius potū iuuat arquatos.

De aspera Smilace.

CAP. CXLV.

Milax aspera ab alijs Epatitis, alijs Lycanthemon, alijs Cynosbaton, alijs Anicetō, alijs Heliophytō, alijs Anatolicō, alijs Dyticō alijs Helide, Aegyptijs Lyiste, Romanis mergina, Hetruscis Radia appellatur. Folia habet periclymeni, sarmentā tenuia, multa, rubi modo aut paliuri aculeata. Arborea scādit, se conuoluēs eis. Fertracemos exiles, qui maturi rubescunt, gustūq; leniter mordēt. Nascitur in palustribus & asperis, radice dura crassaq;. Folia & acini & ante & post poti, venenorū antidora sunt. Tradūt si infantibus nuper in lucē æditis, quid ex his tritū propinetur, nulla post modū venena nocitura.

De læui Smilace.

CAP. CXLVI.

Aeuis Smilacis folia hederæ similitudinem habēt, molliora, læuiora, tenuiora. Huius sarmenta nullis horrent spinis. Cōuoluitur arboribus vt prior. Fructum parit, lupini modo nigrum, exiguum, floribus in cacumine perpetuis, multis, rotundis. Hac smilace quadam topiariorū arte, tentoria contra æstus molestiā factitantur. Folia per autumnū decidua. Semine cū doricnio poto, ternis singulorum obolis varia & tumultuosa in somnis obuerfari traduntur.

De Rusco.

CAP. CXLVII.

yluestris myrtus aliquibus, Græcis Myrtacanta, alijs Hieromyrton, alijs Oxymyrfine, alijs Myacantha, alijs Agonō, alijs Scincos, alij Mintha, alijs Catāgelos, alijs Anange

fragor
Sanctus

los, alijs Acarō, alijs Ocneron, alijs Cnicē, alijs Lychene, alijs Chamæpitys, alijs Chamæmyrte. Beoris Gyrenia. Magis Herculis gentura, Latinis Ruscū appellatur. Foliū fert myrti, latius, in formā lācæ mucronatum. Baccæ per maturitatē rubescunt, rotundæ, a medio folio dependentes, osseo intus nucleo. Cubitales ramuli ab radice exeunt, viliū modo lenti, fractu contumaces, foliosi. Radice graminis simili, acerba, & subamara. Folia & baccæ in vino potæ vrinā cient. Menses pellunt. Vesicæ calculos frangunt. Stillicidio vrinæ medentur. Dolores capitis sanant, & regium morbum. In asperis & præcipitibus locis nascitur. Decoctum radice in vino potū, eisdē præbet effectus. Cauliculi recētes asparagorum vice, in cibo sumuntur. Amari autem sunt, sed vrinam mouent.

De Lauro Alexandrina. CAP. CXLVIII.

Aurus Alexandrina quam aliqui Idæam, alij Danaen, alij Hippoglotton, alij Zaliā, alij Stephanen, alij Daphnon, alij Samothracen, alij Methrion, alij Hippoglossion vocant. Folio est maiore q̄ rusci, molliore, & candidiore, semine inter folia rubro, ciceris magnitudine. Ramos spargit in terra, dodrantales, interdum longiores. Radice syluestri myrto simili, molliore, odorata. Inuenitur in montosis. Difficiles partus accelerat, radice pota sex drachmarum pondere in vino dulci. Et stillicidio vrinæ auxiliatur. Sed sanguinem extrahit.

De Daphnoide. CAP. CXLIX.

Aphnoides alypo simile, flos vt Nymphaæ, cuius mediū nuci cypressi nō dissimile, in quo semē. Aliqui chamædaphnen, alij Peplion, alij Eupetalon vocant. Cubiti altitudine fruticat, ramis flexilibus, multis inde sursum versus foliosis. Cortex supra modum viscosus ramos vestit. Folia lauri, graciliora, & molliora, fractu contumacia, quorum gustatu os & fauces incenduntur. Flores candidi, baccæ cū ematuruit, magna, radix inutūis. Nascitur in montosis. Pituitas extrahit foliū recens vel aridū in potu. Menses ciet & vomitus. Caput inanit cōmanducatū. Sternutamēta mouet. Baccæ quindescim potæ aluū resoluūt. De Camædaphne. CAP. CL.

Hamædaphnen aliqui & hanc Alexandrinam appellarunt, alij Daphniten, alij Hydragogon, Romani Laureolā, alij lāgaginē, Galli Vsubim. Virgas emittit cubitales singulari ramulocōstātes, rectas, tenues, læues, folia lauri similitudine, læuiora multo, ac viridiora, semen rotundū, rubens, annexū folijs. Illinūtur capitis doloribus trita folia. Stomachi ardores mulcent. Ad sedanda tormina cum vino bibuntur. Potus cū vino succus mēses & vrinā ciet. Idem

DE MEDICINALI MATERIA

facit pefso appofitus.

De albo Veratro.

CAP.

CLI.

h Elleborū albū aliqui Afcida vocāt, alij Atomon, alij Pigna
toxin, Magi fanguinē herculis, alij Polyidos, alij Anaphy
fton, Aegyptij Somphiam, alij Oure, Latini Veratrū albū,
Galli Laginū, alij Anepla. Fert folia plātaginis aut betæ fylueftris
familia, fed breuiora, & nigriora, rubefcentia, caulem cauū, quadranta
lem, tunicis conuolutum cum arefcere cœpit. Radicibus nititur mul
tis, tenuibus, ab oblongo capite exeuntibus, cæparum modo fibratis.
Nafcitur in montibus & asperis. Radices melfibus colligendæ. Opi
mū habetur cādīdū, friabile, carnofum, modice extenū, nec tamē iun
ci modo mucronatū, quod frangēdo puluerē emittit, & tenuem habet
medullā, gūftu nō admodū feruēs, neq; faluā subinde ciens. Huiusce
modi autē ſtrāgulat. Primatū cyrenaicū tenet. Galaticū autē & Cap
padocicū, candidiora, & puluere quodā obfita, celerius ſtrangulatus
mouent. Vomitione autē varios extrahit humores. Collyrijs ammi
ſcetur, quæ caliginem oculorū diſcutiunt. Partus impoſitū necat. Mē
ſes pellit. Sternutamenta excitat. Mures interficit, cū melle & polenta
ſubaſtū. Abſumit carnes ſi coquatur vna. Datur per ſe ieiunis, & cū ſe
ſama, aut priſanæ ſucco, aut halicæ aut lentis cremore, cum aqua mulſa
aut pulte, aut quauis alia ſorbitione. Cogitur cū pane, & ita inaffatur.
Præparatio corporū, ac viſtus ratio, diligenter tradita eſt, cum ab his
qui de medica eius pōtione ſcriptitaſunt, tū maxime a Philonide ficu
lo ennenſi, cui nunc aſſentimur. Quippe longū nimis eſſet in hac præ
fertim æditiōe de materia, ſimul medicam viuendī rationē exponere.
Dant nonnulli in pulte aut halicæ ſorbitione, aut paucū antea cibum
dari præcipientes, ſtatim veratrum offerunt, ijs præſertim, quibus nul
la ſtrangulationis ſuſpicio imminet, ſi nulla valetudo corpus infir
mat. Siquidem dum hæc ita contingunt, deiectio nihil periculi mina
tur, quod nō intempeſtiue medicamētum corporibus offeratur. Vomi
tiones concitant ſubditæ ex eo balani, cum aceto.

De Veratro nigro.

CAP.

CLII.

h Elleborum nigrū, aliqui Nelampodion vocant, alij Ecſto
mon, alij Polyrrhyſon, alij Protion, alij Melanorrhizon,
alij Cyranion, Magi Zomarition, Aegyptij Iſæam, alij Ela
phine, alij Cemeleg, Latini Veratrum nigrum, alij Saraca, Daci pro
diorna. Appellatur Melampodion, quoniam caprarū paſtor nomine
Melampus, furentes in ſe Proeti filias, primus purgaſſe, & ſanaffe fer
tur. Folia ei viridia, platani familia, minora, folijs ſphōdylij proxima,
ſubaſpera, pluribus diuiſuris incifa, caulis aſper, flores purpurei race

matim cohærentes, semen cnici, quod in Anticyra sesamoides vocât. Quo deiectiones moliuntur. Radicibus cohæret nigris, tenuibus, a capitulo capæ simili confibratis. Quarū est vsus. In collibus, asperis, & siccis locis enascitur. Optimum est quod ex quibusdam petitur terris, vt ex Anticyra. Nigrum inibi probatissimum gignitur. Eligi debet corpulentum & plenum, in quo tenuis sit medulla, acre gustu, feruensq. Cuiusmodi est Elicone, Parnaso, & Aetolia natum. Attramen Eliconium præcellit. Veratrū nigrum purgat ventrem. Detrahit bilē pituitasq., datum per se aut cū scāmonia, & tribus obolis siue drachma salis. Decoquitur cum lente & iusculis, quæ purgationis causa sumptantur. Prodest morbis comitialibus, melancholicis, infantiētibus, articularijs doloribus, & resolutis. Menses inditum trahit. Partus necat. Purgat fistulas impositum, & tertio die detractum. Item contra grauitatem auditus in aurem demittitur, ibiq. in alterum aut etiam tertium diem esse finitur. Scabiem sanat, illitum cum thure, aut cæra & pice & cedrino oleo. Vitiliginibus, lepris, impetiginibus ex aceto medetur. Dentium dolorem collutione mitigat. Erodentibus medicamentis commiscetur. Hydropicorum ventri vtilissime imponitur, factum ex eo, farina hordeacea, & vino, cataplasma. Cōfitum proxime radices vitium, vinum purgandi facultate donat. Huius resparsu domos expiari arbitrantur. Quare inter sodiēdum stantes, Apollinem Esculapiūq. precantur, ac vitant aquilæ volatus. A duolare enim non sine periculo tradunt. Namq. si auis effossionē hellebori conspexerit, moriturū qui succidit augurium est. Celeriter effodiatur oportet. Quoniā odore caput aggrauat. Quapropter ad id arcēdū fossuri, allium præsumere, & vinum bibere consueuerūt. Nulli ita noxæ opportuni redduntur. Veratri albi modo emedulatur.

De Sesamoide magno. CAP. CLIII.

Sesamoides magnum, aliqui Sesamiten, alij Sesamin, alij Lycocytalion, alij Anticyricon appellant, quoniam in anticyra albo veratro in purgationibus misceatur. Simile est senescioni aut rutæ, longo folio, flore candido, radice gracili, ignaua, gustu amaro, cætera sesamæ simile. Ventrem purgat. Datur tritum ad bilis pituitæq. deiectiones, q̄tum tribus digitis capitur, addito veratri albi sesquiobolo ex aqua mulla.

De Sesamoide paruo. CAP. CLIIII.

Sesamoides paruum, aliqui Coronion, alij Sesamon syluestre vocant. Cauliculi ei sunt dodrātales, folia coronopi, minora, hirsutiora, & in cauliculorū cacumine capitula florū pene pureorū, medio eorū albo, semē sesamæ, fuluū, amarū, radix tenuis. De

DE MEDICINALI MATERIA

trahit bilē pituitasq; semen ex aqua mulsā potum dimidio acetabulo.
 Illitum ex aqua tumores ac tubercula discutit. Nascitur in asperis.

De sylvestri Cucumere. CAP. CLV.

yluestrem Cucumin, aliqui Elaterion vocant, alij Grynion,
 alij Balin, alij Syncrisin, alij Bubaliō, alij Scopion, alij Phe-
 rombron, alij Peucedanon, alij Notion, Romani Ancetum,
 alij Agrestē, Pœni Cusimezar. Fructu solo distat a satiyo cucumere,
 longe minorem pariens fructum, oblongis glandibus non dissimilē.
 Folia atq; sarmenta satiui refert, radice cādida, magna. Nascitur in sa-
 buletis, & prope domicilia, frutice in totum amaro. Instillatus folio-
 rum succus, aurium dolori conuenit. Illita ex polenta radix, veterem
 tumorem discutit. Imposita cū resina terebinthina, tubercula rumpit.
 Ischiadicis infunditur. Podagras discutit, decocta ex aceto & illita.
 Eius decocto dētes in dolore colluuntur. Aridæ farina impetiginem,
 lepras & vitiligines absterget. Nigris cicatricibus colorem reddit. Et
 in facie maculas expurgat. Radicis succus sesquiboli pondere, & itē
 cortex acetabuli quarta parte, bilem pituitamq; deiiciunt, præsertim in
 hydropicis. Deiectiones autē citra stomachi iniuriam mouet. Radi-
 cis selibra, præsertim in vini Libyci hemina conteritur, danturq; ex
 eo terni cyathi triduo, dum tumor abunde deprimi cernatur.

De Elaterio. CAP. CLVI.

Fructu huiusce Cucumeris, fit medicamentum quod Elateriū
 vocatur, ad hūc modū. Decerpti cucumeres qui tādī protius
 exiliūt, seruantur nocte vna. Postridie imposito supra
 craterē rariore cribro, vtriusq; manibus præhensū, sigillatim supino cula-
 tro sursum versus aciem habente finduntur, atq; per cribrum humor
 in subiectū vas exprimitur. Simulq; carnosum quod hæsit cribro, quo
 facilius excidat eliditur, quod ita pressum est, residere sinitur, atq; in vi-
 cinam peluim demittitur. Coaceruata autem in cribro segmina, dulci
 aqua perfunduntur, & dēnuo pressa abijciuntur. Humor in pelui agi-
 tatur, & linteo opertus, soli exponitur. Dumq; steterit, tota superna
 tans aqua cum humore concreto, effunditur. Hoc vero identidem fie-
 ri solet, donec existēs aqua lique scat, qua stillarim exhausta sedimentū
 mortario suscipitur, & conterendo cogitur in pastillos. Sunt qui ad
 hauriendam protinus succi abundantiam, cribratos cineres humi in-
 spargant, & medium cauantes, triplicatum linteū obtēdant, per quod
 Elaterium cum sua humiditate diffundunt, siccatumq; in pila vt dictū
 est, conterunt. Aliqui pro dulci aqua marinam perfundentes, ita elu-
 unt. Alij in nouissima lotionē, mulsam aquam respergunt. Elaterium
 optimum esse constat, læue, non ponderosum, cum candore leniter hu-

medum, gustu amarissimum, quodq; lucernarumq; luminibus obie-
ctum, facile flagret. Porraceum tamen scabrumq; si turbidum specta-
tur, atq; erui cinerisq; plenum sit, graue & vitiosum esse solet. Nec de-
sunt qui cucumis succo amyllum immisceant, vt candorem ipsum & læ-
uitatem imitetur. A bimatu ad decennium deiectionibus vtile est. In-
teger modus obolus est, minimus semiobolus, pueris chaici duo. Si-
quidem copiosius, periculum adfert. Bilem ac pituitam alterutra par-
te extrahit. Prima suspensio est purgatio. Quod si in animo sit deie-
ctionem moliri, adiecto salis duplo, & sibi quod colorare sufficiat, ex
aqua erui magnitudine catapotia dato, postea cyathus vnus aquæ tes-
pidæ forbeat. Ad citandas tamen vomitiones aqua diluens elateri-
um, subiectas linguæ partes penitissime pinna oblinito. Quod si quisq;
difficilius euomat, oleo aut vnguento irino resoluito. Somnum inhi-
beto. Porro his qui eximie vacuantur, continue vinum & oleum dari
conuenit. Etenim vomendo restituuntur. Quod si vomitiones non fi-
niantur, aqua frigida, polenta, posca, poma, & quæ stomachum den-
sando corroborant, offerenda sunt. Ciet Elaterium menses. Partus ene-
cat in pello subditum. Morbo regio medetur, cum lacte naribus in-
fuso. Diuturnis capitis doloribus liberat. Efficax anginarum vnguen-
tum est, cum vetere oleo, melle, aut felle taurino.

De Satiuo Cucumere. CAP. CLVII.

f Atiui Cucumeris trita radix, & drachmæ vnus pondere po-
ta in hydromelite, vomitus ciet. Si quis facile secundum cœ-
nam vomere velit, binis obolis sit contentus.

De Staphide agria. CAP. CLVIII.

f Taphida agriam, alij Triphyllon, alij Stefion, alij Astaphi-
da, alij Phthiroctonon, alij Phthirion, alij Apanthropon,
alij Polyides, alij Pseudopathes, alij Arsenoten, Aegyptij
Ibesæden, Romani hærbā pediculariā vocant. Folia habet labruscæ,
diuisa, & sauliculos rectos, molles, nigrosq;. Fert florem glasti, & folli-
culos virides, similes cicerci, & in his nucleum triangulum, scabrum, ex
nigro subfuluescētem, intus album, gustu acrem. Grana quina denave,
si trita in aqua mulla dentur, crassum humorem per vomitum purgāt.
Sed qui hauserunt, ambulare debent. Prudenter tamen attendere opor-
tet, & aquam mullam potui dare. Quoniam pericula strangulationis
inferunt, & fauces adurunt. Trita & ex oleo illita, phthiriali prodest.
Itē prurigini & pforis. Cit plurimam pituitam cominudcata. De-
cocta in aceto, dentium dolori colluto ore subuenit. Rheumatissimum
gingiuarum sistit. Vlcerā oris manantia, cum melle sanat. Vrenibus
malagmatis imponitur.

DE MEDICINALI MATERIA

De Thapfia.

CAP.

CLIX.

t Hapfia aliqui Hypopion vocant, alij Pancranon, alij Scam monion, alij Thelyterin, Romani ferulaginem, alij Ferulam sylueſtrē, Pœni Bæden. Nomē ideo accēpit, quod in thapſo eiufdem nominis inſula, primum inuenta ſit. Tota veronatura ferulæ ſimilis eſt, graciliore caule, folijs fœniculi, vmbella aneti in cacumine a ſingulis furculis erumpente, flore luteo. Semen quale ferulæ, latum, ſed aliquanto minus, radix nigra, intus candida, longa, acris, craſſiore libro veſtita. Lactis extrahendi ratio hæc eſt. Façto in ambitu ſerobe, cortices inciduntur aut radix in fornicis ſpeciem excauata, cooperitur quo merus ſuccus conſuat. Oportet illuc ſequenti die ſe conferre, & cōgeſtum ſuccum extrahere. Tunditur etiam radix in pila, & ſuccus organo per quallum expreſſus, ſicili crasso inſolatur. Aliqui ſolium vna terunt. Sed inualidior huiusmodi ſuccus. Hoc autē intereſt: Quoniā qui ab radice manauit grauius olet, & humidus permanet. E folijs autē extractus exiccatur, atq; teredinum iniuriā ſentit. Qui ſuccum colligit ſtare debet non obuertus vento cū dies apricus eſt & a ſtatu ſilet. Quoniam ob vaporis acrimoniam facies vehemēter intumeſcit, nudaq; corpora inuadunt puſtulæ. Ob id prius liquido carato & ad ſtringente, nudas partes illinunt, & ita muniti accedūt. Tam cortex radice q̄ ſuccus, purgadi vim habent. Laſteus ſuccus in aqua muſſa potus, vtrinq; bilem extrahit. Radicis modus quaterni oboli, cum tribus ſeminis aneti drachmis, ſucci terni oboli, lactis obolus vnus. Quod eo amplius aſſumitur, periculofum eſt. Huiusmodi purgatio conuenit, ſuſpirioſis & diuturnis laterum doloribus, reiectionibuſq;. Datur in cibis aut obſonio, quibus difficile ſit vomere. Tam radix q̄ ſuccus omnium maxime quæ pares cum eis vires adepta ſunt, vim habent tranſconcretiuā, vbi ex imo aliquid euocandum eſt, aut meatuum laxitas alio tranſferenda eſt. Vnde ſuccus illitione, & radix recens aſſrictu, alopecias explēt. Radix ſuccuſq; cum æquis cæræ thuriſq; portionibus, ſuggillata ſuoreſq; tollunt. Sed nō plus binis horis dimittantur. Locus deinde aqua maris calida foueatur. Viria cutis in facie emendat, cum melle illitus. Lepras tollit. Tubercula diſcutit, perunctus cum ſulphure. Succus in diuturnis pulmonum, laterum, pedum, articulorumq; valetudinibus vtiliter illinitur. Valet ad integēdam colis glandem, iſis qui natura nō circūciſione curtiſunt. Tumore enim excitat, qui pinguiū ſotu emolitus, in peneiaſturam reſarcit.

De Spartio.

CAP.

CLX.

f Partion aliqui Lygon, alij Lobon appellant. Frutex eſt longas ferēs virgas, ſine folijs, firmas, fractu contumaces, quibus

vites vinciuntur, semen lenticulæ in folliculis phasiolorum modo nascens, florem vt albæ violæ, luteū. Purgant per superna hellebori vice, citra periculum flores & semina, quinis obolis in aqua mulsa pota. Semen deiectionem mouet. Ramis in aqua maceratis mox tuis extractus succus, ischiadicis & angina laborantibus auxiliatur, si cyathi modum ieiuni bibāt. Quidam marina aqua macerare malunt, & infunde re ischiadicis, glystere. Strigmenta autē elicit cruenta.

De Silybo.

CAP.

CLXI.

Ilybum lata spina est, folia ferēs Chamæleonis albi. Hæc recens cū sale oleoq; cocta estur. Radicis succus drachmæ pōdere potus vomitiones ciet.

De Vomitorio bulbo.

CAP.

CLXII.

Vlbis, quem vomitorium vocant, folia habet lētiora & multo longiora cibario bulbo, radicem confimilem cortice nigro vestitam. Vomitiones concitat, si per se comedatur, aut eius decoctum ebibatur.

De vnguentaria Glande.

CAP.

CLXIII.

Lans vnguentaria, fructus est arboris myricæ similis, magnitudine auellanæ nucis, cuius nucleus græcarum nucum more tritus, humorem reddit, quo ad preciosa vnguenta pro oleo vtuntur. Nascitur in Aethiopia, Aegypto, Arabia & Petra oppido Iudææ. Præfertur plena, recens, candida, quæ facile delibretur. Ea drachmæ pōdere pota lienē absūmit. Cū erui farina & aqua mulsa podagricis illinitur. Pforas leprasq; decocta in aceto, vitilignes & nigras cicatrices cum nitro emendat. Et cum loto lentigines, varos & papulas in facie, & cutis vitia tollit. Vomitiones mouet. Aluum cū hydro melite resoluit. Stomacho aduersatur. Oleum quod ea exprimitur, aluum potu ciet. Cortex eius magis adstringit. Verum tusæ & expressæ cremētum abstergentibus medicamentis adiicitur, quæ aduersus pruriginēs, & scabrias, idonea sunt.

De Narcisso.

CAP.

CLXIII.

Arcissum, aliqui Narcisson Anydron, alij Autogenes, alij Bulbon emeticon, alij Lirion, Romani Bulbum morbitariū Sūt et qui vt Lilium, lirium appellarint. Folia porro similia, tenuia, multo minora, & angustiora, caulis vacuus & sine folijs supra dodrantem attollitur. Flos albus in medio, intus croceus, in quibusdā purpureus, radix intus alba, rotunda, bulbosa, semen velut in tunica, nigrum, longum. Probatissimum nascitur in montibus, suauī odore. Cætera porrum imitatur, atq; hærbaceum virus olet. Radix cocta siue estur siue bibitur, vomitoria est. Ambustis igni prodest cū exiguo

DE MEDICINALI MATERIA

melle trita. Præcisos nervos illitu glutinat. Luxatis maleolis diuturnisq; articulorum doloribus, trita ex melle & imposita subuenit. Vitiæ cutis in facie, vitiliginesq; cum semine vrticæ & aceto emaculat. Cum eruo & melle vlcera sordes expurgat. Abscessus rumpit concoctione repugnantes. Infixa corpori extrahit, illita cum lolij farina & melle.

De Hippophae. CAP. CLXV.

hippophæes, alij Hippophyes, alij Hippophæes, alij Hippion, alij Echinion, alij Pelecinon, Romani Leapaginæ vocant, quos fulones vestes interpolant. In sabulosis maritimisq; nascitur, surculaceo frutice, dēso & largo, folijs oleæ, lōgioribus mollioribusq; inter quæ candicantes spinæ emicant, siccæ, angulosæ, interstitio quodam distantes. Flores hederæ corymbis similes, racematim coherent, minusculi tamen, & molles, cādidi, ex parte rubescētes. Radix lacteo succo madet, crassa, mollis, amara gustati, ex qua perinde ac thapsia succus eximitur, qui cum erui farina subactus siccatur, & ad vsum reconditur. Pituitas bilemq; detrahit oboli pondere cū mulso & quatuor obolis erui farinæ. Frutex cum radicibus siccatus tunditur, & cū aquæ mulsæ dimidia hemina tritus datur. Radice liquamentum depromitur, vti in thapsia. Huius in purgationibus modus est drachma.

De Hippophæsto. CAP. CLXVI.

hippophæston id quod aliqui Hippophaes appellant, nascitur eisdem locis quibus hippophaes, estq; spinæ fulloniæ genus, humilis hærba, sine cauliculo, sine flore, inanibus tātum capitulis, folijs parvis, spinosis, radículas habens albas, molles, crassas. Succus radice & folijs exprimitur, & exiccatur. Datus cui voles tribus obolis in aqua mulsa, aquā pituitasq; detrahit. Priuatim comitialibus morbis, nervorum vitijs, & orthopnoeæ convenit huiusce modi purgatio.

De Ricino. CAP. GLXVII.

Ici aut Croton aliqui Sefamon sylvestre vocant, alij Sefeli Cyprian, alij Crotona. Aegyptij Sistanma, aliqui Trixin. Magi Sanguinem febris, Latini Ricinum, alij Lupam. Id nomen accepit, a ricini animalis similitudine. Arbor provenit parvæ fuscæ altitudine, folio platani, maiore, læviore & nigriore, ramis caudicibusq; cavis in arundinis morem. Semine in vuīs asperis, quod corticibus exutum, Ricinum animal representat, ex quo oleum nomine cicinum exprimitur, cibis sœdum, lucernis emplastrisq; vtile. Grana triginta numero purgata, potu pituitas bilem aquamq; per aluum extrahunt. Vomitiones movet. Sed iniucunda admodum est, & molesta purga-

tio. Siquidem stomachum vehementer subuertit. Tusa & imposita, vitia cutis in facie, varosq; expurgat. Folia cum polenta trita inflammationes oculorum tumoresq; leniunt. Turgentes mammas cohibent. Eadem ex aceto illita, ignes sacros restingunt.

De Tithymalorum generibus. CAP. CLXVIII.

Tithymali genera septē, quorum masculus characias appellatur, ab aliquibus cometes, aut amygdaloides, vel cobios. Alter Myrthites qui fœmina existimatur, eumq; Myrthinē aut Caryitē vocant. Tertius paralius, quē Tithymalida appellant. Alius Helioscopius. Quintus Cyparyssias. Sextus Dendrodes. Septimus Platyphyllos dicitur.

De Characia appellato. CAP. CLXIX.

Characiæ caules supra cubiti altitudinem attolluntur, rubri. Lacteo succo atq; acri madent. Folijs oleæ circum ramos, angustioribus & longioribus, radice dura, lignosa. Pendet in cacuminibus caulium coma iunci, & calyculati folliculi, aliquantum caui. In quibus semen continetur. Nascitur in asperis & montibus. Succus aluū purgat. Trahit pituitam bilemq; binis obolis in posca sumptis: Et cum aqua mulsā vomitiones mouet. Appetente vindemiārū tempore, succus congestis ramulis, mox decisis, & vase reclusis, excipitur. Aliqui adijciunt farinam erui & in pastillos digerunt, qui erui magnitudinem impleant. Alij in aridas ficos ternas quaternasve guttas instillant, vt cum his inarescant. Quas ad vsus recōdunt. Per se etiam tufus in pila, & in pastillos coactus reponitur. Porro cū extrahitur lac neq; quo ventus aspiret, stare quemq; neq; manus oculis ad mouere cōuenit, sed ate eius collectionem, corpus, præsertim faciem, collum scrotumq; genitalis, adipe aut oleo cū vino perungere. Fauces autē exasperat. Quapropter catapotia cæra aut decocto melle, oblini par est, & hoc modo dari. Binas tamen ternasve ficos, purgationis gratia iumphisse, satis est. Recens lac ex oleo, perūctos in sole capillos euehit. Res nascentesq; flauos & exiles efficit. Deniq; omnes destruit. Dentium cauernis inclusum, leuat dolores. Sed cæra dentes oblinendi, ne suo deiepsu, fauces & linguam vitiet. Tollit illitu impetigines, formicantes verrucas, penfiles, & quæ thymi florem repræsentāt. Valet aduersus prexygia, carbūculos, phagedænas vlcera, gangrænas, fistulasq;. Legitur semē autumnō, et ficcatum sole leuiter tunditur, seruatumq; loco mundo reponitur. Folia item ficcantur. Semen et folia lactei succi effectum præbent, dimidio acetabulo pota. Sunt qui condiant ad misto cum lacte lepidio, & caseo confuso. Radix drachmæ pōdere in hydro melite pota, per inferna trahit. Decocta cum aceto, dentium dolori au-

DE MEDICINALI MATERIA

xiliatur, colluto ore.

De Fœmina.

CAP.

CLXX.

Oemina quam Myrsinē, aut Caryitē vocarunt, similis f suapte natura Daphnoidi. Folijs myrti, sed maioribus, in cacumine acutis, & pungētibus. Ramulos ab radice mittit dorantales. Fructum fert post annum nuci similem, mordaci gustu. Nascitur in asperis. Succus, radix, semen, folia, confimilem antedicto forniuntur facultatem. Sed ad citandas vomitiones inualidior est.

De Paralio.

CAP.

CLXXI.

Liud tithymali genus dicitur paralios, quem Tithymalida, a aut Mechona aliqui appellauere. Nascitur in maritimis, ramis rubentibus, palmum altis, quinīs senisve a radice exeuntibus, folijs lini, angustis, paruis, oblongis, in versus quosdam digestis, capite in cacumine orbiculato. In quo semen ut eruum, vario colore emicat. Flos albus. Frutex totus cum radice lacteo succo turget. Similes ad vsus reconditur.

De Helioscopo.

CAP.

CLXXII.

Liud genus Helioscopus dicitur, folijs portulacæ, rotundioribus, ramulis prodeuntibus a radice, quattuor aut quinque, rubentibus, dodrantali altitudine, tenuibus, lactis copiosi plenis, capite aneti, semine in capitulis incluso. Helioscopi nomen accipit, quoniā comas cum sole circumagat. Circa oppida nascitur, potissimum in rudibus. Colligitur succus semenque ut aliorum. Eadem quæ superioribus vires, non tamen usque adeo validæ.

De Cyparissia.

CAP.

CLXXIII.

Cyparissias in caulem exit dodrantalem, vel maiorem, subrubrum, ex quo folia piceæ similitudine exoriuntur, molliora tamen, & tenuiora. Et in totum nascentem piceam æmulator. Vnde nomen traxit. Candido succo madet. Cui eadem vis quæ superioribus.

De Petræo Tithymalo.

CAP.

CLXXIII.

Enus Tithymali in petris nascens, Dendroides cognominant, in cacumine largam spargens comam, succo lacteo prægnans, cauliculis rubentibus, folijs myrti tenuioris, fructu & characiæ. Eiusdem effectus cuius superiores, simili modo reconditur.

De Platyphyllo.

CAP.

CLXXV.

Platyphyllos verbasco similis est. Radix, succus & folia, per inferna trahunt aquas. Pisces necat, tulus & aquæ inspersus. Reliqua Tithymalorum genera quæ supra scribuntur, eadem

efficiunt.

De Pityusa.

CAP. CLXXVI.

Ityusam aliqui Clema, alij Crambion, alij Paralion, alij Canopicon vocant. Hanc specie a Cyparissia differre constat, et si
 p tithymalorū generi assignetur. Caulis supra cubiti altitudinem assurgit, geniculatus, folijs piceæ, acutis, exilibus, flore paruo, purpureo, semine instar lenticulæ, lato, radice crassa, candida, succo referta. Quibusdam in locis frutex hic prægrandis inuenitur. Detrahit per aluum radix, drachmis duabus data in aqua mulsæ. Item seminis drachma. Succum cum farina subacti cochlearium, in catapotio datur. Modus foliorum drachmæ tres.

De Lathyri.

CAP. CLXXVII.

Athyris quam aliqui Tithymalum appellant, eamq; Tithymalorū numero adscribunt, caulem emittit cubiti altitudine, & digitali crassitudine, inanē. Gignūtur in cacumine alæ & folia in caule oblōga, amygdalinis proxima, latiora, & læuiora. Quæ autem in summis ramulis exierunt, minora conspiciūtur, aristolochiæ aut oblongæ hederæ figura. In cacumine fructum summis surculis gerit, triplici conceptaculo insignē, rotundum, ceu capparin, in quo grana intercursantibus membranis distincta continentur, eruis maiora, rotunda, quæ dū corticibus exuuntur, candida sunt, & gustu dulcia. Nullus radice vsus. Totus frutex lacteo succo turget, vti Tithymalus. Grana sex aut septem in catapotio, aut cum ficis aut palmulis deuorata, aluum purgant. Sed aqua frigida postea sorbenda. Trahunt autem bilem, pituitam & aquas, Succus Tithymali modo exceptus, eundem effectum præbet. In gallinaceo iure aut oleribus folia decoquūtur ad eisdem effectus.

De Pello.

CAP. CLXXIX.

Eplos quem aliqui Sycen, alij Mecona Aphrodem vocant, frutex est lactei succi plenus, folijs rutæ, paulo latioribus, rotunda coma, dodrantali, humi resperfa, semine sub folijs rotundo, minore q̃ candidi papaueris. Pluribus scatet auxilijs. Vnicam radicem habet, superuacuum, ex qua fruticat. Nascitur inter vires, & in hortis. Colligitur messibus. Siccatur in vmbra & continue versatur. Fructus tusus & feruesctus reconditur. Bilis ac pituita detrahitur, acetabulo eius in hydromelitis cyatho poto. Obsonijs insperfa conturbat aluum. Muria conditur.

De Peplide.

CAP. CLXXX.

Eplis quam aliqui syluestrem portulacam vocant, Hippocrates Peplion, in maritimis nascitur, largo frutice, candidi
 p

DE MEDICINALI MATERIA

succi pleno, folijs satiuæ portulacæ, rotundis, inferne rubentibus, semine sub folijs rotundo, vti in peplo, feruente gustu, radice singulari, superuacua, tenui. Colligi & reponi solet. Datur vti peplos & conditur. Eisdem habet vires.

De Chamæfyce. CAP. CLXXXI.

Hamæfycen aliqui Syoen, alij spumofum papauer vocitant.
 c Ramos emittit quaternum digitorū, teretes, succosos, in terram deiectos, folia lentis, parua, peplum plane referentia, tenuia, quæ a terra non attolluntur, semine sub folijs rotundo, vti in peplo. Neq; caulem neq; florem promit. Radice firmatur tenui, superuacua. Rami ex vino triti vuluæ dolores sedant, in pecto apposti. Tollerunt tumores, ac verrucas omnium generum illiti. Decoctorum cibo, alius resoluitur. Succus simili effectu prodest. Illitus contra scorpionis ictum auxiliatur. Aduersus caligines oculorum utilis, & hebetudines, incipientes suffusiones, nubeculas, cicatrices, cum melle inunctus. In squallidis petrosifq; nascitur.

De Scammonia. CAP. CLXXXII.

Cammonia aliquibus Scambonia radix, alijs Colophonia, alijs Dactylion, Romanis Colophoniu, Magis Apopleumonos, Aegyptijs Sanilum dicitur. Ramos ab vna radice emittit trium cubitorum, multos, pingues, & qui non nihil crassitudinis præferant, folijs Helxinæ, aut hederaceis, mollioribus tamen, densis, & triangulis, flore candido, rotundo, in calathi modum cauo, graueolente, radice prælonga, crassitudine cubitali, candida, graui odore, succo grauida. Legitur ad hunc modum succus. Capite exempto, radix in testudinis speciem cultro excauatur, quo fit vt in cauum confluat succus, qui conchis demum excipitur. Alij scrobes in terra cōcamerato sinu fodiunt, in quos subiectis iugladium folijs, profundunt succum, siccatumq; extrahunt. Laudatur autem scammonium læue, nitidum, rarum, & colore q̄ simillimum taurino glutini, fungosum, tenuibus fistulis, quale ex Mysia regione Asiæ cōtermina deportatur. Nec attendere solum par est, si linguæ tactu albescat. Hoc enim euenit adulterato, quod admissio fit Tithymali lacte. Sed longe magis antea narratis. Item si non vehementer linguam exurat. Id quod misti Tithymali argumētum est. Natione autem Syriacū, & Iudaicum deterrima habetur, grauiora, densa, erui farina & Tithymalo vitata. Succus drachmæ vnus aut quaternum obolorum pōdere haustus, ex aqua pura vel mulsa, per inferna bilem & pituitam extrahit. Ad resolvendam aluum binos obolos cum sesama, aliove semine, sumpsisse satis est. Dantur efficacioris purgationis causa, succi quaterni oboli cum duobus veratri

nigri, & aloes drachma vna. Fiunt purgatorij sales drachmis viginti fucci scammonia, in senos salis cyathos adiectis. Horum modus proportionis virium. Integer quidem tria cochlearia, medius duo, minimus vnum. Radicis drachma vna aut altera purgat, cum ijs quæ res tulimus. Nonnulli decoctum radicis ebibunt. Coquitur in aceto & cum hordeacea farina teritur, cataplasmate ischia dicis vtili. Partus enecat, succos vuluæ in lana subditus. Tubercula discutit cum melle aut oleo illitus. Decocto in aceto peruncta lepræ abiguntur. Diuturni capitis dolores ex aceto & rosaceo perfunduntur.

De Chamelæa.

CAP. CLXXXII.

c Hamelæam aliqui Pyros agnen, alij Heracleon, alij Bdelyram, alij Coccon gnidion, Romani Citocacium, nonnulli oleaginem, quidam Oleastellum vocant. Surculosa fruticat, ramis dodrantalibus. Folia oleæ similitudinē habent, tenuiora & amara, quæ gustata linguam mordent, & arteriam deradunt. Detrahit pituitam bilemque, folijs præsertim in catapotio deuoratis. Namque duæ absinthij partes, adiecta chamelææ vna, hydromelite excipiuntur, & in catapotia coguntur. Ea autem in ventre non liquefunt. Siquidem quotquot fuere deuorata, regeruntur. Folijs cum melle tritis sordida vlcera & crustosa repurgantur.

De Thymelæa.

CAP. CLXXXIII.

t Hymelæam alij Ghamelæam, alij Pyros agnen, alij Cestron aut Cneoron vocant. Ex qua granum gnidium, quod est thymelææ fructus, colligitur. Hoc Syri Apolinum, alij linū appellant. Quoniam satui lini frutex suapte natura similitudinem refert. Virgas ædit perpulchras, tenues, tripedaneas, folijs chamelææ, angustioribus, & pinguioribus, viscosis, gummosisque si mordeantur, flore candido, fructu myrti in modum totūdo, qui inter initia virescit, & tandem rubescit, pulpa fructus dura, foris nigra, intus alba, quæ per inferna bilem, pituitā, aquasque detrahit, si viginti granorū pars interna bibatur. Verū fauces adurit. Itaque cum farina aut polenta, aut in vix acido dari debet, aut melle cocto obducta deuorari. Qui ægre desudant, trito semine cum nitro et aceto, inunguntur. Folia quæ peculiariter gneorum appellantur, per messes colligi debent, & ficcata in vmbra recondi. Quibus dare libeat, antea tundere, & nervos eximere cōuenit. Illitū acetabuli modo cum diluta portione, aquā extrahit. Mediocris purgat. addita lēte cocta, aut cōtritis oleribus. Thymelææ farina vix acerbæ

DE MEDICINALI MATERIA

succo excipitur, & in pastillos diuiditur. Hærbæ stomacho infesta. Pærus imposita necat. Nascitur in mōtibz & asperis. Halucinatur qui coccon gnidium fructū esse chamelææ existimāt. Falluntur enim quædam foliorum similitudine.

De Sabuco

CAP. CLXXXIIII

Cten aliqui Dendron arctu, alij Hemeron, Latini Sabucū, Galli Scobiem, Daci Sebam vocant. Ex eo genere quædam in arborem assurgit, surculos spargens arundinaeos, teretes, cauos, candicantes, proceros. Folia inglādis, terna quaternave, ex interuallis circa ramos exeūt, grauiā odore, minutim in ambitu secta, & in ramulorum cacuminibus cauliculisq; circinata vmbellæ, quæ florē candidam pariunt, mox fructum terebintho similem, in nigredine suppurpureum, acinosum, succo madentem, vinosumq;.

De Ebulō

CAP. CLXXXV.

Lterum genus chamæactæ vocatur, alijs Heliofactæ, alijs Agria actæ, alijs Euboica, Romanis Ebulum, Gallis Ducosne, Dacis Oliua. Ebulum longe humilior est, magisq; hærbaceo generi assignandum, caule quadrangulo, geniculato, folijs amygdalæ, ex interuallo longioribus, geniculatim distributis in versus, graueolentibus, in ambitu serratis, muscario sabuci, flore & acino eiusdem. Radice nititur longa, crassitudine digitali. Eadem vtriusq; vis & vsus, refrigerans, & exiccans, aluo detrahens aquā, stomacho inutilis. Folia, olerum more coquuntur ad pituitam bilemque detrahendam. Cauli teneri in patinis cocti, eadem efficiunt. Radix in vino decocta & in cibis data hydropicos adiuuat. Prodest viperarum moribus, eodē pota modo. Vulvas emollit infidentium, decocto. Laxat earum spiracula, & vitia corrigit. Acini in vino poti eodem fungūtur munere. Denigrant capillos illiti. Folia si prætenera ac mollia ex polenta illinantur, inflammationē mitigant. Ambustis & canis moribus illitu profunt. Vlcera quæ dehiscunt in fistulam agglutinant. Ijs qui podagra tētantur, cum seuo hircino profunt illita folia.

De Pygnochomo

CAP. CLXXXVI.

Pygnochomon constat erucae folijs, acrioribus, scabris, & crassius, caule quadrangulo, flore ocimi, semine marrubij, radice nigra, rotunda, lutei coloris, exigui mali figura, terram redo lente. Inuenitur in saxosis locis. Semē grauiā somnia et tumultuosa facit, drachmæ instar potum. Tumores discutit, illitum cum polēta. Spicula adactosque corpori aculeos extrahit. Folia illitu tubercula panosque discutunt. Radix eius in aqua mullā duum drachmarum pondere, aluum et bilem extrahit.

LIBER QVARTVS.

114

De Apio ceu radice syluestri. CAP. CLXXXVII.

Pion nonnulli ischiada, alij Camæbalanagriam, alij Lianozostin, Latini Radicem syluestrem, Pœni Thorphathfadæ appellant. Iuncos duos siue tres spargit, rubros, tenues.

Quia terra parum attolluntur. Folijs rutæ, oblongioribus tamen, & angustioribus, hærbaceis, semine paruo, radice hastulæ regię, in formâ pyri turbinatæ, succi fœcûda. Intus habet succum candidum. Extra, cortices nigros. Superior pars eius vomitione bilem pituitasq; extrahit. Inferior per aluum. Tota vtrinque purgationes mouet. Succum si libet eximere, tusa radix i fidiili mergitur, & agitata aqua quod supernat pinna selectum, exiccatur. Purgat vtraque parte is succus selquiobolo potus.

De Colocynthide. CAP. CLXXXVIII.

Olocynthis aliquibus Colocyntha ægos, alijs Sicya picra, alijs alexâdrina Colocyntha, Zoroastri tymbra, Ostani autogenes, Romanis Cucurbita syluatica, Dacis Tustrata dicitur.

Sarmeta foliaq; satiuæ cucurbitæ emittit, per terrâ repentia, diuifra, fructû in speciem mediocris pilæ conglomeratum, vehementer amarum, quem legere oportet, cum cœperit in luteum colorem permutari. Medulla fructus purgatoriam vim habet, si quattuor oboli melle cocto myrrha & nitro excipiantur, & cogatur in catapotium. Arefactæ pilæ teruntur, & infusæ clysteribus prosunt, neruorum resolutioni, coxendicum doloribus, & coli vitijs, vt quæ bilem, pituitam & strigmēta, interdum etiā cruorem eliciant. Fœtus ad motū enecant. Dentium dolorem tollunt, si vna repurgetur & luto oblita cū aceto & nitro infervescat, hoc q; iure decocti dētes colluantur. Si aqua mulsa aut passum incoquatur & sub diuo refrigescat, potu crassum humorem & strigmēta alui detrahet. Stomacho supramodum aduersatur. Subdita ex ea balano, alui excrementa eijciuntur. Virenti succo vtilissime ischia dīci perfricantur.

De Epithymo. CAP. CLXXXIX.

Pithymum Romani inuolucrum vocant. Flos est e thymo

durio, re, satureiæ similis. Capitula habet tenuia & leuia & in eis fibras, quasi capillamenta. Potum cum melle detrahit pituitam bilemque atram per inferna. Priuatim prodest melancholicis, & inflatis, acetabuli mensura, ad quattuor drachmas, cum melle sale & aceti exiguo. Plurimum in Cappadocia & Pamphylia gignitur.

De Alypo.

CAP. CXC.

Lypon furculosa hærbæ est, subrubra, latis ramulis, tenuibus folijs, flore molli, copioso, radice betæ, tenui, resecta acrisucco, semine epithymi. Gignitur in maritimis. Hæc pleraque

DE MEDICINALI MATERIA

byæ loca scatent. Semen atram bilem deiicit, si mensura epithymo pari cum sale & aceto sumatur. Verum interanea leniter exulcerat.

De Empetro seu calcifraga. CAP. CXCI.

Empetrum aliqui Phacoides vocant, Nascitur in montibus & maritimis, salso gustu. Sed quo propius terreno fuerit, amarior sentitur. Trahit bilem, pituitam, & aquam, si bibatur in iure aliquo aut hydromelite.

De Clematide. CAP. CXCII.

Clematide aliqui Epigeton, Aegyptij Philacuon, Romani Ambuxum nominant. Viticulis constat subrubris, folio vehementer acri gustu, & exulcerante. Vicinis inuoluitur arboribus ut smilax. Tritum semen et ex aqua aut hydromelite potum bilem pituitamque detrahit. Illira folia lepras eximunt. Cum lepidio conditur ad esum.

De Labrusca. CAP. CXCIII.

Labrusca sarmenta vitis modo prælonga emittit, aspera, lignosa, rimoso cortice, folijs hortensij solani, longioribus ac latioribus, muscoso flore, & capillaceo, fructu exquisitis vuis simili, post maturitatem rubente. Rotunda est acinorum facies. Feruifasta radix in aqua, & in cyathis duobus vini aqua marina diluti, pota humorem alui ciet. Ideo hydropicis datur. Vuae eius vitia cutis in facie & maculas omneis expurgant. Enascentes ramuli cibi gratia conduntur.

De Vite alba. CAP. CXCIIV.

Item albam aliqui Bryoniam, alij Ophiothaphylon, alij Chelidonium, aut Melothron, aut Philothron, aut Archezostin, aut Agrostin, aut Cedrostin appellant. Folijs sarmentis pampinisque satiuam vitem imitatur, sed hirsutiora sunt omnia. Ea quos prope nata sit frutices, suis clauiculis complectitur. Fructus rubens in vua dependet, quo coria pilis spoliatur. Ex ea asparagi qui prima germinatione exeunt, decocti in cibo, alui et urinam ciet. Folia, fructus, radix, acre vim sortiuntur. Itaque ulcerum phagedænis, gangrænis, chironiis, putrentium tibiærum tedio, efficaciter ex sale illinuntur. Radix corpus abstergit, & cutem erugat. Vitia cutis in facie, varosque, lentiginis, & cicatrices nigras emendat, cum eruo, creta chia, & sœno græco. Eodem effectui prodest decocta in oleo, vsquedum liquecat. Sugillata tollit. Reduias committit. Inflammationes discutit illo

lita ex vino: Suppurationes rumpit. Medicamento apte immisceatur, quod carnem exest. Infraſta oſſa extrahit, trita & impoſita. Datur comitialibus in potu, drachmæ pondere cotidie anno toto: Prodeſt attonitis & vertigine laborantibus, conſimiliter aſſumpta. Contra viperarum iſtus pota drachmis duabus auxiliatur. Partus necat. Mentem interdū ſubturbat. Cit vrinā pota. Eclegma ex ea fit cum melle, difficiēſpirantibus, ſtrangulatu oppreſſis, tuſſiētibus, vullis, ruptis, & laterā doloribus. Lienem ternis obolis pota ex aceto triginta diebus conſumit. Illinitur ad eadem cum ſico. Ad muliebres inceſſus decoquitur. Siquidem vulvas purgat, ſed abortum facit. Succus e radice vere exprimitur, qui trahit pituitam cū aqua mulſa potus. Ad pſoras & lepras, ſemen efficaciter illinitur. Lactis abundantia facit ſucus eius, ſi cum tritico decocto ſorbeatur.

De Vitenigra

CAP. CXCIV.

Igra vitis quam aliqui nigram bryoniam vocant, alij Chironion ampelon, alij Bucranion, Romani oblameniam, alij Britanutem, alij Berisſſſcam, Daci Priadelā, alij Pegrimam, Aphri Lauothen: Folia fert hederæ, ſed maiora, ſimilaceis proxima, caules etiam cognatos. Capreolis ſuis arbores quaſi adminicula comprehendit. Fruſtus racematim cohæret, qui inter principia virent, et poſt maturitatem nigreſcūt. Radix foris nigra intus buxco colore nitet. Caules qui primo germinum partu erūpunt, in olera recipiuntur. Menſes pellunt. Vrinās cient. Lienem abſumunt. Vertiginofis, comitialibus, neruorum reſolutione tētatis, proſunt. Radix eadem quæ vitis alba præſtat, ſed inefficacius. Folia cum vino exulceratis iumentorum ceruicibus commodiſſime illinuntur. Luxatis itidem impoſuntur.

De Filice

CAP. CXCVI.

Terin Græcorū alij Pterineon, alij Dacidonon, alij Anaſphoron, alij Blechnon, alij Polyrhizon, vocāt. Magi Heramubain, Romani Filicā, alij Laculē, alij Filifanariam, Aegyptij Aſini ſanguinem. Folia ſine caule, ſine fruſtu, ſine flore, ex vno pediculo, cubitali longitudine exeunt, multiſida & lateribus pinata, ſubgrauī odore, radice per ſumma cepitum nigra, oblonga multis capillamentis fibrata, ſubadſtringente gultu. Naſcitur in montibus & ſaxoſis. Radix latas tineas excutit, ſumpta drachmis quattuor ex aqua mulſa. Melius ſi cum ſcamionæ aut veratri nigri totidem obolis detur. Sed qui ſumunt, alia præguſtare debent.

DE MEDICINALI MATERIA

Laborantes lienis incremento recreat. Radix & potu & illitu prodest
ijs qui arundinibus cæsi sunt. Probatum maxime quæ in arundineris
proueniat & locis pulegio scatentibus.

De Filice fœmina. CAP. CXCVII.

66. Helypteris
Helypterin aliqui Nymphæam pterin nominant, Romani
t Linguam ceruinam, folijs filicis, furculosis & quæ nō singula
ri vt illa pediculo fulciantur, radicibus longis, pluribus la-
tis, quæ ex nigro in luteum flauescunt. Aliquæ etiamnum rubræ inue-
niuntur. Pellunt lata interaneorum animalia, cum melle eclegmate
sumpto. Potæ cum vino drachmis tribus teretes tineas eiiciunt. Datæ
fœminis sterilitatem faciunt, & prægnantibus abortum, si supergre-
diatur. Farina humidis vlceribus & cicatrici repugnātib⁹ ispargitur.
Iumentorū ceruicibus medetur. Folia recentia in oleribus cocta mā-
duntur vt ventrem emolliant.

De Filicula. CAP. CXCVIII.

67. Filicula
p Olypodion aliqui Scolopendrium, alij Pterin, alij Polyrhiz-
on, Latini filiculam vocant. Nascitur in muscosis petris, &
vetustis arborū caudicibus, præsertim quærcuum, palmi alti-
tudine, filici similis, subhirsuta nō tenui peride diuisura. Radix pilosa,
in qua continentur cirri, ceu poliporum, crassitudine digiti minimi, co-
loris intus hærbacei, austera aliquantum, & gustu subdulcis. Purgandi-
vim habet. Coquitur cum gallina aut piscibus, aut beta, aut malua, ad
aluum soluendam. Aridæ farina aquæ mullæ insparsa, detrahitis bilem
& pituitam. Trita luxatis efficaciter illinitur, & aduersus digitorum
fissuras.

De Dryopteri CAP. CXCIX.

d Ryopterin aliqui Pterion, alij Nymphæam pterin nomi-
nant. Nascitur in veterum roborum musco, filici similis, mul-
to minore foliorum incisura, radicibus inuicem implexis, hirsu-
tis, gustu acerbis, in dulcedinem vergentibus. Ptilotrum est cum ra-
dicibus trita. Illinitur enim primum vsq; dum sudorem euocet, mox
sudor abluitor, & recens imponitur.

De Cnico. CAP. CC.

68. Cnicus
c Nicus folijs cōstat oblōgis, asperis, spinosis, caule sesquipeda-
li, capitulo magnitudine grādis oliuæ, flore croci, semine cādi-
do, alioqui ruffo, lōgo angulo, so. Huius flore in obsonijs vtū

tur. Seminis tui succus adiectis amygdalis, nitro, aneto, & melle decoctio, cogitur in placentulas quæ aluum emolliunt. Hæc in frusta quattuor finduntur, quæ nucis iuglandis magnitudinem impleant. E quibus ante cœnam duo vel tria sumpsisse satis est. Ratio temperandi hæc est. Cnici cãdidi sextarius, amygdalorum tostorum & delibatorum cyathi tres, anethi sextarius vnus, aphronitri drachma vna, cum carnibus triginta caricarũ. Seminis succus lac cogit, & magis ipsam resoluendæ alai facultate donat.

De Mercuriali.

CAP.

CCI.

Inozoslin marẽ, e Græcis aliqui Parthenion, alij Argyron, alij Aritrillin, alij Chrysitin, Aegyptij Aphlopho, aliqui Hermu botanion, Latini Mercuriale masculã, alij Tesseculata. Aphri Asumes vocant. Folijs constat ocimi, minoribus, Helixina cognatis, ramulis duplici geniculorũ nodo cinctis, alarum cauis multis, fructu in fœmina copioso, quandam racemorum speciem præbente, mari e foliorum sinu dependente, paruo, rotũdo, ceu binis testiculis vna cohærētibus. Frutice dodrãtali aut maiore. Vtraq; in oleribus manditur, ad aluum ciendam. Cocta in aqua, epoto iure, bilem aquamq; detrahit. Constat vt mares gignantur, hunc facere, vt fœminæ illam, si a purgatione bibantur, & tria folia genitalibus admoventur.

De Cynocrambæ.

CAP.

CCII.

Cynia aut Cynocrãbe, aliquibus Linozostis, Aphris Armas, alijs Asumessabon dicitur. Cauliculum binum palmorum altitudine emittit, mollem, subalbidum, folia mercuriali aut hederæ similia, certis interstitijs subalbida. Semen folijs adhæret, paruum, rotundum. Folia cum caulibus pota aluum cient. Oleribus commendantur. Ius decocti & pituitam & bilẽ aquamq; detrahit.

De Heliotropio magno.

CAP.

CCIII.

Heliotropium magnum aliqui Scorpiuron vocant, alij Heliotropon, alij Dialion, alij Heliopon, alij Scorpioctonon, alij Sesamon agrion, alij Scorpij vrã. Flos ei est effigie scorpionis caudæ. Vnde scorpuiro ei nomen. Et quoniam folia cum sole circumagat, Heliotropion dicitur. Folia ocimi habet, hirsutiora & candidiora, & maiora. Ramuli a radice terni, quaterni, aut sæpe quini exiliunt, multis alis cõcaui, flos in cacumine cãdidus, aut subfuluus. Incuruatur vt scorpionis cauda. Radix tenuis est & inutilis. Nascitur in

DE MEDICINALI MATERIA

Admir
asperis. Decocta ex aqua fasciculo manus plena, pituita bilis per aluū
extrahit. Contra scorpionū ictus & potu & illitu prodest. Ad alliga-
tur vt conceptum adiuuet. Aiunt per horam vnā ante accessiones,
seminis grana quattuor, quartanas finire, tria vero, tertianas. Illitum
semen formicantes verrucas pensileq; & thymi florem representan-
tes, et epynchidas exiccat. Folia, infantū destillationibus quas syria-
seis vocāt, podagris, luxatisq; vtilissime illinuntur. Mēsus cient. Pa-
rus trita & imposita pellunt.

De Heliotropio paruo. CAP. CCIIII.

Scorpius qui in palustribus iuxta lacus, folijs antedicto proximis, rotundioribus, semine acrochordonum verrucarū modo, pen- fili, rotundo. Hærbā cum suo semine pota, adiecto nitro, hyssopo, na- sturtio & aqua, latas tineas teretesq; excutit. Pensilles verrucas quæ acrochordones vocantur, cum sale illita tollit.
h scitur in palustribus iuxta lacus, folijs antedicto proximis,
rotundioribus, semine acrochordonum verrucarū modo, pen
fili, rotundo. Hærbā cum suo semine pota, adiecto nitro, hyssopo, na
sturtio & aqua, latas tineas teretesq; excutit. Pensilles verrucas quæ
acrochordones vocantur, cum sale illita tollit.

De Scorpioide. CAP. CCV.

f Corpioides hærbula est, folijs exiguis, semine caudæ scor-
pionis effigie. Illita scorpionum ictibus præsentaneo est au-
xilium.

Pedacij Dioscoridis Anazarbei de me-
dicinali materia Libri Quarti,
Ioanne Ruellio Sueffio-
nenfi interprete,

F I N I S

LIBER QVINTVS. 117
 PEDACHI DIOSCORIDIS ANAZAR-
 BEI DE MATERIA MEDICINA
 LI LIBER QVINTVS, IOAN
 NERVELLIO SVESSIO,
 NENSI NITER.
 PRETE.

Vperioribus quattuor libris amicissime
 Ari, tradidimus de aromatibus, oleis, vni-
 guentis, arboribus, & earumdem lachry-
 mis ac fructibus, itē animalibus, melle, la-
 cte, adipe, frumentis, oleribus. Necnon de
 omni radicū, hærbarum, succorum, semi-
 numq; ratione. In hoc autem totius ope-

ris quinto differemus de vinis & metallicis, & a Vite nostram com-
 mentationem auspicabimur.

De vinifera Vita. CAP. I.

Olia Vitium & triti capreoli, capitis dolores illitu mitigat,
 f & inflātionē stomachi ardoremq; cū polenta. Folia etiā
 per se, vt quæ refrigerent & adstringāt, imponi solent. Potus
 eorū succus dysentericis, sanguinē excreantibus, stomachicis, & gra-
 uidarū malaciæ medetur. Eadem efficiunt madefacti in aqua capreoli
 & poti. Lachryma Vitiū quæ veluti gummi in caudicibus cōcrescit,
 ex vino pota calculos pellit. Illita lichenas & pſoras leprasq; nitro
 prius perfritas sanat. Eadem cū oleo sæpius pillis illitis, pſilotri effe-
 ctum habet, maximeq; sanies quam accēsa fermenta Vitium exudarūt.
 Qua & perunctæ verrucarum informicationes extrahūtur. Cinis sar-
 mentorū & vinaceorū erūpentibus in sede condylomatis & thymijs
 illitus ex aceto medetur. Prodest luxatis & viperarum morſibus. Con-
 tra lienis inflammationem illinitur, cum rosaceo & ruta & aceto.

De sylvestri Vite. CAP. II.

ylvestris Vinis duorum generū est. Alterius vva non maru-
 f f rescit, sed flore tenuis œnanthen nominatam perducit. Altera
 ad frugē peruenit, parvis acinis, nigra, & adstringens. Folia,
 caules & clauiculæ quibus repunt, vim habent cultæ Viti similem.

De Vva. CAP. III.

Væ recentes aliūm turbant, & stomachum inflant. Innocen-
 v tiores quæ decerptæ diu pendere, ideo q̄ in eis copia hu-
 moris exiccatur. Vtileq; sunt stomacho agrisq;, atq; cibi
 auiditatem excitant. Vinaceis aut vinario vase seruata, ori & stoma-

DE MEDICINALI MATERIA

cho gratæ sunt. Aluum fistur, sed vesicam & caput tentant. Et sanguinem excreantibus conueniunt. Similesq; quæ in musto fuere. Sapa aut musto conditæ, stomachum magis infestant. At quæ solem prius passæ in aqua cœlesti cõduntur, minus vinosæ sunt, siticulosis, ardētibus & longis febribus salubres. Recõditi vinacei inflammatis mammis, turgetibus ac præduris, cum sale illinuntur. Decoctura eorum dysentericos, cœliacos, & fœminas fluctione vuluæ laborâtes iuuat infusa. Ad deflessiones ac fetus assumitur. Nuclei acinorum adstringendi vim obinent. Stomacho vtilis sunt. Inspargitur farina tostorum polentæ modo, dysentericis & cœliacis & solutis stomacho.

De Vua passa.

CAP.

IIII.

Va passa alba adstringentior est. Prodest editata caro earum tussi, renibus, ac vesicæ. Estur in dysenteria per se cū nucleis. Et decocta in patinis cum melle, admista milij ac hordei farina & ouo, valet ad purgandum caput. Eiusdem gratia cū pipere conmanducatur. Testium inflammationes sedat, illita cum lomento fabarum, aut cum lini farina. Fauos, epynctidas, carbūculos, enatas in articulis putredines, & gangrænas, sine nucleis trita, & cum ruta imposita sanat. Podagræ cõuenienter cum opoponace illinuntur. Mobiles vngues illita extrahit.

De Oenanthæ.

CAP.

V.

Enanthæ vocatur vitis syluestris fructus, cum floret. Reconodi debet fistili non picato, collectaq; substrato linteo in vmbra ficatur. Laudatissima in Syria & Cilicia & Phœnice. Vis ei adstrictoria. Quare pota stomacho acciundæ vrinæ utilis. Aluum fistit, ac sanguinis excreationes. Cõtra fistidia & acorem stomachi, sicca & illita efficax est. Capitis doloribus tã viridis q̃ sicca ex aceto & rosaceo perfunditur. Sanguinolēta vulnera cataplasmate, & incipientes ægilopas, cicatriçes in ore, & genitaliū nomas, trita cum melle croco myrrha & rosaceo, ab inflammatione vindicat. Peius miscetur ad sistendum sanguinem. Cõtra oculorum delachrymationem, et stomachi ardores, cum polline polentæ & vino illinitur. Crematæ carbonibus cinis facit ad oculorum medicamēta. Rediuuias, paronychia, abscedentes gingiuas, cruentasq; cum melle sanat.

De Omphacio.

CAP.

VI.

Omphacion succus est acerbæ vuæ, nõdū maturescētis ethasias vite, aut amminæa. Oportet autē ante canis ortum, expressam meliginem in cyprio vase linteo cooperto insolare, vsq; dum cogatur. Semperq; quod ceruici vas concretum hæsit, reliquo humori permiscere. Noctu subdialibus locis auferre. Quãdoqui

dem nocturni rores ipsum con crescere non sinunt. Eligendum est flauum, friabile, vehementer adstringens & linguam mordens. Sunt qui coquendo melliginem cogant. Prodest contra tonsillas, vuam, vlcera oris, humida gingiuarū vitia, purulentas aureis cum melle aut passo. Item ad fistulas, vetera vlcera, nomalq; ex aceto. Dysentericis & mulieribus fluxione vuluæ laborantibus clystere infunditur. Oculorum claritati & scabrie & erosionibus angulorum conuenit. Bibitur ad recentem sanguinis excreationem, etiam si rupta parte aliqua cōtingat, sed pauco & aquatiore est vtendum. Valde siquidem exurit. Idem adstringit. Prodest stomacho qui cibi tenax non est, aut tardius cibum concoquit. Item ijs qui ilei dolore conflantur. Conuenit in grauidarum malacia. Sorbtrum auxiliari constat, cum populatum grassatur pestifera lues. Huiuscemodi omphacium non nisi post annos multos bibi potest.

De Vini natura.

CAP.

VII.

Ino vetere nerui læduntur & reliqui sensus, gustu quod suauius est. Quare cauendum ijs qui internā alicuius partis imbecillitatem sentiunt. Attamen in secunda valetudine paucū aqua dilutū, innoxie sumitur. Nouum inflat. Aegre coquitur. Insomnia parit. Et vrinam ciet. Aetate medium vtrāq; vitia fugit. Quare ad vitus sanorum ægrorumq; vsurpatur. Album tenue, stomacho vtile est, ac facile in membra distribuitur. Nigrum vero crassum est, et cōcoctū difficile. Carnem alit. Et ebrietatem creat. Giluum, vtpote quod mediū est, medias inter vtrūq; vires habet. In secūda tamen et sinistral valetudine, cum primis laudatur album. Quin & vina qualitate distant. Siquidem dulce crassis partibus constat. Et difficiliter a corpore discutitur. Stomachum inflat. Aluum & interanea vt mustum turbat, sed minus inebriat. Renibus et vesicæ aptissimum. Austerum per vrinam celerius transit. Sed capita dolore tentat, & temulentiam gignit. Acetum ad ciborum per membra digestionem accommodatissimum. Aluum & cæteras fluxiones cohibet. Nouum neruos minus tentat. Vinū aqua marina factum, stomacho aduersatur. Sitim stimulat. Neruos infestat. Aluo aptum. A valetudine se recoligētibus inutile. Passū quod vuis sole siccatis in area, aut in sarmento adustis exprimitur, creticum cognomine aut pramnion aut protopon, & sapa quæ fit musto igni decocto, Greci syrion aut hepsēma appellant, quodq; melas dicitur, aut melampsygium crassa sunt, & corpora multum alunt. Cādīdū tenuius, & medium medias fortitur vires. Omnia tamē adstringūt & pulsus reuocāt. Faciunt aduersus venena, que exulcerando necant ex oleo pota, & vomitionibus reddita. Contra cicutas meconium, vene-

DE MEDICINALI MATERIA

num, toxica & concretum lac. Item contra renum ac vesicæ pruritns, rosiones, exulcerationesq. Inflât tamē & stomacho aduersantur. Priuatim prodest melapsinthiū si vëter rheumatismū sentiat. Albū magis cæteris emollit aluum. Gipso conditum nervis officit, caput aggrauat et incendit, ac vesicæ aduersatur. Contra venena cæteris aptius. Pica, ta, aut refinata, excalfaciūt, cōcoquunt. Sanguinem excreantibus inimica. Que vero parachyta vocant, admistam sapā recipiūt, caput implent. Temulentia gignūt. Aegrius a corpore discutiūt. Stomachū male habent. Inter Italica vina salernum principem locū obtinet, quod inueteratum perq̃ facile coquitur. Languidos pulsus exuscitat. Aluum adstringit. Stomacho vtile. Sed vesicæ nocet. Atq̃ ijs qui visus hebetudinem sentiunt, & ad potus crebros minime idoneum. Albana crassioribus constant partibus. Dulcia stomachū inflant. Ventrem emolliunt. Sed cōcoctionem non æque adiuuant, & nervosa minus infestant. Vetustate eadem, austerum saporem concipiunt. Ceccubum dulce est et albano crassius. Corpus et colorem alit. Aegre tamē coquitur. Surrentinum satis austerum est. Quare intestinorū & stomachi fluctiones cohibet. Et cum tenue sit, caput minus tentat. Inueteratum suavius red dicitur, & stomacho vtile. Adrianum & Mamertianum in Sicilia æque crassis partibus gignūt. Modice adstringūt, & ocysime inueterantur, minusq̃ ob suam tenuitatem nervos tentāt. Paretypianū, & quod ex adriatico sinu defertur, odoratum ac leuius est. Quare multus epotus fallit. Diu seruat ebrietatē, & soporem adfert. Istricū paretypiano simile est, sed vrinam vehementius pellit. Chium tamen antedictis mollius, & aptum potui est. Bene alit & minus inebriat. Fluctiones cohibet. Oculorum medicamentis vtile. Lesbium facile membra subit, chio leuius & aluo idoneū. Ephesium eadē vim habet. Empygela & etino lo aliæ mesogites nomine, capitis dolores ciet, & nervos lædit. Cum vero & clazomeniū, quoniam multā sibi maris aquā vendicant, facile corrumpuntur. Flatus mouent. Aluū turbant, nervis officiūt. Vinū omne, vt reliqua in commune dicātur, merum, ac syncærum, & sua natura austerum excalfacit. Facile in membra distribuitur. Stomachum adiuuat. Appetētiā ciborum inuitat. Vires alit, ac robur auget. Somnum conciliat. Et commendat colorem. Potum liberalius auxilio est, contra assumptam cicutam, coriandrum, pharicum, ixiā, meconium, argenti spumam, taxum, aconita, fungosve. Cōtra serpentium morsus. & omnium ictus que refrigerando necant, aut stomachum in vomitiones effundunt. Facit ad longas inflationes, rosionesq̃ præcordiorum, ac distentiones & stomachi singultum, & si venter aut interanea rheumatismum sentiant. Conueniunt sudatoribus, et quibus corpus

immodico sudore digeritur, diaphorumenos vocant, maxime alba, vetera, & odorata. Quæ tamen vetustate dulcescunt, renibus ac vesicæ accommodatiora redduntur. Vlceribus inflammationibusq; in succida lana imponuntur. Terra vlcera & phagedænica, & fluctionibus obnoxia, commode perfunduntur. Marina austera, & alba, ad sanorū victus vsurpantur. Ijs præstant Italica, salernum, surrentium, ceccubū, signinum, & perinulta cāpaniæ, & parætypianum ab adriatico sinu, & siculum quod mamertianum appellatur. Ex græcis chiū, lesbiū in phrygia et epheso nascens. Crassa vero & nigra, stomacho negotium exhibent. Inflationem pariunt. Corpus augent. Tenuia tamen & austera stomacho profunt, & minus carnes alunt. Vetera valde tenuia, & candida vehementius vrinam ciunt, & dolores capitis mouent. Nervosq; largius pota tentant. In media ætate vt a septimo anno, potui saluberrima sunt. Modus autē pro ætate, & tempore anni, & consuetudine, & qualitate vini definiatur. Non sitire & modice cibos proluere optimum est præceptum. Nocet ebrietas omnis, & maxime assidua. Siquidem obsessos neruos quotidie relaxat. Largiorq; potus, acutorum morborum adfert initia. Modice tamē inebriari, aliquot diebus maxime post aquæ potus vtile. Namq; expurgans sensuū extremēta transiit & per cæca corporis spiramenta discutit. Sed aquam post ebrietatem bibere oportet. Namq; a cura constantis temulentia quendam auxilij modū inducit. Omphacites nomine peculiariter fit in lesbo, siccata sole acrivua, paulo ante maturitatem decerpta, triduo aut quadriduo; donec racemi in rugas contrahantur, expressūq; vinū cadis insolatur. Vim ad stringendi habet. Prodest dissolutis stomacho, & ilei dolore laborantibus. Itē prægnantiū malaciæ, et crudis. In pestilētia quoq; sorbitū auxiliari dicitur. Huiusmodi vina nō nisi post multos ānos bibi possūt. Lora quæ deuteriā alij potimō appellāt, fieri solet, adiectis metretis tribus aquæ, in vinacea, quibus triginta vini metretæ extractæ fuerint, calcatissinaceis, expressosq; decocto ad tertias partes, & additis in singulos cōgios binis salis sextarijs. Post hyemen trāsfunditur in vasa. Lora post annū vtendū. Etenim celeriter exolefcit. Cōuenit ægris quibus timemus noxā vini, coacti sepe desiderijs eorū obtēperare. Item a longa valetudine se recolligentibus. Fit & vinū quod adynamon vocāt, loræ vires habens, hoc modo. Pares aquæ & musti mensuræ coquantur, molli igne, donec absumatur aqua, quod vbi refrixerit elutriatum, picato vasæ reconditur. Alij marinæ & cœlestis aquæ, mellis, & musti pares miscent portiones, & quadraginta diebus insolant, quo post annum vtuntur. Vinum e syluestri vua nigrum adstringit. Prodest alui & stomachi fluctionibus et cæteris quibus cōstrictione & cōtra-

DE MEDICINALI MATERIA

tionem opus est.

De Melitide vino

CAP. VIII.

m Elitides datur in longis febribus, quæ stomachū infirmarūt. Namq; aluū emollit. Vrinam ciet. Stomachū expurgat. Prodest articulario morbo, renibus, imbecillo capiti, et mulieribus abstemijs. Odoratum siquidem est, & corpus alit. Distat a mulso quod fit e vino vetere, austero, & melle exiguo. Melitides autē adiecto ad quinq; congios austeri musti, mellis congio, & salis cyatho, cortinis magnis, quo magis ad effervescendum locus pateat, fieri oportet, sensim asperso sale. Cumq; effervere desierit, in alia vasa transfunditur.

De Mulso.

CAP. IX.

m Vulsū e vetere vino austeroq; et bono melle factū præfertur. Minus enī inflat, ac celeriter id genus vigore adipiscitur. Vetus corpus alit. Media ætate, aluo prodest. Vrinā pellit. Ab ultimo cibo sumptum nocet. Et inter initia porum implet. Dein appetendi aviditatem reucat. Fit mulsum duabus vini metretis, ammissa vna mellis. Aliqui quo celerius præberi possit, mel cum vino coquūt, & ita transfundunt. Alij utilitatis gratia, ad sextarios sex musti fernen-
tis, vnum mellis adijciunt, & vbi ferbuerit vase recondunt. Dulce autē permanet.

De aquā mulsa.

CAP.

X.

a Qua mulsa easdem quas mulsum vires possidet. Decocta vti-
mur, cum molli deiectionem, aut vomitionem incitare, volu-
mus, vt ijs qui venena hauserunt ex oleo. Dococta datur im-
becillis, & hoibus elanguescentis pulsus, quos illi dixere microsphy-
ctos, tussientibus, peripneumonics, & ijs qui immodico sudore dige-
runtur. Iam paratum repositumq; quod aliqui hydromeli proprie vo-
cant, media ætate adynamo vino aut loræ correspondet, & similem
vim adipiscitur. Quare inflammationibus alicuius membri plus q̄ lora
prodest. Inueterati tamen vsus damnatur, inflammatis, aut cōstrictis.
Sed laboranti stomacho aut cibū fastidienti, sudatoribusve conuenit.
Fit duabus pluuiæ aquæ veteris ad vnam mellis partem additis, & in-
solaris. Alij fontanam aquam adijciunt, & ad tertias parteis decoquūt
& ita recondunt. Nec desunt qui hydromeli appeller, quod a melle elu-
tis aqua fauis confici solear. Sed meratius facere cōuenit. Aliqui id co-
quunt. Aegrotantibus noxium est, quoniam plurimam sibi floris cerei
partem vendicat.

De Aqua.

CAP.

XI.

a Quam in vniuersum, propter locorum proprietates & pecu-
liares naturas, cœlū et alia pleraq; difficile est experiri. Magna

tamen ex parte optima est dulcis, syncæra nullius omnino qualitatis particeps. Et quæ ne minimo quidem tempore in præcordijs commoratur. Ad hæc quæ & facili viâ fertur, & citra molestiam. Si nec inflationes creet nec corruptioni cedat.

De Aqua marina.

CAP.

XII.

Qua maris calida est, & acris. Stomacho aduersatur. Aluum
a enâm conturbat. Pituitam expellit. Si vero calida ad fotsu
adhibeatur, elicit & discutit. Neruorum vitijs & perniciosis
bus ante vlcera prodest. Miscetur cataplasmaris ex hordeacea farina,
& emplastris, & discutientibus malagmaris. Ad mouendas deiectiones
tepefacta infunditur. Ad tormina calida, ploras, pruritus, imperigines
& mammas turgentes, foueri vtile est. Liuios suffitu discutit. Ad
venenatos ictus qui tremorem & refrigerationem adferunt, salutaris in-
telligitur, maxime scorpionum, phalangiorum aspidumq;. Etiam si
quis in calidâ descendat auxiliatur. Et malo habitu cõfectis iâ diu cor-
poribus, neruisq; balneæ ex ea vtilis. Hydropicos, capitis dolores, au-
rium grauitates, feruentis vapor leuat. Syncæra, & sine potabilis aquæ
mixture reposita, virus deponit. Sunt qui etiâ præcoquant & ita re-
condant. Datur ad purganda corpora per se, aut ex posca, aut cū vi-
no aut melle. Verum post deiectionem, dant galinæ aut piscium iuscu-
la, ad domandam morsus acrimoniam.

De Thalassomelite.

CAP.

XIII.

Vod Thalassomeli vocatur, vehementer purgare constat. Tẽ
q peratur autem æquis portionibus maris, mellis, et imbris ex
alto, defæcatis, & picato vase per canis æstus isolatis. Alij ad
binas marinæ costæ singulas mellis adijciunt & vase condunt, mode-
ratius aqua marina & mitius.

De Aceto.

CAP.

XIII.

Cetum refrigerat & adstringit. Stomacho vtile. Appetentiã
a excitat. Erumpentem vnde cunq; sanguinem, potu incessuue fi-
sit. Prodest alui fluctionibus costum cū cibis. Cruentis vul-
neribus inflammationes arceat, in succidis lanis aut spongia impositū.
Reprimit procidetiã sedis vuluæq;. Item abscedentes gingiuas, et san-
guine manantes. Ad nomas, et ignem sacrum, vlcera quæ serpunt, le-
pras, impetigines, prerygia, cum aliquo conuenienti efficax est. Phage-
danas vlcerum, momasq; fotsu continuo cohibet. Podagricis calido fo-
tu cum sulfure auxiliatur. Sugillationes rapit, cum melle illitū. Con-
tra capitis ardores cum rosaceo in succidis velleribus, aut spongia im-
ponitur. Ad aquam intercutem, grauitatem aurium et sonitus, sibil-
losq; feruentis vapor proficit. Instillatum quoq; aurium vermes necat.

DE MEDICINALI MATERIA

Panos coerces tepidifotus, aut si imbuta aceto spongia admoueat. Pruritus permulcet. Contra venenatos morsus, qui refrigerando nocent, calidum commodè fouetur. Et frigidum ijs, quæ exurēs virus eiaculantur. Calidum potum atq; vomitionibus redditum, aduersus omnia venena efficax est, præsertim contra meconium & haustam cicuta, Conglobatum in ventre sanguinem, lac coagulatum, fungos, ixiā, taxumq; cū sale. Haustu voratas hirudines si sorbeatur eijs. Tussim veterem mitigat, & recentem lacescit. In orthopnœa calidum commodè sorbetur. Gutturis fluxiones gargarizatum inhibet. Anginis & iaceti vix conuenit. Contra dentium dolorem calidum colluitur.

De Aceto mulso. CXCV. XV.

Cetum mulsum quod Oxymel vocant, hoc modo temperatur. a Aceti heminas quinq; salis marini pōdo, mellis minas decem, aquæ sextarios quinq; pariter coquito, decies effervescēte cortina, atq; vbi refrigerit diffundito. Sumptum crassos humores extrahere & ischiadicis, comitialibus, & articulorum morbo confictis prodesse creditur. Contra morsum eius viperæ quam sepa vocant, haustum meconium, ixiāve, auxilio est. Anginis vtiliter gargarizatur.

De Acida muria. CAP. XVI.

Cida muria quam Græci Oxalmen vocant. Contra nomas a fotu, putrida vlcera, canū morsus, & venenatos ictus auxiliatur. Sanguinis fluxiones post excisos calculos sistit, si statim calida in vulnus iniiciatur. Prociduam sedem reprimat. Dysentericis si nomas sentiāt, infunditur. Oportet autem eam ex lacte instillare, hirudines sorbitione aut gargarizatur necat. Furfures & manāria capitis vlcera extergit.

De Thymoxalme. CAP. XVII.

Hymoxalme vtteres vtēbantur, dabantq; laborantibus imbecillitate stomachi, ternos quaternosve cyathos, aqua calida dilutos, in articularibus morbis, & inflationibus. Crassos humores atrosq; trahit. Hoc modo facitatur. Thymi triti acetabulū, t salis idem modus, rutæ, pulegij, polētæ, singulorum exiguæ portiones in vas coniiciuntur, aquæ terni sextarij & aceti terni cyathi infunduntur & circumposito linteo sub dio madscent.

De Scyllino aceto. CAP. XVIII.

Cyllinum acetum hoc modo fit. Scylla quæ cādidā fuerit expurgata conciditur, traictaq; lino segmēta modicis interval- f lis ne se contingant, siccantur in vmbra quadraginta diebus. Mina eorum in aceti boni sextarios duodecim immergitur, & vase cla-

ligēter operto septēnis diebus in sole madescit. Post eū numerū dierū scylla eximit, & expressa abijcit. Defæcatū acetū trāssundit & reponitur. Aliqui scyllā minā, quiq; acetū sextarijs miscēt. Alij citra exiccationē repurgātes, parē mēsurā adijciūt, & senis mēsis⁹ macerari patiūt. Id multo magis humorū lēticias digerit. Giguas humore prāgnātes collutione stringit. Et motos dētes firmat. Putredines oris & graues halitus tollit. Durat fauces, & callosas facit. Vocē expedit et lipidā canorāq; reddit. Dat stomachicis, ægre cibū cōcoquētib⁹, melācholicis comitialibus, vertiginosis, mēte captis. Itē vuluarū strāgulationibus lienis incremēto laborātib⁹, ischiadicisq;. Imbecillos admodū recreat. Corpus sanū reddit, et bonū colorē præstat. Oculorū aciē exacuit. Tarditatē quoq; auriū infusione purgat. In sūma ad oīa efficax. Cauēdū tamē intestinis exulcerationibus, in capitis dolore, aut neruorū vitijs. Datur quotidie ieiunis forbēdū, inter initia exiguū, paulatim ad augendo ad cyathū vsq;. Nonnulli binos dant cyathos aut largius.

De vino Scyllino. CAP. XIX.

Cyllinū vinū fit hoc modo, disectā vti dictū est scyllā, & sole fⁱ siccatā cōtūdito, minā eius tenui cribro incernito, & līteo illī ligatā, in vīcenos sextarios musti recētis ac boni demergito. Vbi trimesis spatio māduerit, elutriatū vinū obstruō diligēter vase recondito. Licet quoq; sic humida scylla vti. In orbiculos rapī modo disectā duplicato pōdere, quadraginta diebus insolari oportet, et inueterascere. Aliā parādī ratio. Scyllā disectā et repurgatā tres minas, in italicā metretā musti demittito, & senos mēses in vase obstruō macerari finito. Post id tēpus excolatū vinū recōdito. Vtile est contra cruditates, et ciborū corruptiones. Itē ijs qui reuomūt cibū, et si pituita in vētre aut stomacho coierit. Prodest lienosis, male habitis corporibus, aquæ iter cutē, regio morbo, difficili vrinā, torminosis, iflationib⁹, resolutioni neruorū, rigoribus lōgis, vertiginosis, & vulsis. Mēses pelilit. Minimē neruos infestat. Hoc vinū vetustāte fit melius. Cauendus in febre vsus, aut si interanea vlcus sentiant.

De vinis marinis. CAP. XX.

Arina varie fañtātur. Aliqui enī statī quū decerpā sūt vūa m aquā maris āmiscent. Alij in area vūas soleficāt, quibus calcatis, marinā adijciūt. Alij passas prius vūas in dolijs marina aqua macerāt, mox calcatas exprimūt. Id magis passi generibus adscribitur. Quæ tamen austeriore gustu temperantur, contra febrium aduentantium indicia valent, si modo meliora non adsint. Alium subducunt. Prosunt purulenta extussientibus, aut si dura aluus exerceat. Quæ ex aminnæis vinis fiunt, caput tētant. Stomacho aduersantur, fla

DE MEDICINALI MATERIA

tus creāt. Verū quo plenior habeatur historia, ijs qui huius studio teneretur, nō inutile existimam⁹ varias vinorū cōpositiones adferre. Nō quod frequēs eorū aut necessarius existat vsus, sed ne quid omisisse videremur, quod ad eorū rationē attineret. Sunt autē quædā ex ijs facticia, minoris curæ ac impēdij, quæ cadūt in vsus. Vt quæ ex cotoneis malis, pyris, filiquis, itē myrti baccis cōponuntur.

De vino Cydonite. CAP. XXI.

cydonites noīe alio melites appellat, & ita fieri cōsuevit. Mala cotonea exēptis seminibus, frustatim rapi modo scinduntur, & duodeci minarū pōdo, in musti metretā triginta diebus demergūtur. Postea defecatū vinū reponit. Alia faciēdi ratio. Oportet ad singulos mellis sextarios, denos succi cotoneorū tusorū pressorumq; adijcere, & ita recondere. Vinū hoc adstringit. Prodest stomacho, dysenterici, hepaticis, renum vitij, & vrinæ difficultati.

De Melomelite. CAP. XXII.

Elomeli, quod et cydonomeli nomināt, sic fit. Cotonea mala seminibus suis castrata, in q̄ plurimū mellis, quo demergi possint cōijciūtur. Id post annū mitescit, mulso nō dissimile. Præstat eadē quæ superior cōpositio.

De Hydromelo. CA. XXIII. It hydromelon duabus mēsuris aquæ coctæ, & sub caniculæ fidus insolatæ additis ad vnā melomelitis facti ex cotoneis. Vis huius eadē est.

De Omphacomelite CAP. XXIII. Omphacomelitis faciēdi ratio hæc est. Acerbæ vix immaturæ & tribus diebus insolatæ exprimūtur, & ad ternas succi partibus, mellis optimi despumati singulæ partes adijciūtur, & insolatū in vasa trāsūdatur. Vim adstringēdi ac refrigerādi habet. Stomachicis cœliacisq; cōuenit. Vfus post annū est.

De vino Apijte. CAP. XXV.

It et pyris perinde atq; cotoneis vinū, apijtes noīe, sed ita vt pyra nō magnō pere maturescāt. Ex filiquis etiā, mēspilis, sorbis simili modo tēperat. Oia hæc genera acerba sūt, & adstringūt, atq; itestas fluctiones cohibēt.

De Oenāthino CA. XXVI. It elabrusca, hoc est vite syluestri, quod vocat oenāthinū. Sic ci flores minis duabus musti metreta macerati, post triginta dies mutantur, mox collatū vinū reconditur. Facit aduersus stomachi imbecillitatē, cibifastidia, cœliacos & dysentericos.

De vino Rhoite. CAP. XXII.

It e punicis malis maturis quod rhoitē nomināt, succo expresso ab acinis eorū, quib⁹ lignosus nucleus abest, apyrina vocāt, aut decocto ad tertias, & ita reposito. Efficax est cōtra studio

nes iternas, & febri cū alui profluuiū exortā. Stomacho vtile. Adstringit aluū & vrinā mouet. De vino Rhodite. CAP. XXVIII.

Hodites sic fit. Rosarū siccarū tularūq; minā liteolo deligarā
 r in sextarios octo musti demergito. Et post tres menses, defecātū vinum transfundēs, recōdito. Vtile ijs qui febrī carent, & ad stomachi cōditiones, & dolores in fine potū, & cōtra humidās aluos & dysenterias. Fit quoq; ex succo rosarū, addito melle quod rhodomeli vocāt quod arteriæ scabrics cōuenit.

De vino Myrtite. CAP. XXIX.

Myrtites fit baccis nigris post maturitatem tuis, & organo expressis. Aliqui ad tertiās coquūt. Alij baccas prius sole torrēt, et quaternis sextarijs cōtularū, ternas aquæ heminas adijciūt, et vini veteris parē modū. Postea exprimūt & seruāt. Magnopere adstringit. Stomacho vtile. Fluctiōibus ventris ac stomachi prodest, & cōtra intestinas vlcerationes & profluuiā. Denigrat capillos.

De vino Myrsinite. CAP. XXX.

Myrsinites sic tēperatur. Rami nigræ myrti cum suis baccis & folijs tuis, decē minarū pōdo, in tribus musti cōgijs seruēscūt, donec duo superfint, aut certe sesquicōgijs relinquať. Id vinū colatū ad vsus recōdit. Cōtra furfures, vlcera ī capite manātia, eruptiones papularū, gingiuas, tōssillas, & purulētas aureis efficac est. Sudores sistit. De vino Lētiscino & terebinthino CAP. XXXI.

Entiscinū similiter vt myrsinites tēperatur. Nec secus terebinthinū. Nāq; bacciferi eorū rami sumi debēt. Similes insūt vires. Adstringūt. Stomacho accōmodant, & defluctiōibus intestinorū, vesicæ, & stomachi, & sāguinis profluuiū. Vlcerā oīa fluctiōibus obnoxia, fortu ad cicatricē perducūt. Fluctiōes vuluæ ac fessidīs, ī sessione cohibēt. De vino Palmeo. CAP. XXXII.

Almulas maturas quas vocāt chydæas, in vrsolū imo perturū, & obstructū picatā arūdine, demittito, linō forāmē sit obruratū, & quadragenis sextarijs ternos aquæ cōgios infūdito. Quod si ipsum ita dulce esse non libeat, quinq; congios infūdissē satis est. Post decē dies detractō ab arūdine linteo, assumito vinū crassū & dulce, et reponito. Suae illud quidē, sed capiti noxiū. Contra fluctiōnes propter adstrictoriā vim efficac. Stomachicis, celiacis, sanguinē expuētibus cōuenit. Aliqui idem addita aqua iterū capiunt, & tertio, quarto, quinto, sexto, faciunt, quod tandem acore viniatur.

De Vino Catorchite. CAP. XXXIII.

Atorchites aliquibus sycites vocatur. In cypro fit. Ita vt paleum. Sed hoc interest, quoniam pro aqua tantumdem hu-

DE MEDICINALI MATERIA

moris adijciunt, in quo recenter pressa vinacea maduerint. Caricæ quæ chelidoniæ aut phœnicæ appellantur, præsertim, nigraë mace-
rantur, vti diximus, & post decē dies humor excipitur. Atq; iterū aut
tertio, idē modus aquæ in qua vinacea maduerint, infunditur. Simili
modo intercedētē spatio, quarto aut quinto assumitur. Demacerata-
rum liquor non secus acorem cōtrahit, & aceti vsum præbet. Id tenue
est. Flatus gignit. Stomacho aduersatur. Fastidium parit. Aluo tamē
prodest. Vrinā ciēt. Menses trahit. Lactis vbertatē facit. Vitiosum san-
guinē creat, & elephantiasin adfert, vt potio quā zethon appellamus.
Aliqui sex amphoris, decē salis sextarios adijciūt. Alij muriaë amphi-
ram, quod nō facile vitiat, & aluo idoneum fore censēt. Alij thymū
et fœniculū imo subiiciunt, & caricas superponunt & ita vicissim, do-
nec vas expleuerint.

De vino Sycomorite. CAP. XXXIIII.

It & sycomoris eodē modo vinū. Sed in acetū acre degenerat, qm̄ noīata præualet vis corū, vt fluētis liquoris dulcedi-
nē retinere possit. De Vino Refinato CAP. XXXV.
Refinātū vinū populatim factitari solet. Copiosum in galatia.
quoniā vinū illic coacescat, vna non maturescēte. Ideoq; re-
frigerat, nisi picea refina temperetur. Refina autem cū corti-
cetūdine, & amphoræ, dimidiata hemina permiscetur. Aliqui vbi ef-
ferbuit excolant, separantes refinā. Alij relinquunt. Hæc vina vetu-
state dulcescunt. Omnia capitis dolorē & vertigines faciunt. Conco-
ctionem tamen adiuuant. Vrinam ciēt. Tussientibus ac destillatione
vexatis conueniunt. Itē cœliacis, dysentericis, mulierum mensibus, &
hydropicis, & fœminis fluxione vuluæ laborātibus. Altis exulcera-
tionibus infunditur. In hoc autem genere nigricans magis albo con-
stringit.

De vino Strobilite. CAP. XXXVI.

Trobilites fit maceratis in musto nucibus pineis, recentibus,
fractisq;. Præbetq; refinati effectus, si quis madefactas nuces pi-
ni musto decoquat. Potum cōuenit ijs qui tabitudine consue-
ciuntur.

De vino Cedri. CAP. XXXVII.

Edrinū, Iuniperinū, cupressinū, laurinū, pineū, aut abiegnū
simili ratione fiunt. Diuisos recenter ramos cū fructū ædunt,
aut soli, aut balneo, aut igni, admouere oportet, vti desudēt, cō-
gioq; vini minam vnā permiscere, & post duos menses trāsfundere. Et
anteq; recōdantur insolare. Fastidiorū vinorū vasa impleri debēt, nāq;
nō plenis vasis, vina in acorem corrumpuntur. Medicata autē vina, re-
cte valentibus insalubria. Omnia excalfaciunt. Vrinā ciēt, & subtrin-
gunt. Laurinū tamen vehementius excalfacit. Fit quoq; efusu cædri

maioris vinum, congio musti, adiecta tusarum baccarum selibra. Dico-
bus quadraginta insolari debet, & defæcatum in vasa transferri.

De vino Iuniperino. CAP. XXXVIII.

f It etiã vinũ e baccis iuniperi, nõ aliter q̃ cedrites, & et ad eadẽ
valens.

De Vino Cedrite CAP. XXXIX.

Edrites hoc modo fit. Cedriam dulci aqua lauãt, & singulas
c amphoras singulis cyathis diluũt. Et ita musto replẽt. Hoc
genus vini excalfacit, extenuat. Tussi vtile sine febre, pectoris
laterũq; doloribus, ventris & interaneorũ vlceribus, purulẽtis excrea-
tionibus, mulieribus vuluæ malo opportunis, hydropicisq;. Facit ad-
uersus ventris tineas & rigores. Contra venenatos idus auxiliatur.
Serpentes necat. Aurium doloribus instillatum medetur.

De vino Picato. CAP. XL.

Icatũ exliquida pice & musto tẽperatur. Picẽ autẽ primum
p marina aut muria tantisper eluere oportet, dum inalbuerit, et
syncera maris aqua defluat. Mox aqua dulci proluẽda. Con-
gijs octo musti, vncia picis vna aut altera adijcitur. Vbi efferbuerit &
confliterit, in vasa diffunditur. Hoc genus vini excalfacit, concoquit,
purgat, abstergit. Vtile doloribus pectoris, iocineris, lienis & vuluæ,
si sine febre sint, veteri rheumatismo, exulcerationibus in altũ receden-
tibus, tussi, suspirijs, concoctionibus tardis, inflationibus, & luxatis,
præsertim in succida lana impositum.

De vino Absinthite. CAP. XLI.

Absinthitæ faciendi ratio euariat. Aliqui enĩ duodequinga-
a ginta sextarijs italicarũ amphorarũ, ammistã absinthij pon-
nici libram decoquunt ad tertias parteis, & vbi infuderint no-
naginta aceri sextarios & absinthij selibrã, ac diligẽter permiscuerint,
diffundũt in vas, dũq; cõquieuerit defæcãt. Alij absinthij minã in am-
phorã demittũt, tusamq; & raro linteo deligatã, in decẽ congijs musti
macerãt, binis mēsis. Alij absinthij quadrantẽ, alij trientẽ, & nardi
syriacæ, cinnamoni, casia, floris iunci odorati, calami, elatæ, palmarũ,
singulos sextantes iniiciunt in metretã musti, & tũdentes prius pila,
obstructo vasis spiraculo, binis ternisve mensibus dimittunt. Pos-
tea defæcatum vinum transfundunt ad vsus. Alij addunt in musti
caddum, celticæ nardi drachmas quattuordecim, & absinthij dra-
chmas quadraginta lileo inuolutas, & post quadagesimũ diẽ elutriãt.
Alij in viginti sextarios musti, absinthij librã, & ficcæ pini resinæ sexa-
tantem immittunt, et post decẽ dies excolant & recondunt. Vtile est
stomacho. Vrinam cit. Tardã concoctionẽ accelerat. Hepaticis, regio
morbo, & renũ vitijs auxiliatur. Fastidia discutit. Ijs prodest quibus
q .iij.

DE MEDICINALI MATERIA

stomachus negociū exhibet. Valet contra longā præcordiorū distensionē, & inflationes, teretēq; ventris tineas, & remoratos menses. Contra hausta ixiæ venena q̄ plurimum potum & vomitionibus redditum auxiliatur. De Vino Hyssopite CAP. XLII.

Hyssopites e cilicio hyssopo maxie laudatur. Fitq; similiter foliorū hyssopi tusorū libra in amphorā musti cōiecta. Liteolo raro cū quibuscūq; lapillis folia inuoluūtur, vt degrauatus pōdusculo fasciculus fidat. Vinum post quadraginta dies deæcatum elutriatur. Cōtra pectoris laterū & pulmonis vitia, veterem tussim, & spiria prodest. Vrinam cit. Torminibus & rigoribus febrium circuitu repentibus auxiliatur. Menses mouet.

De Vino Chamidrytæ. CAP. LXIII.

Imili modo chamedrytes fieri solet. Excalfacit, discutit. Cōuulsis, regio morbo, vuluæ inflationibus, tardæ cōcoctioni, incipiēti aquæ itercutē, subuenit. Inueterascēs melius redditur.

De Vino Stichadite. CAP. XLIII.

Tichadites nō secus tēperatur. Cōgijs sex sticadis minā addere oportet. Crassitiē, inflationes, laterū, neruorūq; cruciatus, & perfrictiones discutit. Comitialibus cōmode datur, cū pyrethro & sagapenio.

De Aceto stichadico. CAP. XLV.

Ita eadē acetū e stichade hærba, vt paulo ante diximus acetato macerata. Quod eosdē implet effectus.

De Vino Cestrite. CAP. XLVI.

Ita vinū e Betonica, quā cestron psychotrophon appellant: Hærbā semine maturo prægnātem, cū suis ramulis minā pōdo, congijs duobus musti macerant, & post septimū mensem transfundunt. Ad multa interaneorū vitia, vt frutex ipse pollet. Et vt in vniuersū dicatur, facticia vina, sibi misturarū vires adsciscūt. Quare non difficile fuerit, ijs qui illarum naturas norint, vinorū vires coniectura quadam consequi. Verumtamen vinorum vsus febricitantibus abdicandus. Fit etiamnum e betonica acetum ad eadem vitia vtile.

De Tragoriganite vino. CAP. XLVII.

Ragoriganites fit quaternis Tragorigani drachmis, in quaternos musti sextarios coniectis, & post tertium mēsem transfusis. Prodest torminibus, vulsis, ruptis, laterum doloribus, spirituum discursationi, ægris concoctionibus.

De Vino Bunite. CAP. XLVIII.

Napis fit vinum nomine bunites, drachmis duabus tussinapii sextarios duos musti additis, & cæteris eodem modo fa-

ais. Prodest stomachicis & dimicatione aut longo equitatu fatigatis.

De Vino distamnite. CAP. XLIX.

d Istamni drachmas quattuor macerato quaternis musti sextas
ijs. Facit duersus stomachi fastidia. Menfes & purgamentum
a partu subducit.

De Vinoprasijte. CAP. L.

m Azubij adulti folia tundito, & sextarios octo in musti metret
tam demittito, & reliqua consimiliter facito. Conuenit hoc
vinum pectoris vitij & omnibus quibus marrubium.

De Vino Thymite. CAP. LI.

e Hymi tusi & cribrati vncias duas linteo colligatas in am
phora musti adijcito. Valet cōtra aegras coctiones, fastidia,
dysenteriam, neruorū & præcordiorum dolores, hibernos
horrores, & venenata animalia, quorum morsum frigus insequitur, aut
putrescit locus.

De Vino Thymbrite. CAP. LII.

f Imili modo e satureia vinū fit, quod eadē quæ thymites præ
stat. De Vino. Origanite. CAP. LIII.

f Ic quoq; origanites ex heracleotico Origano conficitur. Fa
cit eadem quæ thymites.

De Calaminthite & Abrotonite vinis. CAP. LIIII.

e Calamintha, pulegio, & Abrotono vina sūt eodē quo thy
mites modo. Profunt stomachicis, cibum fastidientibus, & re
gio morbo, q; vrinam moueant.

De Vino Conyzite. CAP. LV.

f It & item e conyza vinum, cōtra venenata ante alia efficac.

De Vino Aromatite. CAP. LVI.

a Romatites ita fit. Palmæ, Aspalathi, Calami, nardi gallici,
singulorū quattuor sextarios sumito, Postq; contriueris mu
sto subigito, coactis ingentibus ossis, & in sextarios duode
cim austeri musti deiectis, operculato vase, quadragita diebus quiesce
re finito. Deinde vbi face expurgatum fuerit, recondito. Alia eius ra
tio. Calami vncia, phu drachmæ septem, costi drachmæ duæ, nardi sy
riaci drachmæ sex, casie vncia, croci drachmæ quattuor, ammomi dra
chmæ quicq; asari drachmæ quattuor, omnia simul trita & linteo colli
gata in caddum musti demergūtur. Et postq; vinum deferbuerit trans
funditur. Facit ad pectoris et laterum et pulmonis dolores. Difficili
vrinæ, rigoribus, retardatis mensibus, atq; ijs qui per frigora iter fa
ciunt, potū conuenit. Pituitæ crassitiem extenuat. Colorem alit. Som
num conciliat. Dolorem finit. Renū & vesicæ vitij auxiliatur.

DE MEDICINALI MATERIA

De Vinoc Pipere Myrrha & iride. CAP. LVII.

It & vinum ad defillationes, cruditates, tussim, inflationes,
f et si humor in stomacho coijt, myrrhæ duæ drachmæ, pipere
ris candidi drachma vna, iridis drachmæ sex, anisi drachmæ
tres. Omnia plenius tusa & linteolo inuoluta in sex vini sextarios cō
ijciuntur. Vinum post triduum colatur, & in lagenâ reconditur. Da
tur post deambulationem meraculum cyathi vnus mensura.

De Nectarite vino. CAP. LVIII.

It quoq; nectarites ex Helenio hærbâ, quam alij medicam, alij
f symphyton, alij Idæon Phlomon, alij Orestion, alij Nectaris
on vocant. Radice sicca pondo quinq; drachmarum linteolo
colligata, & in congios sex musti addita, & post tres menses effusa. Fa
cit ad stomachi & pectoris vitia. Vrinam pellit.

De Vinoc syriacâ nardo celtica et malabathro. CAP. LIX.

Syriacâ nardo & celtica, malabathroq; vinum facitatur,
e hac ratione. Singulorum selibram in binos musti congios
mittito. Post menses duos colato. Datur cyathus vnus cum
tribus aquæ. Hoc vinum efficax est contra vitia renum, hepaticos, re
giū morbum, & vrinæ difficultatē. Prodest stomachicis, atq; ijs quos
palor decolorat. Alij bessem, aut sextantem acori, & celticæ nardi qua
drantem, in musti amphoram adiiciunt.

De Asarite vino. CAP. LX.

Sfari quadrantem in senos musti sextarios itidem demittito.
a Id vini genus vrinam ciet. Hydropicis, & regio morbo labo
rantibus, hepaticis, ischiadicisq; conuenit.

De Vinoc syluestri nardo. CAP. LXI.

Adicis syluestris nardi recentis & tritæ cribratæq; bessem, in
e congiū musti conijcito. Duos menses quiescere finito. Vti
le est hepaticis, difficili vrinæ, inflationibus, stomachicis.

De Daucite vino. CAP. LXII.

Adicis dauci contusæ drachmas sex in musti amphoram im
r ponito, & similiter transfundito. Facit ad dolores thoracis,
præcordiorum & vuluæ. Menses pellit. Ru&us ciet, & vri
nam. Prodest tussi, ruptis, vulsisq;.

De Saluiato vino. CAP. LXIII.

f Aluix vnciam in musti amphoram, quod idem cū ceramio
est, mittito. Valet cōtra renum, vesicæ, & laterum dolores, re
iectiones sanguinis, tussim, rupta, vulsa & suppressos menses.

LIBER QVINTVS

125

De Panacite vino.

CAP.

LXIII.

p Anacis vnciam in musti congiū mittito, & transfundito. Prodest ruptis, vulsis, fractis, orthopnœæ. Lienis crassitiē extenuat. Contra tormina, coxendicum dolores, efficax est. Tardas concoctiones accelerat. Menses & partus extrahit. Aquæ inter cutem, & serpentium ictibus auxiliatur.

De Acorite vino.

CAP.

LXV.

v Ina ex acoro & dulci radice consimili modo fiunt. Oportet enim singulorum vncias in senos congios mittere, tribus mēfibis macerare, mox in vas transferre. Faciunt ad pectus & latera. Et vrinam mouent.

De Selenite vino.

CAP.

LXVI.

f Eminis apij recentis, maturi, & cribrati drachmæ nouem in musti amphoram demittatur. Appetitum excitat. Stomachicis & difficili vrinæ auxiliatur. Oris halitum commendat.

De Marathrite & anethino vino. CAP. LXVII.

c X Fœniculo, anetho, & Petroselino, vina eodem modo fiūt, & ad eadem efficacia.

De vino e flore salis.

CAP.

LXVIII.

f It & e flore salis vinum multo ad purgandum efficacius, q̄ vinum aqua marina temperatum. Fauces, vesicam, renes, & stomachum infestat. Quare neq; in secunda neq; aduersa valetudine prodest. Fit etiam vinum quod Phthorion vocant, quoniam partus necat, & abortus facit. Veratro aut scammonia, aut syluestri cucumere, iuxta radices vitium sato. Siquidem vites sibi illorum vires adfiscunt. Id vinum partus enecat. Datur ieiunismulieribus quæ ante vomuerunt, cyathorum octo mensura, dilutum.

De Vino e thymelæa. CAP.

LXIX.

r Amorū thymelæa cū suis folijs & fructu triginta drachmas mittito in congios tres musti, & leui igne coquito, donec congi duo superfint, defæcatumq; recondito. Aquosa purgat excrementa, & lienem absumit.

De Vino e Chamælæa.

CAP.

LXX

c Hamælæa dum floret, cum folijs tusa, & cribrata decem drachmarum pōdere, in musti congiū additur. Post duos menses vinum in vas transfertur. Aquæ inter cutem, hepaticis, & lassitudine confractis, efficax est. Item mulieribus quæ a partu ægre purgantur.

DE MEDICINALI MATERIA

De Vino Chamæpityino. CAP. LXXI.

c Chamæpityinum simili modo fit, ad eadem cōueniens. Vri-
nam quoq; ciet.

I De Vino Mandragorite. CAP. LXXII.
Ibrum radice concidito. Segmenta lino traijcito, quod seli-
brā æquat in musti cōgios decē demittito. Ibiq; esse finito ad
menses treis. Media portio hemina dimidiū. Bibitur, passo
in duplum addito. Aiunt heminam vini congio mistam, potu soporem
adferre. Cyathus vnus cū sextario vini potus, enecat. Mediocris vsus
eius, doloris sensum aufert. Eluctiones incrassat. Olfactu, instillatu,
potuq; idem præstat.

i De Vino Helleborite. CAP. LXXIII.
N congii musti aqua marina diluti, drachmas duodecim ni-
gri veratri triti in linteo mundo, mittito. Dumq; efferbuerit,
in marinæ aquæ congios quatuordecim aut quindecim trans-
fundito. Et vbi pleniuscule fregeris, inijcito. Post aliquot dies colato,
& vritor. Dato cyathum vnum ex aqua in potu ad aluum soluendam
ijs qui euomuerūt a cœna. Alia ratio. Veratri drachmas viginti, iun-
ci odorati vncias duodecim, spicæ syriacæ vncias tridecim, cribratas
& linteo colligatas in septē vini coi sextarios, diebus quadraginta ma-
cerandas indito. Postmodum colato, Dabis in potu selquiheminam.
Aliter. Decodæ marinæ aquæ ex pelago petiti sextarios duodecim,
veratri candidi libras sex, quadagesimo die q̄ madefeceris, colato &
vritor. Alia ratio. Veratri drachmas duodenas, & aphronitri quater-
nas in senis musti sextarijs diebus quinque denis macerato, mox colato,
& semestri exacto, vritor. Id vini genus abortus facit, & partus necat.
Aut vuas in sole siccatas imponito in musti metretam, implet autē me-
treta congios decem, & gypsum in vinum mittito pondo drachmarū
viginti, & biduo residere finito, conijcito veratri nigri vncias trigin-
ta, iunci odorati, calami, singulorum drachmas triginta, baccarum iu-
niperi sextarios duos & heminā, myrrhæ et croci singulorū drachmā,
inuoluens linteolo diebus quadraginta appendito, postea colato, da-
bis heminas treis aut duas dillutas. Purgat a partu & abortu scēmi-
nas. Menses extrahit. Contra strangulatus vuluæ efficac

De Vino Scammonite CAP. LXXIII.

f Cammonites sic fit. Radicis scammonia per menses effossæ
tritæ & linteo colligatæ drachmas quinque, in vini cōgiū mit-
tito, ad dies triginta. Aluū purgat. Bilē & pituitā extrahit.

De omnibus metallicis & primū de Cadmia. CAP. LXXV.

X Cadmiæ generibus optima est cypria, botryitis nomine,
 e densa, modice grauis, & in leuitatem magis declinās, racemosa facie, colore spodij quæ fracta cinerulenta est, & æruginosa. Proxima habet foris cærulea, intus cādidior, internatis segminibus, onychitæ lpidi similis. Cuiusmodi sūt quæ e veteribus metallis effodiuntur. Quædam etiā placodes id est crustosa dicitur, lineis quibusdā perinde quasi zonis cinctā, ob quod eā zonitin appellauere. Alia ostracitis nominatur, gracilis, & magna ex parte nigra. Sed quæ testaceam faciem habet, terram amplexa est. Improbatur candida. Oculorum medicamentis botryitis nomine, & onychitis, vtilis. Reliquæ ad emplastra & farinas quæ cicatricibus inducendis insperguntur. Ad eadem cypria prodest. Ex macedonia vero, thracia, et hispania delatæ improbantur. Cadmiæ effectus adstringere, caua explere, sordes expurgare, exiccare, corporis meatus infercire, excrescētiā in carne coercere, crustas creare, & vlcera quæ cacoethe vocantur, ad cicatricem perducere. Gignitur cadmia ex ære in fornacibus candente, fuligine egesta statu, et lateribus camerisq; fornacum applicata. Prægrandes autem ac ferreæ sunt fornaces, ab officinis appellatæ acestides, per summa nullo spiraculo relicto, concameratæ, vt quæ ab ære iactantur sursum corpuscula cohæreant, & inibi detineātur, quæ cum spissius infidēt, in corpus cōcrascunt, & modo genus vnum eius, modo alterū, modo omnia perficiunt. Extrahit & cadmia cremato lapide cui pyritæ cognomen est, monti soleo supereminente. In quo etiam quædam quasi venæ, chalcitis, mysios, soreos, melantheriæ cærulei, chrysocollæ, attramēti sutorij diphrygisq; inueniuntur. Nec desunt qui cadmiam in lapidum fodinis iuueniri tradant, falsi quadam lapidum cognatione. Reperitur et apud cumas lapis nullā sui vim ostēdens. Ij eo depræhēduntur q̃ sunt cadmiæ leuiiores, nullumq; alienum mādētibz saporem exhibēt. Cōmanducatus autē lapis dentes offendit. Cadmia vtpote cū cedat, esum non respuit. Alio autem discerni possunt argumento, cadmia in farinā detrita, & aceto subacta, in sole se comprimit. Quod in lapide nūq; accidit. Item tritus & igni appositus lapis, profilit, et fumum igni similē ei aculatur. Cadmia vero quictā manet, fuliginēq; luteo colore aut æreo splendentem expuit, vario zonarum discursu. Insuper lapis ignem expertus, atq; refrigeratus colorē mutabit, ac leuior multo fiet. Sed cadmia nihil euariat, nisi quis eam aliquot diebus cremauerit. Fit & in argenti fornacibus candidior, ac minus ponderosa, sed viribus nequaquā comparanda ærarie. Vritur cadmia superior carbonibus obruta, do-

DE MEDICINALI MATERIA

nec translucentia spectetur, & ferrei stercoris modo bullit, mox extinguatur vino aminnaeo. Sed quæ ad psorarum medicamenta præparatur, acetoto. Alij hoc modo exustam conterunt in vino, rursumque fustili crudo torrent, donec pumicosa videatur. Iterumque trita ex vino, vrunt, donec in cinerem redigatur, nihil scabritiæ retinens. Hac spodij vice utitur. Lauatur in mortario trita, effusa subinde aqua, dum sordidum nihil emergat. Dein coacta in passillos reponitur.

De Pompholyge. CAP. LXXVI.

Ompholyx specie sola, non genere, a spodio distat. Siquidem spodios nigricat, & plerumque poderosior est, palearum pilorumque plena, quasi derasum quiddam, ac detractum ab æraria rum officinarum pavimentis & fornacibusque videatur. Pompholyx vero pinguis est, & candida, usque adeo levis, ut in auras euolare possit. Curus duo fluxerunt genera. Vnum ad aeris colorem vergens, suppingue, alterum magnopere candidum, summamque leuitatem nactum. Candida fit Pompholyx, quoties in perficiendo ære, fabri præstantiorem facere volentes, detritam cadmiam cumulatius insparserint. Namque tenuissima fauilla quæ effertur, in Pompholygē coit. Cæterum Pompholyx non ex æris modo materia & fabrilis industria fabricatur, sed ex cadmia quoque, ad gignendam ipsam eximie proflata. Cuius faciundæ ratio hæc est. In domo binis tectis operta, fornax extruitur, iuxta quam mediocris fenestra versus tabulatū a supernis partibus pateat. Domusculij paries fornaci proximus, tenui foramine ad fornacem usque perforatur, ad excipiendam follis narem. Ostium mediocre habeat pro exitu ingressuque artificis fabricatum. Domuncula altera coniuncta sit, in qua & folles & flator suo munere fungantur. Deinde carbonibus in camino succensis, assidens artifex cadmiam particulatim fractā inspargit, a locis supra fornacis caput extructis. Idē negocium obit artificis minister, simulque carbones adiicit, usque dum indita cadmiæ copia prorsus absumatur. Itaque egesta suffitu, tenuis pars & levis materiæ in summam domum euolat, & parietibus tectisque adhærescit, conflatum inde corpus, inter initia erumpentibus aquarum bullis simile prodit, postea maius incrementum capescens, elaboratis lanis simile redditur. Poderosius autem in subiecta pedibus loca se recipit. Sed hoc fornacibus offunditur, illud domus pavimento cohæret. Quod tenuiore deterius existimandum est, ideo quod multum terræ collegerit, & spurcicia in aceratione referciatur. Sunt qui hoc modo tantum fieri spodiū arbitrantur, de qua antedictū est. Optima creditur cypria, quæ accepto aceto odorem æris præstat, colore aliquantum piceo, sapore luti horrido, & si fraudem non experta, flagranti carbone inferuescit, acreum colorem

contrahit. Antedictis autem notis, diligenter attendendum est. Siquidem a nonnullis adulteratur taurino glutine, ouillo pulmone, aut marino, aut crematis grossis, & quibusdam consimilibus. Quod facile cognitu fuerit. Quippe nihil in ijs probandis inuenietur eorum, quæ antedicta sunt. Pompholygem ita lauari oportet, ligatam linteo mundo modiceq; raram, aut siccam, aut aqua respersam, in labellum demittito, quod imbrēm contineat, & huc atq; illuc fasciculum deferens, immergito. Ita erām limosa pars eius ac dulcis effluet, & omne crassamentū in linteolo remanebit. Postea residere finens, aquam cum cinere colis incernito, & nouam infundens, agitato, & effundito, mutata tantisper aqua & colata, dū arenosi nihil fidat. Demum aquam exprimito, & ficcatum cinerem recondito. Alij quantum maxime fieri potest ficcant, & manibus in aqua cōterunt, dum mellis crassamentū imitetur. Deinde linteo faucibus excepturi vasis obtento, aut laxius illigato, colant, & quo facilius transeat, infusa per linteū largiore aqua, cinerem conuertunt, mox spumofum quod traiectum est & supernatavasi, concha excipiunt, & fistili nouo ad vsus recondunt. Quod vero resedit, et sensim cribratū, in aliud vas transfundunt, relicto harenoso quod pessum ierat. Rursus lapidosa fidere patiuntur, & in vas aliud excolant. Hoc identidem faciūt, donec cinis merus & harenæ expers inueniatur. Alij paulatim integrā in aqua respergunt, arbitrati arenas lapillosq; suo pondusculo degrauatōs, pessum ire. Pilos autem & paleas leuitate sua in sublime attolli. Cæterum cinerem medium separant & in pillā coniectum vt cadmiā eluunt. Quinetiam lauatur vino chio marina aqua diluto, modis quos supra diximus. Et ita redditur adstringētor, q̄ aquis elota. Vis Pompholygis adstringere, refrigerare, explere, purgare, obstruere, & aliquantum exiccare. Inter medicamenta numeratur quæ sensim crustas obducunt. Quod si spodium torrere libet, diligenter tritam & irrigatam aqua, colliges in pastillos, fistiliq; nouo, subiectis leuib; prunis, orbiculos continuo versabis, dū assicati fuluescāt. Neq; ignorandū, ex auro, argēto, plumboq; fieri spodion. Verum post cypriam plumbea maxime commendatur.

De Antispodo.

CAP.

LXXVII.

Voniam Spodos sæpe numero desideratur, necesse est ostendere, quæ simili virtute polleant, vt in spodij locum suffici possint, antispoda vocant, quoq; modo sumi debeāt. Folia itaq; myrti, cum floribus & baccis immaturis, in fistile crudum coniecta, inditōq; operculo cōtinua foramina habente vruntur fornacibus donec figlinum percoquatur. Iterum in fistile aliud crudum transferuntur, quod vbi perassatum fuerit, exempta lauantur ad vsus. Idem quoq;

DE MEDICINALI MATERIA

fit e termite syluestris oliuæ, si habeatur, sin secus, satiuæ cum suis floribus, aut malis cotoneis disectis, & detractis ossibus, aut gallis aut lacertatis linteolis. Item ex moris immaturis id est candidis, in sole prius arefactis, aut terebintho, aut lentisco, ænanthe, aut mollibus rubifolijs, vel e buxi coma, vel pseudocypereo cum flore. Alij ficus in sole anætea siccatas, eodem modo parant. Alij taurinum gluten. Alij succidas lanas asperas, pice aut melle irrigatas. Quæ omnia in spondij vicem vsurpantur.

De Aere vsto.

CAP. LXXVIII.

Es vsu probatur rubrum, quod contritu colore Cinnabari imitetur. Nigrum vero plusq̃ deceat, exustum est. Fit autem e clauis solutarum nauium, fictili crudo compositis, subsperso sulphure cum sale pari, omnibus vicissim insparfis, fictile circulito figurari creta spiramento, fornacibus inditur, donec figlinum percoquatur. Quidam pro sulphure & sale alumen inspargunt. Alij sine sulphure ac sale fictili, aliquot dies vrunt. Alij sulphure solo vtuntur, fuliginem tamen excutunt. Alij oblitos scissili alumine clauos, cum sulphure et aceto, fictili crudo cremant. Alij in anæa olla aceto resperfos, vrunt, & iterum aut tertio idem efficiunt, postea recondunt. Principem locum tenet, in memphide combustum, proximum in cyprio. Adstringit, exiccatur, reprimat, extenuat, attrahit. Vlcera purgat, & ad cicatricem perducit. Vitia oculorum emendat. Excrecentia in carne consumit. Nomas cohibet. Vomitus ciet, cum hydromelite potum, aut cum melle delinitum, allitumve. Lauatur vt cadmia, mutata quater in die aqua, donec nulla prorsus sordes emergat. Aeris recrementum, sterculusve, quam scoriam vocant, eodem modo lauatur & eandem vim sed imbecilliores habet.

De Flore æris.

CAP. LXXIX.

Losæris quem nonnulli clauorum veterum plegma, quasiamentum, nominant. Optimus est, friabilis, in attritu luluescens, milij effigie, brevis, ponderosus, modice splendens, atq̃ constringens, qui delimatam æris scobem non recipit, quasæpe adulteratur. Sed id facile depræheditur cum denti umillisu, dilatantur rameta. Fit autem cum æs fornacibus fusum, in receptacula delabatur, per colafistularum ad ea pertinentium. Circa eas enim occupati, sordes expurgantes, aquam clarissimam infundunt, refrigerare volentes. Itaq̃ repetino concretu, ac addensatione, expuitur & scater antedictus flos. Adstringit & excrecentia coercescit. Offusam oculis caliginem emendat, sed magnopere mordet. Quaternum obolorum pondere datus, crassum humorem extrahit. Carnosa narium vitia absumit. Eruptiones papu-

larum cum vino cohibet. Contra diuturnas aurium grauitates tritus, in eas per fistulam flatu impellitur. Vuam tonfillasq; reprimi, farina eius cum melle admota,

De Squamma æris. CAP. LXXX.

Quāma æris excussa clauis, cyprio ære fabricatis, crassa quidem ipsa. Bona est quæ helitis nominatur. Sed ex malo ære aut cādido, vitiosa intelligitur. Quam utpote tenuem & inuolidam dēnamus, maxime approbantes crassam, ruffam, præsertim si aceti resperfu rubiginem cōtrahat. Vim habet adstrictoriam, extenuatē, reprimentem, & erodentem. Nomas coercet. Vlcerā ad cicatricem perducit. Pota ex aqua mulsa aquam trahit. Aliqui farina subactam, dant in catapotto. Additur ad oculorum medicamenta. Genarum scabritiā absūmit, & fluxiones exiccat. Lauatur hoc modo. Siccæ æris squammæ expurgatæ selibra, cum nitida aqua in mortario manu diligenter conturbatur, quousq; pessum ierit. Abijcitur quod emerfit, et effusa aqua, hæmina cœlestis himbris adijcitur, & distenta manu, squamma quasi exiccāda sit, vehemēter cōfricatur. Dumq; lentorem emitte-re cœperit, aqua sensim ad sex heminas vsq; superinfunditur, terendo valide. Squamma ad latus mortarij colligitur, ibiq; apprimitur. Quo facto, expressus humor pixide ex ære rubro facta, excipitur. Hoc est enim velut flos squammæ, valēs viribus, & ad ocularia medicamēta cū primis efficax. Inutile quod superest. Lauatur donec nullam prorsus lenticiam excernat, & linteo opertum biduo conuiescere finitur effusaq; extante aqua, vbi ficcātū erit, reconditur pixidicula. Alij vt cadmiam lauant, & reponunt.

De Squamma ex acie decussa. CAP. LXXXI.

Quammæ ex acie aut mucronibus decussæ quam vocant stomoma eadem vis. Lauatur modo simili, & recōditur. Sed ad moliendamalui deiectionem, inefficacior est.

De Erugine rasa. CAP. LXXXII.

Erugo rasa fit ijs modis. Super doliolum, aut aliud confimile vas aceti q̄acerrimi, aneum vas præsertim concameratum sin minus planum versetur, sitq; extersum, nullūq; habeat spiramentū. Exempto vase quo doliolum obturaueris, decimo quoq; die, insidēs ærugo deraiditur. Aut æris lamina in caddis super acetū ita suspenditur, ne attingat, et totidem post dies raditur. Aut massulæ æris aut laminæ, vinaceis iam accescentibus cōduntur, & simili modo versantur. Quinetiam ex delimata æris scobe æruginē facere licet. Nec non e laminis, quibus bractæ auri conclusæ maleo ducuntur. Si quis eas aceto respargat, & ter aut quater verset, donec æruginē contrahāt.

DE MEDICINALI MATERIA

Tradunt æruginē in cyprijs metallis gigni, lapidibus quibusdam nō nihil æris habentibus, quibus ærugo efflorescit. Adduntq; nonnumq; per caniculæ æstus, e quodā specu manare. Sed hoc exiguū, & optimū esse, illud speluncis effluens, copiosū quidē, & boni coloris, sed vitiosum, quod lapides multos collegerit. Pluribus autē modis adulterant. Aliqui pumice, alij marmore, alij attramēto sutorio. Sed depræhēdēmus pumicē aut marmor, pollice sinistrae manus madefacto, & æruginis portiunculā in alterū atterente. Siquidē eā diffundi constat. Marmoris autem pumicisq; partes, coeunt non dissipatæ, demumq; tractatione crebra & humoris complexu dealbescunt. Quin & dentium appressu. Siquidem sincera cedit, levis, sine asperitate. Attramētum vero sutorii igne coarguitur. Namq; si fictile, aut lamina, adulterata æruginē illinatur, etseruenti cinere aut carbonibus incalcescat, mutabit colorem. Attramentum sutorium rubescit, quod vñtum suapte natura talem fortitur colorem.

De Aerugine scolecia. CAP. LXXXIII.

Eruginis quā vocant scoleciam, duo sunt genera. Quædam fossilis est. Altera facticia. In mortario cyprii æris dimidiam heminā aceti albi acrisq; pistillo cupreo conterito, donec strigmenti crassitudinem imitetur. Deinde aluminis rotundi, salis fossinij, translucentis, aut marini q̄albissimi, solidiq; drachmam vnam, aut certe cum nitri pari pondere terito in sole, æstuosissimis diebus, sub sidus caniculæ, donec colore æruginēo, & coagmēto strigmentosum fiat. Vbi autem se in vermiculorū speciem contraxerit, recondito. Efficax & boni coloris redditur, si duas parteis vrinæ veteris, cum vna aceti adieceris, & alia quæ dicta sunt peregeris. Sunt qui æruginē rasile, quæ in apparatu non respondit, gummi misto digerant in formas, & ita vendant. Quod genus, vt vitiosum improbat. Fit & quædā ærugo ab aurificibus, mortario & pistillo cyprii æris, cum vrina pueri impubis, qua aurū ferrumināt. Antedicta æruginū genera, vñto æri correspondent. Sed magis effectu valent. Sciendum fossilem scoleciam præstantissimam esse. Derasam sequi, postremo loco facticiam. Mordacissima tamen est & magis adstringens. Aurificum autē ærugo rasa correspondet. Aerugines omnes adstringunt, extenuant, excalfaciunt. Oculorū cicatrices emendant. Lachrymas cient. Nomas fistunt. Vulnura ab inflammatione tuentur. Vlcerā ex oleo cæraq; ad cicatricem perducūt. Callos & sordida vlcerā purgant, cum melle coctæ. Callum fistularū erodunt, cum ammoniaco, collyrii modo in eas adactæ. Ad gingivarum autem excrescentias, & extuberationem vtilēs. Magnopere extuant genarum crassitiem, cum melle illitæ. Verum post illitionē spon-

gia ex aqua calida locus fouendus est. Resina terebinthina excepta: cū ære & nitro lepras abigunt. Vritur particulatim fracta, in fictili patina, flagrantibus prunis superposita. Versaturq; donec se mutet, & colore subcinerescat. Postea refrigerata reponitur. Sunt qui cruda olla eam vrant, vti dictum est, sed non prorsus eundem colorem cremata contrahit.

De Rubigine ferri. CAP. LXXXIIII.

Vbigo ferri restringit. Sistit sceminarum profluuium admodum.
 r Potuq; præstat ne concipiant. Illita ex aceto ignibus sacris, & papularum eruptionibus, medetur. Perquam utilis ad scabrias genarum, paronychia digitorum, & reduuias. Condylomata prodest. Gingiuas firmat. Podagras illita lenit. Alopecias replet. Vinum aquaue, in qua candēs ferrum sit restitutum, potu coeliacis, dysentericis, lienosis, cholera laborantibus, & dissolutis stomacho auxiliatur.

De Stercore ferri. CAP. LXXXV.

Tercus ferri quam scoriam vocant, eadem potest quæ rubigo, sed inefficacius. Aconito ex hydromelite potum opitulatur.

De Plumbo eloto. CAP. LXXXVI.

Otura plumbi sic fit, in mortarium plumbeum aquam iniiciens, pistillo plūbeo terito, donec nigrescat aqua, & succi modo crassescat, aut cœnosa reddatur. Linteolo deinde colato, aquam infundens, quo facilius quidquid est resolutum incerni possit. Hoc facito vsq; dum satis habuisse videaris. Vbi confederit, priorem aquam effundens, nouamq; adiiciens, vt cadmiam lauato, donec nulla extet nigricia. Postea in pastillos cogens reponito. Quidam scobem mundi plumbi lima quæritam, mortario lapideo pistilloq; terunt, aut manibus cum aqua paulatim adiecta fricant, donec nigrescat. Mox vbi crassamentum pessum ierit, colligunt in pastillos. Nam tritum vhemēter, cerusæ simile redditur. Alij elimatæ scobi modicam plumbaginem adiiciunt. Affirmantes ita elotum plumbum præstantius esse. Potest refrigerare, adstringere, obstruere, mollire, explere caua. Sistere oculorum fluxiones, & vlcerum excrecentia. Sanguinem suppressit. Prodest contra sedis vlcera, condylomata, & hæmorrhoidas ex rosaceo. Item ad ea quæ ægre cicatricē ducunt. Et in totum spodi effectus præbet. Nisi q non obducit crustas. Integrum plumbum affricu, marini scorpionis draconisq; plagis auxiliatur.

DE MEDICINALI MATERIA

De Plumbo vſto.

CAP. LXXXVII.

Ritur Plumbum ſic. Super q̄tenuiſſimas plumbi laminas, ſi
v ſtili nouo inditas, ſulphur inſpargito, additiſq; rursus lami-
nis, interiecto ſemper ſulphure, vſq; dum vas expleueris, ſuc-
cendito. Flagrante autem plumbo, ferrea rude verſato, donec perfecte
redigatur in cinerem, nihilq; non vſtum hæſerit. Tum demum obſtru-
tis naribus, eximito. Alioquin halitus plumbi noxiuſ ſentitur. Aut
elimatam ſcobem in olla cum ſulphure vrito. Alij laminas, in ſtili cru-
do, vt dictum eſt, imponunt fornaci, aut foco, et circumlinentes oper-
culum, dato exili ſpiramēto v runt. Alij pro ſulphure ceruſam aut hor-
deum inſpargunt. Alij integras laminas imponentes, acri igne vtun-
tur, & rudicula ferrea cōtinue mouent, dum in cinerem ſoluuntur. Sed
difficilis huiuſmodi vſtio. et ſi vehementius vratur, contrahit ſpumæ
argenticolorem. Magis placet nobis prima. Plumbum vſtum laua-
tur vt cadmia, & reconditur. Eoſdem effectus habet, quos plumbum
elotum ſed multo acriores.

De Recremento plumbi.

CAP. LXXXVIII.

Recrementum plumbi quod ſcoriam vocant, optimum eſt dē
r ſum, fractu cōtumax, ceruſam plane repræſentans, nihil plū-
boſi habēs, quod ad mali colorem accedit, & vitri ſplendorē
imitatur. Eadem quæ plumbum exuſtum poteſt, ſed magis adſtringit.
Lauatur in mortarijs iuſula aqua, & reſuſa ſumma aquæ parte, quæ lu-
teum colorem duxit. Idq; ſæpius, dum recrementum abſumatur. Dein
quod ſubſidit craſſamentum, aqua effuſa, digeritur in paſtillos.

De Molibdoide lapide.

CAP. LXXXIX.

Olibdoides lapis a plūbi ſimilitudine dictus. Correſpondē
m tem récremento vim habet, & eodem modo lauatur.

De Stibio.

CAP.

XC.

Timmi optimum quod ſplendidiffimum eſt, modoq; nitedu-
f larum emicat, contraſtu cruſtoſum, nihil terræ aut ſordidi ha-
bens, friabile, quod ſibi appellarūt, alij platyophthalmon,
alij Larbaſon, alij Gynæcion, alij Chalcedonion. Viſ eius adſtringe-
re, obſtruere, refrigerare, excreſcentia in carne cohibere, vlcera ad cica-
tricē perducere, ſordes & vlcera oculorū expurgare. Siſtit & ſanguinē
e cerebri membrana profluentem. Et vt in vniuerſum dicatur, viſ vſto
plumbo ſimilis eſt. Priuatim ambuſta igni, in cruſtas erūpere non pati-
tur, cum adipe recenti illitum. Cruſtoſas exulcerationes ad cicatricem
perducit, cum cara & exigua ceruſa. Torretur adipe circumlitum &

carbonibus obrutum donec carbunculetur adeps. Exemptumq; resinguitur mulieris lacte, quæ marem peperit, aut vetere vino. Vritur etiã carbonibus succensis efflatum, quoad flagret. Si enim paulo magis concremetur, plumbum fit. Lauatur vt cadmia & æs. Sunt qui vt plumbi recrementum eluant.

De molibdæna seu plumbagine. CAP. XCXI.

molibdæna optima est flaua, argenteæ spumæ æmula, modice splendens, cum teritur ruffa. Cotta cum oleo iocineris colorem trahit. Viriosa est, quæ aerem aut colorem plumbeum refert. Gignitur ex auro & argento. Est etiam quædam fossilis, iuxta seabastiã & corycum inuenta. Quo in genere probatur quæ lapidosa nõ sit, aut recrementosa, sed nitens & flaua. Vim habet spumæ argenti, aut recremento plumbi similem. Vritur lauaturq; eodem modo. Miscetur conuenientissime medicamentis, quæ liparas vocant, atq; emplastris minime mordentibus. Carnem recreat, & vlcera ad cicatricem perducit. Glutinantibus tamen medicamentis, aut abstergentibus non conuenit.

De Recremento argenti. CAP. XCII.

Recrementum argenti quod scoriam vocant, aut helcysma, aut encauma, molibdæna vim habet. Quare emplastris quæ phæas appellant, additur, ac medicamentis quæ cicatricem obducunt, vt pote cum adstringat, extrahatq;.

Di Spuma argenti. CAP. XCIII.

Spuma argenti quædam gignitur ex harena, quam molibditin vocant in fornacibus conflata, donec perfecte incandescat. Altera ex argëto. Tertia ex plumbo. Probatissima est attica. Secunda hispaniensis. Has sequitur quæ fit diæarchiæ idest puteolis, baijs, in campania, & Sicilia. Plurima enim hisce locis e flagrantibus laminis plumbeis gignitur. Quæ flauo colore splendet, chryfitis appellatur, melior cæteris. Quæ in Sicilia, argyritis. Quæ ex argento, calabritis. Vis autem adstringere, mollire, explere caua, excrecentia in carne reprimere, ad cicatricem ducere, refrigerare, & occludere. Vritur argëti spuma, cõfractis partibus ad magnitudinẽ iuglãdiũ, ita accẽsa solibus. Abstergitur infidẽs spurcicia, & recõditur. Aliquiquater aceto aut vino restiguetes, iterũ vrũt & eadẽ prosequuti, reponunt. Lauatur vt cadmia. Vt argyritidi nominatæ, aut si desideretur, alteri candor datur, ea in parteis magnitudine fabarũ cõfracta, chœnicis atticæ mēsurâ,

DE MEDICINALI MATERIA

fistili nouo superfusa aqua, adiectis candidi tritici quattuor sextarijs,
 priuatimq; pugillo hordei, linteolo raro auribus vasis alligato, coquitur,
 donec hordeum fractum dehiscat. Deinde omnia in nouum craterem
 oris ampli transfunduntur. Triticum abijcitur. Spuma argenti
 vehemēter manibus affricando, aqua lauatur, assiccataq; in thebaico
 mortario teritur, affusa feruēte aqua. donec dissoluatur. Excolata aqua,
 iterum tota die teritur, & vespri infusa calida aqua finitur. Mane co-
 lis excernitur. Alia infunditur atq; ter die excolatur. Id septē diebus
 fieri solet. Postea additis ad singulas minas spumæ argenti, quinis sa-
 lis fossilis drachmis, infusaq; calida aqua, ter in die teritur, & addita
 aqua excolatur. Cumq; inalbuerit, calida infunditur, dum nullā pro-
 fus falsedinem respiciat. Demum ardentissimo sole siccata, eiecto prius
 humore, reconditur. Sin minus, mina spumæ argyritidis diligenter te-
 ritur, addito sale fossili trito, triplicato pondere, in fistile nouum con-
 ijcitur. Aqua infunditur ita vt superemineat. Mouetur quotidie ma-
 ne et vespri, aquaq; superinfunditur, priore nequaquā effusa. Hoc fit trigi-
 ta diebus. Nāq; nisi moueatur crassescit, vsq; in duriciē testæ. Post hæc
 effusa leniter muria, in thebaico mortario spuma argenti teritur, conie-
 ctāq; in fistile aquam continens, manibus diligenter agitur, mutata
 subinde aqua, donec nullum falsedinis inditiū præbeat. Deinde quod
 ex argenti spuma candidum apparet, in vas aliud transfertur, & reda-
 ctum in pastillos, plumbea pixide conditur. Alij spumam argenti in
 fabarum magnitudines confractam, in ventre suillo crudo ex aqua co-
 quunt, dum viscus eliquescat, exemptamq; cum sale pari terunt, & vt su-
 pra dictum est lauant. Sunt qui salis libram vnā, & spumæ argenti
 tantundem, in sole terant, aqua continue mutata, dum candor ei detur.
 Alia ratio: Sumito quantamvis argenti spumā, vbi lana candida in-
 uolueris, fistili nouo indita aqua, cum pugillo fabarum recentium re-
 purgatarūq; decoquito. Cumq; fabæ disruptæ fuerint, lanaq; dealbue-
 rit, exemptam argenti spumam, & altera lana inuolutam, iterum coqui-
 to, cyathum aquæ & parem fabarum modum adiiciens. Eadem tertio
 quæ supra, facito. In summa tantisper, dum lana iam non inficiatur. In
 super transfundens in mortarium, ad singulas salis fossicij libras, adijci-
 to octogenas spumæ argenti drachmas articas, & terito, intermittensq;
 nitri q̄albissimi cum aqua diuisi, drachmas. xlvij. indito. Iterum te-
 rito, donec satis candoris contraxisse videatur. Ita autem fundēs eam
 ex alto in fistile oris apli, adiecta largiore aqua, vbi cōsidere desierit, co-
 lato. Vicissim eadē proseguere, dū pura aqua dulcisq; effluat, & nullam
 falsedinem præ se ferat. Postremo in fistile nouum translata, cola-
 to sensim omni humore, soli quadraginta diebus, sub caniculæ fidus

LIBER QVINTVS.

131

exponito, & ficcata vritor. Elotam autem constat ad oculorum collyria prodesse, & ad cicatricum fœditates tollendas, ad rugofas facies, & cicatricofas, laceratasq; et macularum plenas.

De Cerusa.

CAP. XCIII.

Erufa fit hoc modo, infuso in vrseum oris lati aut fistile label
 c lum q̄acerimo aceto, laminam plumbeam supra fistilis spiraculum, subiecta prius arundinea tegete, firmato, superie
 ritq; velaminibus, ne halitum expiret acetum, vbi resoluta fuerit, de
 fluēsq; deciderit, humorem purum ad summa delatum colato. Crassa
 mentumq; transfundito. Debet quoq; ficcari in sole, mox trusatili mola
 teri, alioquin tritum cribrari. Postea quod superest duri, in tenues par
 tes redigendum, cribrandumq;. Vicissim eadem tertio quartoq; fa
 cienda. Melior quæ primo cribrata est, & medicamentis oculorum as
 sumenda. Secundum locum tenet sequens, & reliquæ suo ordine. Nec
 desunt qui ligneam rudem, in medio vase appendant, & supra cratem
 plumbū imponant, ita vt acētū nō contingat, inditoq; operculo circū
 linentes dimittunt. Post dies aliquot, laxato obturamēto visunt. Cūq;
 resoluta materia fuerit, reliqua vt supra diximus exequuntur. Si autem
 quis in pastillos velit digerere, aceto acri subacta diuiditur, in pastillos
 qui in sole ficcantur. Aestate tamē supradictū opus obeūdū est. Ita enī
 cādida atq; efficax redditur. Quinetiā hyeme paratur, vrseis supra fur
 nos, balnea, aut fornaces impositis. Ascendens enī calor, idē quod sol
 præstat. Laudatissimam fieri putāt rhodi, & corinthi, aut lacedemone.
 Proximā puteolis. Torretur hoc modo. Flagrantibus igni carboni
 bus, fistili nouo maxime attico, tritā cerusā iponito, & assidue versato.
 Cūq; cinereū colorē traxit, eximens refrigerato, & vritor. Est & aliud
 vrendi genus. Trita patinis supra prunas imponitur, & ferulacea ru
 de mouetur, donec similis sādarachæ fiat. Extractaq; ad vsus ministra
 tur. Quæ vero ita parata est, sandyx a quibusdam dicitur. Lauatur ce
 rusa cadmiæ modo. Vis ei adstringere occludere, emollire & explere.
 Insuper excrescentia reprimere, & ad cicatricem perducere. Miscetur
 cæratīs & emplastris quæ liparæ vocantur, pastillisq;. Est autem leta
 lis eius potus.

De Chryfocolla.

CAP.

XCV.

Chryfocolla laudatissima Armeniaca, colorem porri q̄ simil
 c lime reddens. Secundum locum sibi vendicat macedonica
 & proximum cypria. Quo in genere præfertur pura. Damna
 tur quæ terram aut calculos collegerit. Ratio lauandi hæc est. Tusam
 infusa aqua, mortario expassa manu ad pilam vehementer fricato,

DE MEDICINALI MATERIA

& statim q̄ confederit colato. Alteram infundens aquam, rursus terito. Hæc vicissim prosequere, donec pura syncæraq̄ spectetur. Dein ficcato in sole, & ad vsus recondito. Quod si vrere volueris, ex ea res quod satis esse videbitur, patinis supra carbones adponito, & alia facito quæ supra diximus. Dos chrysocolle ad purgandas cicatrices. Excrecentem carnem coercet. Adstringit, purgat, excalfacit, & modice corpus mordendo exest. Inter medicamenta intelligitur, quæ vomitiones concitant, & necem inferre possunt.

De Armenio lapide. CAP. XCVI.

Rmenius lapis præfertur læuis, colore cæruleo, perq̄ æquabilis, calculo carens, & friabilis. Eadem quæ chrysocolle præstat, sed inefficacius. Quinetiam vsus habet ad pillos in palpebris alendos.

De Cæruleo. CAP. XCVII.

Aerulci origo ex ærarijs metallis in cypro. Copiosius ex hærena littorali, secundū quosdam sub cauatos specus maris inuenitur, quod magis probatur. Eligi debet merum. Vritur vt chalcitis. Lauatur vt cadmia. Vim habet reprimentem & modice erodentem. Crustas gignit, & exulcerat.

De Indico. CAP. XCVIII.

Indici duo genera, vnum sua sponte nascitur, tanquam spuma germinatione, indicis harūdibus exiens. Alterum insectoriæ dant officinæ. Et est spuma purpurea innatans corticibus, quam detractam artifices siccant. Optimum existimatur, quod cærulei speciem præbet, succosum, & læue. Inter medicamenta est quæ velociter adstringunt, & inflammationes tumoresq̄ rumpunt. Purgat & reprimunt vlcera.

De Ochra. CAP. XCIX.

Chram leuissimam, & vehementer luteam eligere oportet, meram & aliena materia vacantem, non lapidosam, friabilem, natione atticā. Vritur hæc, & lauatur cadmiæ modo. Vis eius adstringere, erodere, collectiones & tubercula dissipare. Excrecentia in carne reprimunt. Caua cum cærato explet. Et articulorum tofos cominuit.

De Cinnabari. CPA. C.

Allucinantur qui cinnabarin minio eandem esse existimant. Minium enim in hispanijs ex ladique quodam argentæ harenæ permisto, temperari solet. Alioqui nō dignoscitur. Fornacibus autem in florentissimum flagrantissimumq̄ colorem permutat. In metallis vero strangulantem halitum eruat. Itaq̄ facies

incolæ veficis obuelant, vt per illas ſpectent, nec respirando noxium aerem attrahant. Ea piſtores ad ſumptuoſa parietum honeſtamētā vtūtur. Cinnabaris quæ ex Aphrica deſertur, magno cōſtat. Haſtenus inuenitur, vt vix verſicoloribus piſtorū lineis ſatiffaciat. Denſū nec dilutum colorem reddit. Quare quidem ſanguinem eſſe draconis exiſtimauerūt. Vim habet cinnabaris hæmatitæ lapillo eamdem, verum efficaciore. Cōuenit ad oculorum medicamenta. Magis enim adſtringit, & ſanguinē cohibet. Ambuſtis igni, & papularum eruptionibus cærato excepta medetur.

De Argento viuo.

CAP.

CI.

Argentum viuum fit ex minio, quod abuſue cinnabaris dicitur. Patinis ſtæilibus, impoſita ferrea concha cinnabarin continente, & calice cooperta, argilla ſuperlita, carbonibus ſuccendunt. Siquidem deterſa fuligo, quæ calici infidet, refrigerata in argentum viuum coit. Quinetiam inuenitur in argenti fodinarum teſtis, ſtillatim concretum. Alij per ſeſe in metallis inueniri tradunt. Seruatur in vitreis, aut plumbeis, aut ſtagneis, aut argenteis vaſis. Siquidem aliam materiam omnem exedit, & deſluere facit. Potum vim pernicioſam habet. Suo enim pondere interna exeſt. Remedio eſt lac multum, ſubinde potum, & vomitionibus reiectum, aut vinum cū abſinthio, aut apij decoctum, aut ſemen ormini, aut origanum, vel hyſſopum cum vino. Auri limata ſcobs, id eſt ramētum q̄tenuiſſimum epotum, mirabili eſt auxilio.

De Rubrica ceu minio ſinopico.

CAP.

CII.

Inium ſinopicum maxime probatur graue, denſum, ad iocineris imaginē vergens, calculorū expers, cōcolor, in reſolutione ſuccoſum. Effoditur in capadocia ſpeluncis quibuſdā, expurgaturq; deſertur in ſinopen vr̄bem, in qua v̄nditur. Vnde cognomentum accēpit. Vim habet exiccatoriam, quaſi inducendo obſtruentem, & adſtriſtoriam. Quapropter vulnerarijs emplaſtris, & paſtillis exiccantibus, & adſtriſtorijs commiſceri ſolet. Alium ſiſtit, in ouo ſumptum, aut clyſtere inſuſum. Datur iocineris vitio laborantibus.

De Rubrica fabrilī.

CAP.

CIII.

Rubrica fabrilis, ad omnia ſinopide inferior eſt. Optima ægyptia. & cartaginēſis, lapidum expers, friabilis. Gignitur in Iberia quæ ad occidentem ſpectat, ochra exuſta, & degeneraſtein rubricam.

DE MEDICINALI MATERIA

De Lemnia terra.

CAP.

CIIII.

Emnia terra, cuniculoso in specu nata e Lemno insula, palu-
stri loco defertur, inibi electa, & caprino sanguini permista.
Quam incolæ cogunt in pastillos, & imagine capræ signant.
Vnde & *sphragida* appellauere. Vim antidoti habet, contra pernicio-
siosa venena singularem. Pota cum vino & præsumpta euomi venena
cogit. Contra ictus morsusq; animalium, quæ exitiale virus eiaculan-
tur, prodest. Antidotis familiaris. Sunt qui hac ad sacrificia vrantur.
Est & dysenterix vtilis.

De Attramento futorio.

CAP.

CV.

Attramentum futorium genere quidem vnum & idem est, mol-
le & concretum. Sed in specie differentias treis habet. Vnum
namq; humoribus stillatim in cuniculos quosdam colatis, cõ-
crescit. Quare ab ijs qui cypria metalla perficiunt, stalactis appellatur.
Petecius ipsum pinarion vocat, alij stalacticon idest stillaticium, alij
pecton, Ephthon, Aracton, Lonchoton. Alterum simplici ratione fit
in speluncis. Postea transfusum in excauatos scrobes, concrementum
capeffit. Quod pecton, id est concreticium, proprie nominatur. Ter-
tium dicitur coctile, & in hispania fieri solet. Sed inutile, ac inualidissi-
mum esse constat. Ratio paradi hæc est. Aqua madefactum decoquunt,
mox in piscinas transfundunt, & residere patiuntur. Hoc certis diebus
coalescit, in complureis formulas digestum, tesserarum speciem reddẽ-
tes, quæ racematim inter se cohærescunt. Optimum esse creditur, cæ-
ruleum, graue, concretum, translucens. Cuiusmodi stillaticium est. Ab
alijs lonchoton nominatum. Proximum concreticium. Coctile vero
ad insectus & denigrationes, aptius cæteris esse cõpertum est. Sed ad
medicinæ vsum inualidius esse, experimenta docent. Valet adstringe-
re, calfacere, & crustas inducere. Latas ventris tineas necat, drachmæ
pondere deuorat, aut cū melle linat. Vomitus ciet. Aduersus hauri-
sta fungorum venena, ex aqua potum auxiliatur. Purgat caput aqua di-
lutum, & in vellere naribus instillatum. Vritur vt paulopost in men-
sione chalcitis ostendemus.

De Chalcite.

CAP.

CVI.

Chalcitis præfertur similis æri, friabilis, nec lapidosa, nec inue-
terata, intercurrentibus oblongis venis, splēdētibusq;. Huic
absterforia vis inest, excalfaciens, & crustas vlceribus obdu-
cens. Purgat quæ oculis & eorundem angulis hærent. Ad ignem sa-
crum, & vlcera quæ serpunt, efficax est. Sanguinem e vulua & naribus
erumpentem, cum succo porri sistit. Carunculam gingiuis enatam, de-
pascencia vlcera, tonsillalq; eius farina compescit. Vsta & cū melle tri-

ta, oculorum medicamentis longe vtilior redditur. Callū genarum & scabriciam absumit, abstergetq̃. Fistulas tollit collyrij modo, in eas adacta.

De Psorico.

CAP.

CVII.

It ex ea medicamentum quod psoricon vocant, duabus chalcitis partibus, cum vna cadmiæ additis, & ex aceto tritis.

Oportet autem in fistili, obruere fimo, diebus quadraginta per caniculæ ardores, sic enim fit acrius. Idem quod chalcitis potest. Alij pares vtriusq̃ portiones in vino terunt. Vritur chalcitis fistili nouo, viuis carbonibus superposito. Modus autē vstionis in humidioribus, est dum ipsa chalcitis bullas excitare desierit, & perfecte inaruerit. In reliquis vero dum mutata in floridum colorem fuerit, & sanguineum aut miniatum colorem contraxerit. Tum demū eximenda est. In fidens autē spurcicia flatu expellenda. Mox reponēda. Torretur etiā nū perflatis carbonibus, vsq̃ dū luteo colore paleseat. Aut fistili subditis candentibus prunis, subinde versata, donec conflagret & colorē mutet.

De Misy.

CAP.

CVIII.

Isy assumendum natione cyprium, auri simile, durum, quod friando auri colorem imitatur, & stellæ modo splendet. Vim habet & vstionem cum chalcitide eadem, citra psorici compositionem, excessu defectuq̃ differēs. Aegyptium autem cæteris præstat, vt pote quod efficacius habeatur. Sed ad ocularia medicamenta multo supradictio inferius.

De Melanteria.

CAP.

CIX.

Elanteria geminæ est originis, quædam in faucibus cuniculo rum quibus æs eruitur, salis modo concrescit. Alia vero in summa facie supradictorū locorū coit, quæ terrena est. Quin etiam inuenitur in Cilicia, & alijs quibuscūq̃ regionibus, fossilis quædam. Præstat quæ sulphuris colorem trahit, læuis, pura, æquabilis & quæ cōtactu aquæ confestim nigrescit. Vim causticam obtrinet misy similem.

De Sory.

CAP.

CX.

Ory existimarūt aliqui melanteriā esse, aberrātes. Siquidem sui generis est sory, ei nō abfimile. Verū sory virus inest graue, & nausæa mouens. Inuenitur etiam in ægypto, & alijs quibuscūq̃ regionibus, vt in libya, hispania, & cypro. Præfertur ægyptiū quodq̃ frianti nigrius apparet, spōgiosum, suppingue, insuper adstrin-gens, & olfactu deuorationeq̃, magnum virus olens, ita vt stomachus in vomitiones effundatur. Quod autem friatum scintillas misyos mo-

DE MEDICINALI MATERIA

do non emittit, & alterius generis esse, & inualidū censendum est. Vim & vñionem supradictis similem habet. Dolori dentium, cauernis inditum medetur. Labantes firmat dentes. Ischiadicis ex vino infusum auxiliatur. Illitum cum aqua varos extinguit. Medicamentis ammiscetur, quæ capillos denigrant. Hæc autem fere omnia quæ vñionem exserta non sunt, perustis validiora esse existimantur, præter salem & vini fecem, nitrum, calcem, & consimilia, quæ cruda remissiora sunt. Cōbusta enim viribus efficaciora redduntur.

De Diphryge.

CAP.

CXI.

Iphrygis tria genera esse creduntur. Quoddam enim metallum cum est, quod in cypro sola gignitur. Lutosum namq; deferatur, ex luto cuiusdam inibi regionis, postea delatum, sole siccat, mox circūpositis sarmentis vritur. Diphryges ideo vocatū est, q̃ & a sole & a sarmentis vritur, areseat, & ferme torreatur. Alterum perfecti æris, quasi subdens fex est. Siquidem post frigida aquæ offusionem, vt supra retulimus, cum de flore æris differeremus, sublato ære fornacum ima parte cohærens id genus inuenitur, & adstrictionem & gustum æris habens. Tertium sic fit. Lapidem pyriten vt calcem cremant, in camini aliquot diebus, cumq; colorem rubricæ contraxerit, eximentes recondunt. Quidam tradunt ex sola materia lapidem æris gignēte fieri, quoties in dictis areis assata & in scrobes trāsata peruratur. Tunc enim ambientem scrobis locum compræhendit, & exemptis lapidibus æquale nihil inuenitur. Præfertur quod saporem æris reddit, rubiginosum, adstringens, & linguam vehemēter exiccans. Quod sibi exusta ochra nō vēdicat, quæ cremata diphrygis vice vānit. Vis eius adstringere, perpurigare, excreſcentia consumere, vlcera serpentia & quæ cacoethe vocant, ad cicatricem perducere. Suppurationes te-
rebinthina aut cærato exceptum discutit.

De Auripigmento.

CAP.

CXII.

Vripigmentum in eisdem metallis, quibus sandaracha, gignitur. Optimum existimatur crustosum, aureo colore micans, nulli materiæ permistum, fissile. Quale myſiæ & helespontō nascitur. Huius duo genera fluxerunt. Vnum supradictum est. Alterum glandis effigie, pallidum, & colore sandaracham imitans, glebosum. Ex ponto & cappadocia deferatur. Secundum locum tenet, has nādum dores. Torretur in testa noua viuīs carbonibus subiectis. Affiduoq; versatur, donec igne flagret, & mutet colorem. Deinde refrigeratum, tritumq; reconditur. Vim habet adstrictoriam & erodētē. Cruſtas cum vehemēti punctione excitat. Reprimit quæ excreſcunt, & capillos euellit.

Andaracha probatur ruffa, & aliena materia vacans, friabilis, cinnabaris colore, sulphuris virus redolens, Dos eadem & vſtio, quæ auripigmento, Explet alopecias, refina excepta.

Scabros vngues eximit. Contra phthiriaſin ex aceto efficax eſt. Tubercula cum adipe diſcutit. Prodeſt ad narium oriſq; vlcera, & cæteras papularū eruptiones cum roſaceo. Item condylo mata. Datur ex muſſo purulenta extuſſientibus. Suffitur quoq; cū refina, aduerſus veterem tuſſim, rapto per fiſtulam nidore. Vocem expedit, cū melle delincta. Suſpirioſis cum refina in cataportio, optime datur.

Mne aluminis genus ſere in ægypto, & eiſdē metallis inuenitur. Eſt enim, ſciſſile quoddam, quaſi flos ſudorve cieticius terræ. Gignitur & in alijs quibuſdā locis, in melo, in macedonia, in Liparis, Sardoniam, Hierapoli Phrygiæ, Aphrica, Armenia, & pluriſq; alijs regionibus, rubricæ modo. Plurimæ eius ſpecies, verū ad medendi vſum, ſciſſile, rotundum & liquidum expetuntur. Optimum eſt ſciſſile, præſertim recens, candidiſſimum, guſtu perq; adſtringens. Calculorum expers, nec glebuſe aut aſſuloſe compactū, ſed ſigillatim in capillamenta quædam caneſcentia dehifcens. Quale eſt quod trichitis, quaſi capillare nominatur, in ægypto natum. Reperitur quoq; lapis huic alumini perſimilis, qui guſtus iudicio dignoſcitur, q; nō adſtringat. Damnatur in rotundi genere, quod manu cōſiſtum eſt. Sed ex figura depræhenditur. Aſſumendum autem ſuapte natura rotundum, builis turgens, albo proprius, atq; validius adſtringēs. Præterea non nihil paloris cū quadam pinguedine præſeferens, ſine harenis, friabile, natione ægyptium, aut ex infula melo. Liquidi probatio, vt ſic lymapidū, laſteum, æquale, & ſemper ſucco madēs, ſine lapidibus, atq; quædam caloris igniculum expirans. Vim habent excaſiificandi, ſtringendi, ſanandi, & expurgandi, quæ caliginem papillis oculorū offundūt. Genarum carnem, cæteraſq; excreſcentias extenuant. Sciſſile rotundo efficacius intelligitur. Vri & torrerī chalcitidis modo debēt. Putreſcētia vlcera compeſcunt. Sanguinis fluctiones inhibēt. Gingiuas humore prægnantes comprimunt. Motus dentium cum aceto & melle firmant. Proſunt cum melle vlceribus oris, eruptionibus papularum, & fluctionibus aurium, cum ſanguinalis hærbæ ſucco. Lepris conueniūt cum braſſicæ folijs aut melle cocta. Item pruritu & vnguuium ſcabricijs, pterigijs & perſionibus, aſperſa cum aqua. Valent cum aceto, fæce & galla, pari pondere cremata, ad phagedanas vlcerum, & cū ſalis duabus partibus, ad vitia quæ paſcunt. Furfures cum eruo & picē

DE MEDICINALI MATERIA

illita abstergunt. Ad lendes, pediculos, ambusta, cum aqua illita auxilio sunt. Contra tumores, & graue alarum inguinumq; virus, illiniuntur. Ex melo autem aduectum mulieribus præstat ne concipiant, ante coitum ori vuluæ inditum. Partus quoq; extrahit. Gingiuus si caro excreuit, vuæ, ac tonsillis, accommodantur. Auribus et verendis cū melle illinitur.

De Sulphure. CAP. CXV.

¶ Vlpur optimum existimatur viuum, quod apyron vocat, nitedulæ modo splendidum, perlucens, minime lapidosum. Probatum in genere sulphuris ignē nō experti, quod viret, ac præpingue spectatur. Plurimū in melo & lipara gignitur. Supradictū sulphur calcacit, discutit, & celeriter concoquit. Prodest tussibus, suspuriosis, purulenta extussientibus, in ovo sumptum, aut suffitum. Præter ea partus, vili nidore extrahit. Lichenas, scabros vngues, cum resina terebinthina mistū, aufert. Cū aceto autē, illitū ad lepras efficax est. Vitilignes tollit. Scorpionis ictibus addita resina medetur. Cū aceto vero, draconis marini scorpionisq; plagas sanat. Pruritus toto corpore erūpentes, cū nitro deterfū sedat. Regiū morbū emēdat, insparsū fronti cochlearis mēsurā, aut in forbili ouo sumptū. Facit ad grauedinē, & destillationes. Sudores quoq; cōspersum inhibet. Podagricis cū aqua et nitro illitū, conducit. Grauitatē auditus, suffiti nidore raptim perfistulam hausto, sanat. Lethargicos suffitu excitat. Eumpentem vnde cūq; sanguinem sistit. Fractis auribus cum vino & myrrha illitum medetur.

De Pumice. CAP. CXVI.

¶ Vmicis probatio, vt magnopere leuis, spongiosus, teri facillius, nec harenosus, item fragilis, & cādidus. Crematur flagrantissimis carbonibus obrutus, & vbi canduerint, extractus, vino restringitur odorato. Iterūq; incensus extinguitur, & tertia vsitione exemptus & per se refrigeratus, ad vsus conditur. Vis eius adstringere, gingiuas abstergere. Purgat cum calfactione, quæ caliginem pupillis offundunt. Explet vlcera & ad cicatricem perducit. Excrecentia cohibet. Fit ex farina eius dentifricium. Corpori crustam obducit. Auellendis capillis aptus. Theophrastus author est, si quisq; in bullientem vrseum vini pumicem iniecerit, feruorem statim sedari.

De Sale. CAP. CXVII.

¶ Alfossilis efficacior est, cōmuniter si est candidus, calculis vacans, & perspicuus, densus, æquali compage. Peculiariter ammoniacū genere laudatur, si modo findi facile possit, rectisq; legminibus diduci. In marino sale eligendus est candidus, æqualis,

Probatissimus in cypro fit & salamine cypri, & megaris, in Sicilia & Aphrica. Sed inter dicta salis genera lacustris præfertur, sed multo validissimus est phrygius, noie tapeus aut tritæus aut gantæus. Salis natura. In cōmune perq̃ vtilis est. Adstrigir, absterget, expurgat, dissipat, reprimir, extenuat, & crustas inducit. Sed hoc interest, q̃ alius alio fit præstātor. Quin & a putredine vdicat. Ammiscetur medicamētis pforas abstergētibz. Excrecētia in oculis reprimir, & pterygia cōsumir. Cæterasq̃ carnis extuberationes tollit. Clysteribus infūdītur. Discutit lassitudines ex oleo illitus. Cōtra hydropicorū tumores auxiliatur. Dolores in faccis foru mitigat. Et pruritus sedat, ex oleo & aceto infriētus, donec ad ignē fudent. Itē lichenas, lepras, pforasq̃. Anginā ex melle, aceto, & oleo illitus leuat. Tonillis vuæq̃ cū melle tostus, vlcēribz in ore manantibus, gingiuis quas humor vexat, & phagedænis vlcērum cum polenta crematus illinitur. Aduersus scorpionū iētus cum lini semine. Contra serpentium morsus cum origano, melle, hyssopo. Aduersus cerasten cum pice aut cedria aut melle auxiliatur. Contra scolopendræ morsus cum melle & aceto. Aduersus vesparum iētus, & crabrones, albidasq̃ capitis pustulas, thymos, & tubercula cū seuo vitulino. Furunculos cum vua passa, aut suillo adipe, aut melle discutit. Testium tumores cum origano & fermento maturius concoquit. Crocodilorū moribus auxiliatur, tritus in linteolo & intinētus aceto, ita vt vinctulis loca constringantur. Prodest ad bestiarum morsus, sugillationes in facie, ex melle. Contra haustum opium & fungos, cum aceto mulso bibitur. Luxatis imponitur cum farina & melle. Ambustis igni cum oleo impositus, pustulas erumpere nō patitur. Podagricis itidem imponitur, & aurium doloribus cum aceto. Ignēs sacros & vlcera quæ serpunt cum aceto aut hyssopo illitus fistit. Vritur fistili, diligenter opertus, conditusq̃ prunis, vsq̃ dum efferuescat. Aliqui fossilem subaëo polline, obliniunt & carbonibus subiiciunt, vsq̃ dum pollen exuratur. Solet & sal comūnis eodē modo vri. Sed aqua semel abluitur & ficcatus in ollam cōopertam mittitur, subdito ignē, moueturq̃ donec iam non exiliat.

De Spuma salis.

CAP. CXVIII.

h Alos achne spumosi salis ramentum, in exilibz petris inuentum, cui vis eadem quæ sali.

De Muria

CAP. CXIX

m Vria effectus salis præbet: Abstergitq̃. Dysentericis infunditur, etiam si nome intestina corripit. Ischiadicis veteribus ad forus, aquæ marinæ vsum præstat.

DE MEDICINALI MATERIA

De Flore salis.

CAP. CXX.

f Los salis flumine nilo defluit. Lacubus tamen quibusdam innatat. Assumendus qui crocei coloris est, odore ingrato, ceu gari. Interdum longe magis virus olet, gustuq; mordacior, et pinguius lētus. Fucatus autem rubrica, aut scrupulosus, improbatur. Præterea syncærus nō nisi oleo resoluitur. Adulteratus nonnulla ex parte, etiam aqua diluente fastidium colorem. Ad vlcera quæ cacoethe vocantur, & phagedænas, genitalium nomas, & purulētas aureis, effi-
cax est. Oculorum hebetudines, cicatrices, albuginesq; tollit. Empla-
stris vnguentisq; coloris causa, vt rosaceo, miscetur. Sudorem cit. Al-
uum turbat in vino aut aqua sumptus. Stomachum male habet. Addi-
tur acopis & smegmatis, quæ albandi capilli gratia componuntur. Et
in vniuersum acris est, & feruentis naturæ vt sal.

De Nitro.

CAP.

CXXI.

p Ræfertur nitrū leue, roseo colore, aut candido, in foramina dehiscens, perinde quasi spongiosum quiddā. Quale ex illy-
rico affertur, a buniorum ciuitate. Humores transfert qui ali-
cubi concreuerunt.

De Spuma nitri.

CAP.

CXXII

f Puma nitri optima esse putatur, leuissima, glebosa, friabilis, colore pene purpureo, aut spumosa, & mordens. Qualis ex philadelphia lydiæ defertur. Secunda est ægyptia. Quin & in magnesia cariæ gignitur. Vim & vitionem salis habet, tam nitrum q̃ spuma eius. Præterea nitrum tormina sedat, si tritum cum cumino bi-
batur, in hydromelite, aut sapa, aut aliquibus quæ inflationes discute-
re possunt, vt ruta vel anetho. Febribus circuitu redeuntibus illini-
tur, ante suspectam accessionem. Miscetur emplastris, quæ extrahunt,
& discutiant, extenuant, & lepras abstergunt. Cum aqua autem calida
aut vino infusa inflationes, purulentas aureis, & sonitus ex eundem
sanat. Sordes expurgat, cum aceto instillata. Canum moribus ex ali-
nino adipe aut suillo medet. Resinæ admista furunculos aperit. Aquæ
inter cutem cum fico illinitur, opisthotonisq; iam remissionibus & luxa-
tis cum carato. In resolutione linguæ, panis cōmode permiscetur. Ali-
qui supradicta carbonibus vrunt subiecta prius testa noua, donec incā-
descant.

De Fax.

CAP.

CXXIII.

e Ligenda fax maxime a vino vetere, italico, sin minus ab alio
consimili. Fax aceti viribus longe acrior est. Crematur vt al-
cyonium ante diligēter ficcata. Sunt qui noua testa igni lar-

go, vrant, vsq; dum penitus incandescat. Alij viuis carbonibus facis glebam obruunt, & idem opus prosequuntur. Experimentum est legiti-
 timæ vstionis, vt acrio nitore inalbescat, linguamq; tactu vrere videatur. Eadem vrendæ facis aceti ratio. Vis eius supra modum vrens, & abstergens: Vlcera ad cicatricem perducit. Vehementer exest, siccatq;. Sed recenti vtendum est, quoniam celeriter exnimatur, aperta, & nullo vase cõdita. Layatur vt Pompholyx. Quæ vstionem experta non est, tumores & per se se, & cum myrto cohibet. Ventris stomachiq; studio-
 nes illita sistit. Muliebri profluuium, imo ventri aut genitalibus imposita, mitigat. Panos discutit, nõdũ exulceratos, & tubercula. Tur-
 gentes mamas suisq; laetis impatientes, cum aceto peruncta extinguit. Cum resina vero ambusta & scabros vngues auferit. Addito lentiscino oleo illita nocte tota, ruffat capillum. Elota oculorum medicamentis vt spodos adijcitur. Cicatrices & eorum caligines eadem abstergit.

De Calce.

CAP.

CXXIII.

Alx hoc modo fit. Marinorũ buccinorum testas igni condi-
 c to, aut feruenti clibano nocte dimittito, postera die si candidif-
 ima fuerit, extrahito. Sin aliter, iterũ vrito, vsq; dũ vehemẽ-
 ter inalbuerit. Dein vbi in aquam frigidam immersa fuerit, in fictile no-
 uum conijcito, et exacte pannis operiens, noctem vnã conuiescere
 finito. Mane eam extrahens, si ad intentum finem perducta est, recõdi-
 to. Fit & e glebis lapidum crematis, necnon e vili marmore, quæ cate-
 ris præfertur. Vis omni calci in commune ignea, mordens, adurens, &
 crustas inducens. Quibusdã alijs immista vt adipi, oleo, concoquen-
 di vim assumit & dissipat. Vlcera ad cicatricẽ perducit. Efficacior exi-
 stimatur recens nec aspersa aquis.

De Gypso.

CAP.

CXXV.

g ypsum vim habet adstringendi, obstruendi. Sanguinis eru-
 priones sudoresq; cohibet. Sed potũ strangulat, quodam suf-
 focationis modo.

De Sarmenticio cinere.

CAP.

CXXVI.

f Armentorum cinis vrendi vim habet. Cum axungia autem
 vel aceto illitus, fractis neruis, articulorum collisionibus, &
 neruorum nodis prodest. Cũ nitro & aceto excrecentias car-
 nis in scroto reprimat. Serpentium canumq; moribus illitus ex aceto
 medetur. Crustas obducentibus medicamentis ammiscetur. Fit ex eo
 lixiuium contra præcipitationes, & fungorum venena, cum aceto sa-
 le & melle.

De Alcyonio.

CAP.

CXXVII.

a Lcyonij quinq; esse genera compertum est. Vnum enim spissu-
 sum, acerbi saporis, spõgiola facie. Item tetri odoris, ponde-

DE MEDICINALI MATERIA

rosū, & piscem olens, quod plerumq; in littoribus inuenitur. Alterū piannulæ oculorū aut spongiæ simile, fistulosum, & leue, odorem algæ referens. Tertium vermiculi forma, & colore, magis purpureum, quod milesum vocant. Quartum succidis velleribus nō dissimile, spōgiosum, leue. Quintum figura fungi, sine odore, asperum, parte interna quodammodo punicosum, foris læue, acre. Quod plurimū in propōride iuxta insulam bescicon appellatam gignitur. Patrio nomine hælōs achnen vocant. Duo priora, in fœminarum smegmatq; assumuntur. Cōtra lentigines, lepras, vitiligines, nigricias, & maculas in facie reliquoq; corpore. Tertium ijs qui difficili vrina vexantur, aut harenulas in vesica colligūt, idoneum est. Item renibus affectis, aquæ inter cutē, leni. Vsum autem & ex vino illitum alopecias replet. Postremum de albandis dentibus aptum est. In alia absterforia, phlothraq; assumitur cum sale mistum. Si quisquam alcyonium cremare velit, in crudum fœtile mittat, & oblinens vasis spiraculum luto, ita fornaci mandet, & cum figlinum percoquetur, extrahens ad vsus recondat. Lauatur vt cadmia.

De Adarche. CAP. CXXVIII.

It in cappadocia quod adarches appellatur. Est autē concreta falsilago, humidis & palustribus locis fœccitate emergens, & harundinibus ac hærbus agglutinata, colore flori lapidis asatici similis, & omni forma molli alcyonio, & aliquantum cauo proxima, tanq̃ lacustre alcyonium esset. Ad euellendas lepras, lentigines, lichenas, & vicia cutis in facie, accomodatur. Et in summa vis ei acris. Humorem euocat qui in aliqua parte concreuit & ischiadicis prodest.

De Spongijs. CAP. CXXIX.

Spongijs alias mares appellauere, tenui fistula, spissas, quarū duriores tragos nominarunt. Fœminas autem quæ contrarias dotes habet. Vruntur eæ vt alcyonium. Recētes sine pinguitudine vulneraria sunt, & tumores reprimūt. Recentia vulnera ex aqua poscave conglutinant. Veteres sinus ex decocto melle fungūt. Vtultæ autē inutiles. Aridæ & ligatæ lino, si penicilli modo adigantur, occlusa vlcera, callosq; laxant. Recentes & vacuæ senilia vlcera, & quæ fluxu dione laborant, aut cuniculatim exedunt, impoſitu siccant. Sanguinis profluuium sistunt. Crematarum cinis ex aceto, aridæ lipipitudini auxiliatur. Et vbi quid abstergere aut adstringere opus est. Vrius, in oculorum medicamentis lauare cinerem. Omnium cinis cum pice crematarum, profluentem sanguinem sistit. Candidæ cura fiunt, & molliſſimis recētes, per æstus tinctæ salis spuma, quæ petris cohæ

ret, insolantur in uersa, hoc est parte caua sursum spectate. & qua adhæ-
sere, deorsum. Si vero æstiuâ serenitate ad lunam sternantur, perfusa sa-
lis spuma, aut maris aqua, maximum candorem referent.

De Corallio.

CAP.

CXXX.

Oralliū quod aliqui lithodædron appellant, marinū esse
c fruticē cōstat, qui imo extractus duratur statim atq; emergit,
tanq̃ offuso aere protinus concresecat. Plurimū inuenitur sy-
racusis, in promontorio cui pachyno nomen est. Laudatissimum rus-
bens, colore hastulæ regiæ, aut sandycis meri, nec secus tereti facile cea-
dens, æquabili vsque qua; cōcremēto, rursus algæ aut fuci marini odo-
re, graminosissimum, cinnamomi æmulum, forma fruticis. Quod autem
in lapidis duritiā coit, scrupulosum, inane, & lacunosum, vitiosum
existimatur. Adstringit & mediocriter refrigerat. Excresecētia coercet.
Oculorum cicatrices abstergit. Vlcera caua, & cicatrices explet. Cō-
tra sanguinis reiectiones magnopere efficax est. Vrinæ difficultati au-
xiliatur. Quin & potum ex aqua lienem absumit.

De Antipathe.

CAP.

CXXXI.

q Vod antipathes vocant, corallium esse arbitrantur, specie tā-
tum distās. Est autem colore nigro, arboris figura, ramōsum
magis. Vires supradicti habet.

De Phrygio lapide.

CAP.

CXXXII.

p Phrygius lapis quo infectores in phrygia vtūtur, a qua nomē
accepit. Nascitur in cappadocia. Optimus habetur palli-
dus, modice grauis, inæquali compage corporis, intercedēti-
bus albis segmētis, vt in cadmia. Vritur autē vino optimo perfusus,
viuisq; carbonibus obrutus perflatur assidue folliis, donec murato
colore rufescat. Rursus eodem vino restinguitur. Hoc iterum & ter-
tio faciendū. Attendendum tamen, ne minutim confringatur, & in
fuliginem euanesca. Vis crudo vstoq; adstrictoria, expurgans. Vlceri-
bus crustas quadamtenus inducit. Ambustis cum carato medetur. La-
uatur vt cadmia.

De Asio lapide.

CAP.

CXXXIII.

a Sius lapis assumi debet pumicosus, leuis, fungosus, item fria-
bilis, scissiles venas melini coloris ad imū aetas habēs. Eius
flos, salugo subflaua est, sūmo lapide infidēs, cōpage tenui, co-
lore in aliquib⁹ albo, i alijs pumici simili, ad luteū vergēte. Ad motus li-
guæ aliquātū mordet. Vim habet vterq; adstrictoriā, et modice erodētē.

DE MEDICINALI MATERIA

Ammistus liquidæ picis, aut terebinthinæ, tubercula discutit. Lōge validiōr flos existimatur. Cæterū ficcatus flos, vetera vlcera & cicatrici repugnātia sanat. Excreſcētia cohibet. Tetra vlcera & fungis similia, cū melle expurgat. Vlcerū caua explet, depaſcentiaq; cū carato fistit. Fit cataplasma ex eo podagris, misto fabæ lomento, & lienosis ex aceto & calce. Prodest phthificis linctū. Podagrici iuuantur pedibus in folio ex eo lapide excauato inditis. Fiunt quoq; loculi, qui corpora erodunt, & luxuriantem carnem, & corporum crassitiem absumunt, vice nitri in balneo. Si lauare libet, cadmiæ modo lauatur.

De Pyrite lapide.

CAP. CXXXIII.

p yrites lapidis genus est, a quo æs extrahitur. Eligi debet æris similitudine, facile scintillas ædes. Vritur sic: Melle irrigatus molli pruna continuo flatur foliis, donec rufescat. Alij in carbonēs igni candentes, lapidem melle perfusum deijciunt, et vbi ad fuluū colorē vergere cœperit, extrahūt. Efflatōq; cinere, rursus madefactū cremāt, donec æquabili tenore afficatus, friabilis reddatur. Siquis de sæpe facies summa solū vritur. Ita crematus ficcatusq; reconditur. Si eloto opus sit, lauari debet vt cadmia. Tā crudi quā vsti vis est, ex calfacere, abstergere, offusam oculis caliginem expurgare, duricias concoquere, & concoctas discutere. Refina exceptus excreſcentia in carne cohibet, sed calorem quemdam & adstrictionem parit. Ita vsum nonnulli diphryges appellant.

De Hæmatite lapide.

CAP. CXXXV.

h æmatites optimus habetur friabilis, puro colore niger, durus in se & æqualis, nulla sorde ammixta, nulloq; zonarū discursu. Vim habet adstringentē, & excalfactoriā aliquantum. Oculorum cicatrices & scabriciam cum melle purgat. Cum lacte autē muliebri, lippitudini, collisonibus, & oculis cruore suffusus conuenit. Bibitur contra difficultatem vrinæ, & fluxiones mulierum in vino, et ab ijs qui sanguinem reiecerunt, cum succo punici mali. Fiunt ex eo cōtes & collyria oculorū vitijs apta. Vritur vt phrygius, vino tantū sub tracto. Modus vſtionis est, vt modice leuis fiat, & bullis quibusdā inturgescat. Sunt qui hæmatiten ita adulterant, densam glebā rotundāq; schisti lapidis, cuiusmodi sunt quæ radices vocantur, vase figlini operis, quod feruentem cinerem contineat, condunt, paucaq; interiecta mora eximunt, experiunturq; si trita ad cotem hæmatitæ colorem

reddat, q̄ si ita res se habet, reponūt, sin minus, iterum obruūt, & subinde conspicientes periculum faciūt. Siquidem in cinere diu dimissus colore mutato dissipatur. Coarguitur male cōfictus, scissilibus venis. Quippe in rectos venarum discursus refringitur, & longe secus se in colore habet. Namq; floridum reddit. Hæmatites vero sanguineum t̄q; cinnabarin imitantem, Inuenitur in sinopico minio. Fit & e magneſe lapide, vehemēter ambusto. In ægypto sponte naturæ cum metallis enascitur.

De Schisto lapide. CAP. CXXXVI.

I Chistos lapis in Iberia Hispaniæ cōtermina gigniur. Probat̄ur maxime, quæ croci colorē æmulatur, friabilis, suapte natura fissilis, concremēto & serie cohærentiū venarum, ammoniacali similis. Vim exhibet hæmatitæ, sed ad omnia infirmioſiorem. Quin & caua replet muliebri lacte perfusus. Ad procidentia, rupra, itē genarum crassitiem, & vuas oculorum, magnopere efficax est.

De Gagatelapide. CAP. CXXXVII.

I N Gagatarum lapidum genere, præferendus qui celeriter accenditur, & odorem bituminis reddit. Niger est communi ex parte, squallidus, crustosus, perq̄ leuis. Vis ei molliendi & discutiendi. Depræhendit fonticum morbum suffitus. Recreatq; vuluæ strangulationes. Fugat serpentes nidore. Podagricis medicaminibus, & acopis additur. In Cilicia nasci solet, qua influens amnis in mare effunditur, proxime oppidum, quod plagiopolis dicitur. Vocatur autem & locus & amnis gagas, in cuius faucibus ij lapides inueniūtur.

De lapide Thracia. CAP. CXXXVIII.

I Apis thracias dictus, nascitur in flumine quodā scythiæ, cui ponto nomen est. Vis ei gagatæ. Traditur aqua accendi, & oleo restingui. Quod in bitumine accidit.

De Magnetelapide. CAP. CXXXIX.

M Agnes lapis optimus est, qui ferrum facile trahit, colore ad cæruleum vergente, nec admodum grauis. Datur cum aqua mulsa, trium obolorum pondere, vt crassos humores eliciat. Sunt qui magnetem crematum pro hæmatite vādent.

De Arabo lapide. CAP. CXL.

A Rabus lapis elephāti maculæ similis. Is tritus illitu hæmorrhoidas exiccat. Eius cinis dentifricio optimus.

DE MEDICINALI MATERIA

De Galaſcite.

CAP.

CXLI.

Alaſcites appellatur ꝑ lacteum reddat. Cinerei tamen eſt coloris, ac guſtu dulcis. Ad oculorum fluxiones conuenienter illinitur. Oportet autem in aqua tritum, pixide plūbea recondere, propter vim glutini, quod obhæret.

De Melinite.

CAP.

CXLII.

Elitites omnia galaſcitæ ſimilis. Hoc tantum intereſt, ꝑ dulciorem ſuccum remittit. Eiſdem vt galaſcites eſſectus.

De Morochtho lapide.

CAP.

CXLIII.

Orochthus lapis quem aliqui galaxiam, aut leucographida vocauerunt, in ægypto naſcitur, quo vtpote molli, & facile liqueſcente, linteones dealbandis veſtibus vtrūtur. Spiracula corporis obſtruere videtur, conueniens ijs qui ſanguinem expuunt, cœliacis, & veſicæ doloribus, cum aqua potus. Idem fluxionibus vuluæ, impoſitus velleri. Molliſus oculorum collyrijs miſcetur. Explet enim caua, atꝑ delachrymationes ſiſtit. Idem cærato exceptus, vlcera quæ ſiunt in teneris partibus corporis, ad cicatricem perducit.

De Alabaſtrite lapide.

CAP.

CXLIII.

Alabaſtrites vocatus onyx, crematus, reſina aut pice aſſūpta duricias diſcurit. Stomachi dolores cum cærato leuat. Gingiuas comprimit.

De Thyite lapillo.

CAP.

CXLV.

Apis nomine Thyites, in æthiopia gignitur, ſubviridi colore iaspidem imitatus. Liqueſcens tamen lacteum ſuccum reddit. Vehementer mordet. Tenebras quæ pupillis obuertiſantur expurgat.

De Iudaico lapide.

CAP.

CXLVI.

Iudaicus lapis in Iudæa naſcitur, glādis effigie, candidus, ſcilita admodum configuratione, diſcurrentibus lineis quaſi induſtria detornatis. Solutus nullā qualitatem manifeſtā guſtui repræſentat. Poſſeſt ciceris magnitudine tritus ad cotem, vt collyrium, cum calidæ aquæ cyathis tribus, potu difficultati vrinæ auxiliari, & calculos in veſica comminuere.

De Amianto.

CAP.

CXLVII.

Miatus lapis in Cypro naſcitur, ſciſſo alumini ſimilis, quo vtpote flexili, pannos tantū oſtentationis gratia texunt, qui ad

ignes cōiecti ardent quidem sed flammis inuidi splendidioresexunt.

De Sapphiro.

CAP. CXLVIII.

f Apphirus lapis, percussis a scorpione potu, prodesse existimatur. Contra intestinas exulcerationes bibitur. Excrescentia in oculis vualq; & pustulas inhibet, & ruptas membranas cogit.

De Memphite.

CAP. CXLIX.

m Emphites in ægypto iuxta Mēphin inuenitur, calculorum magnitudine, verficolor. Tradunt trito & illito, quæ vrenda aut secanda sunt, sine periculo obstupescere, ita vt non sentiāt cruciatum.

De Selenite lapide.

CAP.

CL.

f Elenites lapis quem aliqui aphroselenon appellarunt, quoniam noctu plenus, crescēte luna reperiatur. Nascitur in Arabia, candidus, traslucens, leuis. Huius ramenta comitialibus in potu dari iubent. Eo ad amuleta mulieres vtuntur. Arbores adalligato eodem frugifera redduntur.

De Iaspide lapide.

CAP.

CLI.

i Aspidum quædam smaragdum imitatur, alia chrystallum, Emilis pituitæ, alia non dissimilis acri, ob id vocatur aerizousa, alia veluti fumo infecta, quæ capnias ex argumento vocatur. Quædam lineis albis & resplendentibus præcingitur, assyrios appellata. Alia therebinthinæ similis, quæ terebinthizusa dicitur. Alia colore calaida gemmam æmulatur: Omnes amuleta esse traduntur, & accelerare partum fœmoribus appensæ.

De Aetite lapide.

CAP.

CLII.

a Erites lapis est veluti prægnans, cum quatitur alio in vtero sonante. Grauidis continet partus, cum lubricæ sunt vuluæ & parum tenaces, sinistro brachio adalligatus. Sed parturientibus e brachio amoueat & fœminibus alligetur, vt sine doloribus pariant. Furem depræhendit, si quis in pane conditum offerat. Fur enī mansum deuorare non poterit. Quinetiam concoctus, furem coarguit. Quippe decocta cum eo, deuorare non poterit. Tritus & carato exepus, ciprino, aut gleucino, aut alio excalfaciēte, comitiales magnifice iuuat.

DE MEDICINALI MATERIA

De Ophitelapide. CAP. CLIII.

Phitæ genera multa. Quidā grauis est odoris, niger. Alter cinereo colore spectatur, punctis distinctus. Tertius lineis quibusdam candidis intercinctus est. Omnes contra capitis dolores, & serpentium ictus profunt. Feruntur qui lineas habent, lethargo & capitis doloribus auxiliari.

De Lapidibus spongiarum. CAP. CLIIII.

I Apides in spongijs inueniuntur, qui vesicæ calculos rumpunt, in vino poti.

De Lithocolla. CAP. CLV.

I Ithocolla glutinum, quo lapides coniunguntur. Fit autem ex marmore, lapide pario, & taurino glutine. Potest candente specillo admotum, incommodos oculis pilos replicare.

De Ostracite. CAP. CLVI.

O Stracites testæ similitudinē habet, glebosus, & in laminas fissilis, quo mulieres ad detrahendos pilos, pro pumice vtrunt. Menfes drachmæ pondere potus, ex vino ficit. Si quattuor diebus a coitu bibatur sicilici pondere, fœminis præstat ne concipiāt, Cum melle autem impositus, mammarum inflammationes lenit, & non mas cohibet.

De Smyride. CAP. CLVII.

f Myris lapis est, quo annularij scalptores lapides expurgant, ad erodendum, & vrendum utilis. Gingiuis quas humor vexat, prodest. Dentifricio commendatur.

De Harena. CAP. CLVIII.

h Arena e littoribus sole feruē facta, hydropicorum tumores exugit, si capite tenus, in ea obruantur. Torreris solet ad aridos fatus, pro milio aut sale.

De Cote. CAP. CLIX.

c Cotenaxia, quod exacuendo ferro deteritur, illitū alopecias ad pilum reducit. Virginum mammas cohibet, nec incrementum repatitur. Potum ex aceto lienem absūmit.

De Lapide Geode. CAP. CLX.

g Eodes lapis, adstringit, ficit. Caligines oculorum discutit. Illitus autem ex aqua, testium mammarum inflammationes sedat.

De Terra.

CAP.

CLXI.

- Mnis terra ad medendi vsum recepta, summam & primam vim habet occludendi. Sed specie distant, cū alia adiunctis quibusdam, ad alia sit utilis.

De Erethriade.

CAP.

CLXII.

- Rethriæ duesunt, vna vehementer alba est, altera cinericia. Optima habetur ad cinereum colorem vergēs, perq̃ mollis quæ si per æramenta trahim ducatur, lineam violaceam refert. Lauatur vt cerusa, aut hunc in modū. Teritur ex aqua, & vbi perfumierit, humor leuiter excollatur. Siccata solibus iterū teritur, interdū adiecta aqua, vt vespere confidat. Antelucanis colo excernitur & demū in sole trita si fieri potest, digeritur in pastillos. Quod si tosta desideretur, pastilli magnitudine ciceris in fidile perforatum coniunguntur, oreq; vasis diligenter obturato, supra carbones continenter foliis bus perslantur. Vbi vero cinis in fauillas se conuertit, aut æreum colorem contraxit, exempti reconduntur. Vim habet adstringentem & refrigeratorem, leuiter mollientem. Caua explet & sanguinolenta cōglutinat.

De Terra samia.

CAP.

CLXIII.

- Amia præfertur candida, leuis, tangenti linguæ glutinosa, mollis, succosa, friabilis. Cuiusmodi est quā aliqui collyrion, & vocarunt & vocant. Dux enim species eius. Vnam antediximus. Altera aster appellatur, crustacea, & cotis modo prædensa. Vritur ac lauatur vt erethria. Vimq; cōsimilem habet. Sanguinis reiectio nes fistit. Fœminis fluxione vuluæ laborantibus, cum flore syluestris punici datur. Testium & mammarum inflammationes illira ex rosaceo & aqua refrigerat. Sudores arcet. Contra serpentium morsus & venena pota ex aqua auxiliatur.

De Samio lapide.

CAP.

CLXIII.

- Amius lapis, in samia terra inuenitur, quo aurifices vtuntur polliendo auro vt resplendeat. Probatum candore & duritia. Vis ei adstringentia, & refrigerans. Prodest stomachicis potus. Sensus hebetat. Verum ad lachrymationes oculorum & vlcera cū lacte efficax est. Partus, vt tradunt, adligatus accelerat, & conceptus fœminarum custodit.

De Chia terra.

CAP.

CLXV.

- Hia eligi debet candida, vergens ad cinereum, samia similis. Est autem glebosa, albaq; Sed fidicijs formis differēs. Vis eadem quæ & samia. Extendit faciem, & erugat, atq; splendidā reddit. Colorem in facie & corpore toto cōmēdat. In balneis pro ni-

DE MEDICINALI MATERIA

tro deterget.

De Selinufia terra.

CAP. CLXVI.

Ade præstat selinufia. Maxime laudatur quæ vehemēter resplendet, candida, friabilis & aqua dilui celerrima.

De Cimolia.

CAP. CLXVII.

Imoliæ duo genera, cādida, & ad purpureū inclinans, Optima existimatur quæ innatam habet pinguitudinem, taſtuq; frigida ſentitur. Vtraq; aceto diluta parotidas, & alia tubercula diſcutit. Ambuſta igni ſi ſtatim cimolia oblinātur, puſtulas non ſentient. Teſtium duriciās, & totius corporis colleſtiones cohibet. Igni ſacro imponitur. In ſumma vtraq; multum in medicina commēdatur, ſi incorruptæ originis, nec ſpuria aſſumatur.

De Pnigite terra.

CAP. CLXVIII.

Væ pnigitis dicitur, colore erethriæ ſimilis eſt, grādioribus tantum glebis. Manum ſi quis admoueat, refrigerabit. Taſtu linguæ, vſq; adeo glutinoſa, vt penſilis hæreat. Cui eſſectus idem qui cimoliæ, paulo tamen infirmior. Hanc aliqui pro erethriade vādunt.

De Teſtis.

CAP. CLXIX.

Ornaceæ teſtæ vehemēter toſtæ, cruſtas vlceribus obducūt. Quare prurigini & papularum eruptionibus medētur. Podagricis profunt. Strumas diſcutiunt, cærato exceptæ.

De Terra fornacum.

CAP. CLXX.

Ornacum terra, quæ retorrida fulueſcit, eiufdem cū teſta eſſectus.

De Melia terra.

CAP. CLXXI.

Elia colore cineream erethriam imitatur, aſpera taſtu. Ea diſcutit friata, deaſi pumicis modo crepitat. Vim habet aluminofam, ſed remiſſiuſculā, id quod guſtu depræhēditur. Modi ce linguam ficcat, purum torpus reddit, & colorem cōmendat. Pilos extenuat. Vitiligines & lepras abſtergit. Piſtoribus vſum præbet vt colores diutius perennent. Emplaſtris quæ chloræ dicitur, efficaciter inferitur. Ex omni Melia terra & omni alia in vniuerſum, eligi debet, recens, mollis, non lapidoſa, friabilis, quæ cum humorem attingerit facile reſoluatur.

De Ampelide terra.

CAP. CLXXII.

Xampelide terra quæ pharmacitis nomine, in ſeleucia inſta ſyriam naſcitur, laudatur in primis nigra, piceæ carbones referēs, aſſuloſa, æquabili ſplendore, quæ detrita, accepto oleo ſtatim eliqueſcit. Vitiola cenſetur candida, & cinerea, quæ in liquorem

LIBER QVINTVS

141

non resoluitur. Vim dissipandi & refrigerandi habet. Ad calliblephara additur, tingendis capillis idonea. Vfus eius ad illinendas vites sub germinationis tempus. Vt pote cum innascentes vermiculos enecet.

De Fuligine pictoria. CAP. CLXXIII.

Uligo qua pictores vtuntur, ex vitrarijs officinis colligi solet. Siquidem ei palma tribuitur. Vis ei ad adstringendum et erodendum efficax. Fracta cum rosaceo carato ad cicatricem perducit.

De Attramento librario. CAP. LXXIIII.

Attramentum quo scribimus, fuligine et edis coacta colligitur. In singulas libras gummis, ternæ fuliginis vnciæ adijciuntur. Fit etiã e resinæ fumo, & pictoria fuligine, de qua paulo ante diximus. Assumitur autem fuliginis mina, gonus sesquilibra, glutinis taurini, attramenti futorij, singulorũ sesquũcia. Additur cõuenienter erodentibus medicamentis. Ambustis ex aqua cõmode illinitur. Sed nõ ante soluatũr q̃ cicatrice induxerit. Sanatis siquidẽ viceribus, sua sponte decedit. Cæterũ habes amicissime ariabũ de, quæ tradenda duximus, non pro operis modo, quem destinaueramus, sed pro materiæ & auxiliorum medicinæ lium copia.

Pedacij Dioscoridis Anazarbei De
medicinali materia, Ioan-
ne Ruellio Sueffionensi
interprete Quin-
tilibri

F I N I S

PEDACII DIOSCORIDIS
PEDACII DIOSCORIDIS ANAZARBEI
DE VENENIS, QUOQUE MODO
ARCEANTVR, VITEN-
TVRQUE, LIBER
SEXTVS.

S

Vperioribus amicissime Ari libris, tra-
didimus de aromatibus, oseis, vnguen-
tis, arboribus, & eorundem fructibus, la-
chrymisq; Item animalibus, melle, lacte,
seuo, frumentis, oleribus, hærbis, radici-
bus, liquamentis, vinis metallisq;. In hoc
vero totius operis vltimo, facultates eo-

rum recensebimus, quæ prodesse nobis, aut officere possunt. Vitantes
itaq; nomenclationis rædia, ad institutū reuertemur. Huiuscemodi au-
tem tractatus, cum bifariam distributus sit, in partem venena præcauē-
tem, ita vt ne fallant fumentes, aut siquando per imprudentiam den-
tur, vt tum quoq; innoxia fiant, irritaq;. Et in partem auxiliatricē. Pri-
mum disseram de præcauendi modo, quem esse difficillimū pleriq; ma-
iorum arbitrantur, q; dantes clam venena, ita insidias tēperāt, vt peri-
tissimum quemq; decipiant. Siquidem venena sua amaritudine, permis-
sis dulcibus spoliant, & graue odoris virus mistura odoramentorū
eximunt. Aut medicamenta immiscent, quæ leuandæ valetudinis gra-
tia dari solent, et præsertim quæ infirmioribus, vt absinthiū, tragoriga-
num, cunillam, aut hyssopum. Quinetiam thymum, irim, organū, ca-
storium, aut siquid medicamentis, cognatum habere saporem videā-
tur. Aut potionibus inferunt, aut vinis, aut iuribus, aut passo, aut mul-
sæ aquæ, musto, succis, lenti, polētis, aut medicaminibus. Aut concin-
nantes ipsi, edulij admiscunt. Quare qui in ea suspicione sunt, condita
edulia vitare debent, omniq; intensa saporis qualitatē, dulcium, aut sal-
sorum, aut acrium, abstinere, nec sitibundi astatim bibere, aut esurientes
voraciter comesse, semperq; ad saporem esitatorum diligenter attende-
re, præsertimq; bibentes, frigidam aquam præsumere. Satiato enim ap-
petitu qualitates ægerrime concoquantur. In infirmis quidem faci-
le vitare possumus poriones auxilij gratia dari solitas, quas offerunt
improbi, qui beneficia moliantur. Itaq; ob id laborantes morbo, non
perinde audētum iniurijs patent. Et hæc quidem ne facile, seducti ho-
mines capiātur dolis veneficorum, occasio est & facultas. Sed alia ex-
peditior, vt suspiciosi aliqua præsumant, quæ venenorum vires hebe-
rent & inefficaces irritasq; reddant, cuiusmodi carica sunt cum iuglan-

dium nucibus manducata, & quæ cedromela vocant idest citria, seminis napi drachma cum vino. Item folia calaminthæ, aut terra quæ lemnia sphragis appellatur, pondere pari cum vino. Aut rutæ folia & nucis iuglandis nucleum aut caricæ duas & salis callum ieiunii sumant, & nullo veneni genere lædentur. Antidota ex vino sumpta eundem effectum præbent. Inter quæ intelligitur magnum metridarium, quod scinco & sanguine temperatur. Quin & sæpe venenis obstitunt peculiari affectus in corporibus certo quodam modo constitutis, & quædam cibi potusque qualitate, aut vini copia, ita temperatis ut cum venenis dissentiant. Siquidem ingesti veneni vires frangunt, atque iam priore alimento factis præclusisque meatibus, obstant ne membratim per digestionem insinuetur. Verumenimvero, quoniam fortunæ temeritas interdum similia discrimina, peregre agentibus affert, absque ullis insidijs hominū, non nihil differendum michi de hac re necessarium duco. Iam primum igitur culinam apparare loco subdiali conuenit, cibosque & potus in huiusmodi loco struere. Si id fieri commode nequit, secunda erit conditio hæc, apparandi apponendique sub tecto. Sed tum diligenter laquearia animaduertenda. Frequenter enim a superioribus contabulamentis animalia decidunt, exigua quidem, sed quæ non modicam perniciem moliatur, ut phalangia, stelliones, & alia quædam reptilia. Porro vinaria vasa diligenter intueri oportet. Namque reptilia odore vini illiciuntur, quæ interdum sorbentia, noxium virus eructant, interdum vero delapsa immersaque moriuntur, & exitij causas haurientibus afferunt. Sed hæc hæcenus dicta sint, cauti & prouidi insidijs ne pateant. Quod si qui sua sponte, aut ex quorundam insidijs sumpserunt, auxiliari primo quoque tempore oportebit. Siquidem dum comites singulorum venenorum notæ expectantur, immedicabile fit venenum, & paulisper neglectum, medicamentis ægre cedit. Quare si qui compositos mentis, se virus sumpsisse fateantur, aut eorum qui aderant testimonio constet, protinus ad idonea remedia transeuntes, facile peculiari naturæque constitutioni, restituemus. Neque enim ijs assentimur, qui prorsus auxilia in huiusmodi, frustra adhiberi contendunt. Quo enim modo vitia, quorum causæ corporibus insident, medicinam admittunt, & quæ forinsecus incurrunt venena, medendi rationem aspernantur. Aequè vero omnes morbi pro causarum ingruentium magnitudine, aut pristinis affectionibus, qualitatibusque, quibus sit opportunus corpus, vel medicabiles sunt, vel nullis cedunt medicamentis. Quod si qui forsitan obmutescentes, aut temulenti, aut nolentes alioqui venenum egeri, nullam nobis eius cognitionem præbeant, tum protinus accedendum ad ea quæ communiter epotis quibuscumque venenis opitulari consueverunt.

PEDACII DIOSCORIDIS

Atqui nullum magis in omnia valens auxilium dari potest, q̄ vt proximo loco virus foras exhauriatur, priusq̄ inualeſcat. Quare ſine mora, calidum oleum ex aqua, aut ſeorſum, vt vomitare cogantur, dari conuenit. Aut ſi oleum natura loci negat, butyrum cum aqua calida, aut malua, aut lini ſemine, aut trago, vrtica, fœnogræco, aut halicæ decocto, vicem eius exhibebit. Hæc enim non modo vomitionibus exigent vi illa ſua laxatrice, aut naſeam ciente, ſed aluum quoq̄ ſubducunt, & corporū inanitione ita aduerſabūtur, vt acrimoniæ eorum hebetent. Id quod euidenter huiusmodi argumēto depræhendere licet. Eſto vt quiſquam viua calce, vel vini fæce, aut cantharidibus, aut alio quouis acri, corpus exulcerare ſtatuert, ſi ipſum oleo leniter illinat, exulcerationē non accipiet. Atqui neq̄ vehementer adſtringi corpus neq̄ refrigerari poterit, ſi antea perungatur. Quinetiam vomitus non ob id modo q̄ vacuet, & noxium humorem excernat, iuuamētum adfert, ſed quod aſſumptū virus nonnūq̄ odore, coagulatis globulis, aut colore, prodat. Quippe cum odore & amaritudine, meconium colore, ceruſam gypſumve, globulis lac aut ſanguinem animalis recens iugulati oſtendat. Nam grauis odor regeſtorum, leporis marini, aut rubetæ veneficia depræhendit. Ita vt nonnulla ab ijs remedia peti poſſint, ad idonea ſingulorum auxilia tranſeuntibus. Oleo, maluæ decoctum ammiſcetur, aut glaucium, aut adeps anſerinus, aut pinguium carniū iura, lixiuium lignorum cinere factum. Vbi vero vomitus diligenter citatus fuerit, ne quid in vētre coierit, quæ hæſerunt inteſtinis reliquiæ clyſtere acri deuocentur. Facit & nitrum tritum & cum hydromelite ſumptum. Vina vetera liberalius epota, gallinacea iura, præpingues piſces, vetuſtæ carnes pingueſq̄, & quæ adipe aut recenti butyro parantur. Aluum namq̄ ſubducunt vti diximus, & ſtomachum reſoluentia, proniorem ipſum ad vomitionem reddūt. Et venenorum acrimoniæ hebetant, atq̄ meatus obſtruentia, celerem virium penetrationem inhibent. Quinetiam medicamenta dantur, quæ comuni dote proſunt, vt lemnia terra, agaricū, abrotonum, irio, radix eringij, ſemen paſtinacæ & calaminthæ, nardum gallicum, caſtorium, ſerulæ virentis medula, ſos rhododendri, ſuccus marrubij, laſer aut laſerpitium, ſagapenium, peucedani ſuccus, aut panacis, & radix quam magudariam appellatū, ariſtolochia longa, ſylueſtris rutæ ſemen, & betonicæ quam ceſtron nomināt, ſolia. Singula cum vino drachmæ pondo ſumi debent. Eſſe&ū præbet poli decoctum, & ſeſeli, & liquida pix linctæ. Magniſce ſerunt opē, antidota quæ in calce operis ſcripta reliquimus. Communis ratio præſtandi auxilij, ita ſe habet. Cæterū ab ijs quæ conſueuerunt euacuire, communia remedia ſumptitari poſſunt. Fere enim vires venenorū

quamplurimorum, in affectus confimiles, corpus tandem redigunt. Quam ob causam plerisque, communia conducunt auxilia. Per multa etenim venenorum genera, communes tamē nec multi iisdem affectus oriuntur. Neque fieri potest, ut omnia quæ contingere solita sunt, vnum venenum sequantur. Alioquin superuacaneus esset venenorum tractatus, si gillatim remedijs ab authoribus traditis. Neque vero in vno eodemque promptum est inuenire, ut stomachi, iecoris, renū & vesicæ dolore vehementer crucietur, ut singultuat, erodatur, contremiscat, refrigeretur, obmutescat, conuellatur, pulsus elanguescat, veterno prematur, caligent sensus, stranguletur, litiat, sanguis erumpat, febre conficiatur, ægre lotiū reddat, torminibus vexetur, crebro vomitet, nausea prematur, rubescat, liuore suffigilletur, palle scat, desipiat, stertat, viribus deficiatur, & pleraque alia eueniant. Vnumquodque venenum in generales affectus diducitur, ut pauca numero & communia demonstrentur, quæ euenire consueuerunt. Quare in singulis quæ supra diximus non facile fuerit deuoratum virus cognoscere. Nam stomachi & linguae erosio, ventris ac renum inflammatio, vehemens urinæ difficultas, & interdum cruoris exitus, laceratio, & in plurimis partibus quiddam adustionis sensus, non in cantharidibus modo potis reperiuntur, sed in erucis quoque pinorum, & bupreste, & salamandra. Porro eos qui meconium hauserunt, non modo veterno aut sopore premi, stertere, liuore suffigillari, torpere, refrigerari, stupefcere, sensu priuari constat. Sed eos etiam qui mandragorā aut cicutam deuorauerunt. Delirium non hyoschymus tantum infert, verum etiam quæ toxica appellantur. Itidem aconitum, & mel quod in heraclea pontica gignitur. Strangulatio non minus in fungis quam in sanguine taurino, lacte, aconito, cerusa, gypso conspicitur. In summa difficile vnum vni veneno proprium inuenire signum, quod haustum virus prodere possit. Maxime quod hæc cæterorum etiam vitiorum quæ in corpore exoriuntur communia sequi solent. Cæterum in his quæ celeriter enecant, adnotari fortasse, quod inspectum fuerit licet, ut postea trademus. Sed ijs qui ad longas ægritudines spectant nihil ad medendi rationem difficile, dumtaxat quod pertineat ad indicia noxæ, utpote cum venena statim atque præsentaneam vim illam perdiderunt transmutata in longos affectus communia reliquorum vitiorum remedia, compositionesque flagitent. Cum venefica proprietas non amplius insit. Si vero longa sit affectio, in aliquod diuturnorum morborum genus recidet, a quibus facile fuerit medendi rationem assumere. Sed de ijs quæ generaliter auxiliantur, hæc tenus. Consequenter quæ priuatim singulis profunt, scriptis mandabimus, si prius simul exposuerimus, quæ ex singulis ordinibus exitialem aut maleficā

PEDACII DIOSCORIDIS

vim fortiuntur, vt medicinarū studiosi intra obseruationē cauti, quibusdā eorū medicamentorum misturis vtatur quæ memoriæ literarū tradita sunt & ab authoribus descripta. Imprudentia enim magnas adfert noxas, & sæpe continuo vsu eorū, homo in perniciē agitur. Proinde animalia quæ exitiosam vim habent, hæc sunt. Cantharides, Buprestis, Salamandra, pinorum eruca, Lepus marinus, rubeta, & rana palustris muta, deuorata hirudines. Semina sunt, hyoscyamus, coriandrū, cicuta, gith, mādragora, psyllion. Liquamēta, meconiū, opocarpason, thapsia succus, elaterium. Radices quas mittit chamæleo, aconitum thapsia, veratrum, ixia, agaricum nigrum, ephemerū, quod aliqui colchicum vocant, q̄ in colchide nascatur. Hærbæ olæta q̄, similax quam aliqui thymion appellant, romani taxū, solanum manicum, quod et doricinium dicitur, sardonias hærbæ quæ ranūculi genus est, corniculatum papauer, phtharicum, toxicum, ruta sylvestris, fungi. Ab animalibus taurinus sanguis recens, coagulatum lac, mel heracleæ in ponto genitum. Metalla gypsum, cerusa, calx, auripigmentum, duo sandarachæ genera, spuma argenti, adarce, plumbum, & quod argentum viuum dicitur. E vitibus vinum abunde post balneas potum, aut passum & frigida aqua similiter.

De Cantharidibus. CAP. I

Vibus datæ sunt cantharides, signa eueniunt grauissima. Ab ore enim ad vesicam vsq̄, cuncta erodi sentiuntur. Picem aut simile quiddam cedriæ respiciunt. Dextra præcordia inflammantur. Vrinam ægre reddunt. Et subinde cum lotio sanguinem emittunt. Strigmenta non secus atq̄ dysentericis, aluo deferuntur. Fastidia vrgent. Animoliquuntur. Oborta q̄ vertigine concidunt. Postremo mente abalienantur. Ergo antea q̄ tale non nihil accidat, dato oleo, aut supradictorum aliquo, vomere cogantur. Mox vbi vomitione plurima reiecerunt, halicæ aut oryza, tragi aut ptisanæ cremor, aut decoctum malua, aut seminis lini, aut scœnigræci, aut radicum altheæ, quam latinus sermo ebiscum appellat, clystere infundatur. Præterea nitrum eisdem dandum, ex hydromelite, vt quæ stomacho adhuc aut intestinis adhærent, lingendo excernantur, ac descendant. Quæ nisi intercidatur, ingesta ex nitro aqua mulsa, vacuari debent. Detur deinde vinum aut passum, in quo pineoli nuclei, aut cucumeris semina contrita sint, aut ex lacte, aut mulsa, aut anserinus adeps in passo liquefactus. Inflammata autem partes, hordei farina aut mulsa perungantur. Ab initio admodum cataplasmata nocent, q̄ citatus ab eis calor, illapsum virus ita remoratur, vt in principes se parteis insinuet. Ipsa tamen interiecto tempore, molestissimis inflammationibus opitulantur. Vtpote quæ dolo-

res & permulceant & leniant. Quo tempore corpus calfaciente oleo, quo facilius introeat, eluere par est. Cæterum omnibus medicina, vt noxium virus per summa corporis excernatur. Deiectiones multas riam moliri oportet, ne affectus infigatur, & stabilitatem capeffat. Galinaceis carnibus & hædinis, aut suillis, catullis, maxime pinguibus, & tenerrimis vesci debent. Siquidẽ aluum cient, atq; venenorum acrimonias hebetant. Vinũ dulce liberalius ebibatur. Prodest thuris cortex, & samia terra quæ aster appellatur, si quaternæ singulorum drachmæ cum passo sumatur. Item pulegium ex aqua tritum. Irinum aut rosaceum cum rutæ decocto, recentes vitis ramuli, cum passo detriti. Longe omnium potentissime, antidota auxiliantur, in quattuor drachmis aquæ mulsæ pota.

De Pinorum eruca. CAP. II.

i Is qui erucas pinorum hauserunt, illico dolor in ore & palato exoritur. Vehemẽs alui, linguæ ac stomachi, inflammatio torquet. Intestina dolor excruciat, ita vt pruriginem sentire videantur. Corpus totum exæstuat, fastidium vrget. Quibus est succurrendum, remedijs, quæ deuoratis cantharidibus dantur. Peculiariter tamen pro simplici oleo & irino, melinum quod e cotoneis pomis & oleo temperatur, accipiemus.

De Bupreste. CAP. III.

q Vi buprestin biberunt, non dissimile nitro virus sapiunt. Stomachi ventrisq; vehemens dolor insequitur. Tã venter q; stomachus mirũ in modũ vt in aqua intercutem diffusus, inturgescit. Vniuersa corporis facies contēditur. Vrina supprimitur. Quibus eadem quæ potis cantharidibus auxiliantur. Priuatim post vomitus & vacuationes quas clysteribus molimur, aridæ ficus profunt. Itẽ earum decoctum, ex vino. Vbi vero iam fere pericula inclinantur, thebaicarum palmularum cibo, aut earũdem tritarum in mulso aut lactis potu, iuuantur. Pirorum etiamnum omne gẽius esse, et lac humanũ bibere, conuenit.

De Salamandra. CAP. IIII.

i I Salamandrã hauserunt, linguæ inflammatio consequitur, mens præpeditur. Tremor cum torpore aut horrore quodam ac exolutione accedit. Partes nonnullæ corporis liuoribus circumquaq; suggillantur. Sæpeq; diutius immorante veneno, putrescentes defluũt. Quibus præstabis cuncta quæ potis cãtharidibus. Peculiaria vero remedia, resina pinus, aut galbanum ex melle linctum & trisaginis decoctum, in quo nuclei pinci conterantur, vrticæ quoq; folia, cum lilij & oleo decocta. Profunt etiam oua testudinis marinæ

PEDACII DIOSCORIDIS

aut terrestris, cocta. Item ranarum ius cum quibus eringij radix inco-
ctasit.

De Ephemero.

CAP.

V.

Vmpto ephemero, quod aliqui colchicon, aut sylvestrem bul-
f bum appellant, pruritus in toto corpore excitatur, non secus
atq; ijs qui vrtica aut scylla laceffuntur. Interna rosionē sen-
tiunt. Stomachus cum ingenti grauitate exæstuat. Cæterū inualescen-
te morbo, cruor strigmentis ammissus, per aluum exigitur. Quibus vt
ijs qui salamandram hauserunt, vomitione aut clysteribus auxiliari
conueniet. Sed antea q̄ venenum inualescat dandum est decoctum fron-
dium quærqus, aut glandium, aut florum mali granatæ. Lac bibe-
re prodest, in quo serpyllum sit decoctum. Item succum sanguinalis
hærbæ, aut ramorum vitis, aut rubi, aut medullæ recentis ferulæ, aut
myrti. Baccæ autem myrti tusæ tritæq; et aqua macerata, vt liquor in-
de sumatur, opem ferunt. Medius sardoniarum glandium liber, simile
effectū præbet, si crudus in aliquo supradictorum succo sumptitur.
Origanum quoq; cum lixiuio epotum. Eximie iuuantur asinini lactis
aut bubuli potu, etiam si in ore contineant. Ita vt quibus copia lactis
huius adsit, non aliud desideretur.

De Dorycnio.

CAP.

VI.

Orycnion quod & aliqui manicon solanum appellarunt, epo-
d tum lactis saporem in gustu refert. Vehementes singultus ciet.
Humor linguam vexat. Sanguis subinde reijcitur. Stri-
gmentosa quædam perinde quasi dysentericis, aluo egerūt. Itaq; an-
teq; aliquid ex ijs eueniat, auxilio sūt âtedicta, vomitus, clyster, & quæ-
cunq; potum venenū expellere possunt. Priuatim ijs opitulatur aqua
mulla, lac caprillum, aut asininum, dulce vinum quod tepidū cum ani-
so bibatur, nuces amaræ, gallinacea pectora decocta. Quinetiam con-
chyliia omnia, tam cruda quam tosta, esse salutare est. Conueniunt & lo-
custa marinæ & gammari, & pota eorumdem iuscula.

De Aconito.

CAP.

VII.

Conitum statim in lingua inter bibendum, cum adstrictione
a quadā dulcescit, gustatibusq; maxime cū exurgere conantur,
vertigines offundit. Lachrymas ciet. Grauitatem pectori &
præcordijs adfert. Simulq; crebri spiritus deflantur. Quare venenum
vomitione abigi, aut clystere per aluū egeri opus est. Vitimur inter arcē-
tes potus, origano, ruta, marrubio, vel absinthij decocto, cum vino ab-
sintithite, vel sèperuiuo, vel abrotono, vel chamælaæ, aut trifagine. Pro-
dest etiamnum opobalsami drachma, cum melle aut lacte, cum castorio,
pipere, & ruta. æquis ponderibus ex vino. Coagulū hædi, leporis, aut

hianuli, cum aceto. Ferri quoque stercus. Item vinum in quo aurum, ferum, argentumve candens restinguatur, potum. Lixiuiaque cum gallina & vino decocta, aut carniū præpinguium iura cum vino sumpta. Feruntur & aiuga priuatim ipsis subuenire.

De Venenato heraclia melle. CAP. VIII.

El heraclia in ponto, vbi aconitum gigni solet, athenis ionia, euboice fiderites nominatur, quod qui edunt bibuntve non secus affliguntur, quam qui aconitum ebiberunt. Ijs eadem quæ poto aconito conueniunt. Adiuuantur in primis continuo vini mulsi potu, cui rutæ folia sint adiecta.

De Coriandro. CAP. IX.

Oriandrum ob odorem latere non potest. Epotum autem densam vocem facit. Insaniam adfert, a temulentis non abhorrentem. Qui sumplerunt pudenda dictu blaterant, totiusque corporis odore venenum latentur. Quibus post vomitionem irino oleo concitatam, vti retulimus, merum & per se, & ex absinthio potum auxiliatur. Item oleum. Nec secus oua in eodem exinanita, si liquefacta in muria sorbeantur, & epota muria & ius salsum ex gallina & anser. Passum quoque cum lixiuia sumptum.

De Psyllio. CAP. X.

Syllion epotum, corpori toti frigus & torporem cum exolutione et morore quodam affert. Cui omnia quæ exhausto coriano auxiliantur.

De Cicuta. CAP. XI.

Cicuta pota vertiginem excitat, oculisque caliginem offundit, ita ut eminus non cernatur. Singultus cit. Metum turbat. Extremi artus gelantur. Denique conuulsi suppresso arteria spiritali, strangulantur. Quare inter initia, vti in reliquis, cicutam vomitu excutieris. Postmodum deiectionem moliemur, ut quod ad intestina prolapsum sit, excernamus. Tum demum in meracam potionem, quæ maximo est auxilio, deueniemus, dantes non nihil intermissionis, in qua proderit lac bubulum potui datum, aut absinthium cum pipere, & vino castorio ruta menta cum vino, aut amomi cardamomi aut styracis vncia, aut piperis cum semine vrticæ & vino, aut lauri folia. Item laser ex oleo & passo. Passum per se largius potum proficit.

De Taxo. CAP. XII.

Milax a quibusdā thymion, a Latinis taxus appellatur. Frigiditatem vniuerso corpori, strangulatus & celerem interitum infert, cui eadem quæ cicuta conueniunt.

PEDACII DIOSCORIDIS

De Carpasi succo. CAP.

XIII.

Potus carpasi succus soporem, citamq; strangulationem adducit. Adiuuantur autem qui hauserunt, epotæ cicutæ remedijs.

De Sardonianæ herbæ. CAP.

XIIII.

Sardonianæ ranunculi herbæ generi assignatur, quæ vescentibus mentem adimit, & quadam nervorum distensione labia in rictum contrahit, ut risus speciem præbeant. A qua quidem affectione, de sardonio risu adagium, in vulgus aperte manauit. Post vomitum peculiariter cōuenit aqua mulsa liberalius epota, lac, irrigatio, perunctioq; a pinguibus totum corpus exalfacientibus. In calidam aquam oleumq; descendant. Sed tum multum perfricare & inungere expedit. Et in summa, curam omnē quæ conuulsioni nervorum adhibetur, exequi oportet.

De Hyosciamo.

CAP.

XV.

Hyosciamū potum aut comestum similem ebrijs ab alienationē mouet. Sed facile medicamentis cedit. Auxiliatur aqua mulsa copiose data, lacq; præsertim asininum, si id desideratur, caprillū, vel bubulū, vel aridarum ficuum decoctum. Faciunt ad id etiam nuclei pinci, aut cucumis semen ex passio sumptum, & vinum salsum cum adipe suilla recenti passioq; itidem vrticæ semē, aut nitru ex aqua, & intubus erraticus, & sinapis & nasturcium, radix cæpæ & allium. Et hæc singula cum vino sumantur, post conuiescant, ut vinum concoquatur.

De Mandragora.

CAP.

XVI.

Mandragora si bibatur, confestim sopor insequitur, exolutio, ac vehemens veternum, nihil temere distans a lethargo. Cui anteq; aliquid ex ijs accidat, vomitus ex aqua mulsa proderit. Postea nitrum & absinthium, ex vino dulci aut passio sumantur. Caput rosaceo & aceto perfundatur. Proficit excitatio & motus corporis, & olfactus eupatorii, & piperis, sinapis, castorij & rutæ, tritorum in aceto & liquidæ picis, & odor e lucernarum extinctu. Quod si ægre ij reuocentur, sternutamenta mouere alijsq; communibus auxilijs vti conueniet.

De Meconio.

CAP.

XVII.

Poto papaueris succo, quem meconion vocant, consequitur veternum, cum perfrictione & pruritu vehemente, ita ut sæpe inualecente veneno tanta erūpat prurigo, ut hominē excitet. Corpus id medicamentū olet. Post citatā oleo vomitionē, acres clysteres auxiliantur, acetūq; mulsum cū sale potum, aut mel cū rosaceo calido, merū cū absinthio aut cinnamomo copiosum, aut calidū per sese

acetum, nitrū ex aqua, & origanum cum lixiuā aut passo, & rutæ syl-
uestris semen cum pipere vino & panace, piperq; cum castorio & ace-
to mulso vel cum satureia aut origani decocto cum vino. Ij olfañili-
bus excitādi. Ob enatam pruriginem in balneas descendāt & fouean-
tur. Post lauacrum prodest iurium pinguium vsus, cū vino aut passo.
Medulla etiam ex oleo pota.

De Corniculato papauere. CAP. XVIII.

q Vd corniculatum papauer appellant, & potu & cibo eadem
inferre cōsuevit, quæ papaueris succus. Nec alijs expugnatur
auxilijs.

De Pharico. CAP. XIX.

q Vd pharicon vocāt, sapore syluestre nardum imitatur. Re-
solutionem neruorum potum añert, cum conuulsione & deli-
rio. Oportet autem post vacuationes vinum absinthiten po-
tui dare, cū cinnamomo, aut myrrha, aut nardo gallico, quod serinen
aliqui vocauerunt, aut spicæ nardi duas drachmas, & myrrhæ totidem
obolos, cum passo, iri, & rosis ex vino. Dera sumq; caput illinire hor-
deacea farina cum aceto, & trita ruta.

De Toxico. CAP. XX.

t Oxicum ex eo nominari videtur, q barbarorum sagittæ eo il-
linebantur. Qui biberint, labiorum & linguæ inflatione tor-
quetur. Incoercitus furor varias ijs imagines obuerset. Qua-
re vix medicinæ locus est, raroq; qui hauferūt, euadent. Vinculis ergo
cohibendi, vt vinum dulce cum rosaceo bibere, & reuomere cogantur.
Rapi semen bibēdū. Priuatim ijs cōuenit, quinq; folij radix, & hir-
cinus sanguis, aut caprillus, eodem modo sumptus. Roboris, fagi, aut
illicis cortex cum lacte tritus. Malaq; cotonea trita esse, aut cum pule-
gio & aqua bibere, cōueniet. Amomum & balsami semē ex vino. Sed
qui periculis defuncti sunt, diu lecticis decūbūt, et vbi surrexere, stupi-
di reliquum vitæ tempus degunt.

De Ixia. CAP. XXI.

i Xia quæ vlophonō appellatur, interpotādū aliquid ocimo
simile redolet. Vehemētem linguæ inflammationem excitat.
Mētē mouet. Omnes excremētōrū exitus supprimit. Strepī
tū cū animi deliquio ciet. Ijs intestina latrāt, ne fecedit quicq;. Post vo-
mitionē aluumq; resolutam auxiliū præstat, aqua in qua absinthiū ma-
duerit, ex vino largiore, aut aceto mulso pota. Rutæ q syluestris semē
t. ij.

PEDACII DIOSCORIDIS

aut laseris radix. Item tragorigani decoctum, cum aliquo supradictorum, aut lacte, aut resina terebinthina, aut nardo, aut castorio, aut laserpicio, quorum singuli oboli cōueniūt. Quin & nuces iuglandes, cum resina, castorio, & ruta trita, ita vt singula drachmæ pondus æquent. Itidem chamelææ aut thapsiæ aut absinthij succi sicilicum cum aqua mulsæ, & acetum calidum potum.

De Cerusa

CAP. XXII

Antipyrus videretur
77
 Erusa suo colore proditur. Quippe palatum, gingiua, lingua, & commissuræ denti, candamore quodā inficiuntur. Sin-
 gulus, tussim ac linguæ ariditatem excitat. Ijs extrema frige-
 scunt. Mens labat. Membra torpescunt. Quibus dare conuenit
 aquam mulsam, aut ficuum aut maluæ decoctum, aut lac calidum, aut
 sesamæ ex vino tritam, vel lixiuiam ex sarmentis factam. Amaraci-
 num oleum aut irinum, perficorum ossa cum lilij decocto. Columbi-
 na oua cum thure, aut hordei decocto, aut prunis, aut gummi quod
 vlmus plorauit, aut humore quem vlmæ folia reddiderunt, cum te-
 pida aqua. Sed tum quoq; vomant. Conuenit etiam thapsiæ succus,
 aut scammonia cum aqua mulsæ potus.

De Fungis.

CAP. XXIII.

p. v. 178
77
 Vngorum alij genere, alij copia lædunt. Omnes tamen strā-
 gulus suspendio similes concitant. Quibus confestim succu-
 rendum. Communiter ex oleo vomere cogendi. Mirifica-
 ce iuuat lixiuia ex sarmentis aut pyrastrij furculis, epota cum sale, po-
 sca, & nitro. Pyra aut folia pyrastrij cum fungis decocta, strangulan-
 tem illam vim auferunt, mansaq; eisdem auxiliantur. Aduersus fungos
 gallinacea oua cum posca proficiunt, adiecta aristolochiæ drachma.
 Item absinthium cū vino melleq; sumptum & ex aqua potum. Apia-
 strū ex nitro. Panacis radix in vino. Fæx vini cremata cū aqua. Aeris
 flos ex aceto. Radix sinapis & nasturcium esu prosunt.

De Gypso

CAP. XXIII.

77
 Apidescens gypsum strangulationem creat. Quare eadem
 proferenda sunt, quæ manhis fungis auxilia. Inter quæ ha-
 betur maluæ decoctum, quod etiam olei vicem pensat. Vt
 pote cum pingue sit, euomendoq; lubricitatem inducens, deradi cor-
 pora non sinit. Quod vbi duratur in lapidem, efficit. Quinetiam pro-
 dest oleum ex aqua mulsæ, aut ficorum decocto. Lixiuiæ e ficulneo
 cinere aut sarmentis facta cum vino copiosiore pota. Origanum aut

thymum cum lixiuia aut aceto aut passo. Loca decocto maluæ pro-
luenda.

De sanguine tauri.

CAP. XXV.

Auri recens iugulati sanguis epotus, spirandi difficultatē strā-
gulatumq; concitat. Faucium meatus cum neruorum disten-
sione præcludit. Lingua rubescit. Cruore dentes inficiuntur.
Quædam concreti sanguinis vestigia, inter eorum commissuras restāt.
Quare vomitum vitabimus. Sanguinis enim globi per extractionem
eleuari, magis stomacho inculcantur. Dari ergo opus est quæ concretū
sanguinem discutiunt, aluum subducunt. Grossi lacteo succo turgent
ex posca, & nitrū per sese auxiliantur. Nec secus coagulum omne cum
aceto & laserpitij radice, aut lasere. Itidē & brassicæ semen, cinisq; ficul-
neus. Conyzæ folia cum pipere, et rubi succus ex aceto. Alius resoluē-
da. Seruatis fluida per sedem ingeri consueuerunt. Stomachum aluūq;
hordeacea farina ex aqua mulla perungere oportet.

De Coagulato lacte.

CAP. XXVI.

Os qui coagulatum lacte hauserūt, frequens strangulatio inua-
dit, q; in globulos quosdam lac coalescat. Quibus pro antido-
to iuuandis, coagulum ex aceto damus. Et bibere sæpius co-
gimus. Damus & calaminthæ folia arida, item succum. Aut laserpitij ra-
dicem, aut laser cum posca. Thymūq; ex vino & lixiuiam. Sed nulla sal-
silago obijciatur, quoniam magis lac coiret, & in caseum densaretur.
Neq; illos vomere conuenit. Siquidem concretum lac sese in stomachi
angustias insinuans, strangulat.

De argenti spuma.

CAP. XXVII.

Puma argenti pota, stomacho, ventri, & interaneis grauita-
tem cum magnis torminibus addit. Et nonnunq; pondere
suo intestina vulnerat. Vrinā suppressit. Corpus intumet, plu-
beamq; deformitatem concipit. Quibus subuenit secundum vomitio-
nem, potum syluestris horminiij semen, myrrhæ drachmæ septem. Ab-
sinthium, hyssopum, apij semen, aut piper, aut ligustri flos ex vino.
Aridum palumbis fimū, cum nardo & vino.

De argento viuo.

CAP. XXVIII.

Argentum viuum potum eadem quæ spuma argenti infert.
Eisdemq; vtēdū auxilijs. Lac copiose potum auxiliari constat.
sed postea euomant, qui hauserunt.

PEDACII DIOSGORIDIS

De Calce, sandaracha, et auripigmento. CAP. XXIX.
alx, sandaracha, & auripigmentū, pota aluum et intestina cū
vehementi erosione excruciant. Præbenda cuncta quæ suffre-
nare & solvere possunt, & facilem lubricamq; aluum reddunt.
Cuiusmodi maluæ succus est. Dandum decoctum seminis lini, vel fru-
ctus Tragi herbæ, vel Orizæ, lacq; cū aqua multa copiosum, iura pin-
guia, & boni succi.

De Lepore marino

CAP. XXX.

Vileporem marinum biberunt, piscium virus olent. Interce-
dente aliquo tempore, aluus dolore afficitur. Vrina sistitur. Et
si quādo eā reddere cōtingat, purpureū colorē referet. Omne
piscis genus auerſantur, & odio habēt. Fætido ac graui sudore manāt.
Bilioſus vomitus interdum sanguini promiscuus subsequitur. His dā-
dum lac asininum, vel passum continue, aut radicis maluæ foliorumq;
decoctum, aut trita cyclamini radix cū vino, aut veratri nigri, aut sca-
moni, drachma cum aqua multa puniciq; mali acinis. Cedria contrita
cū vino efficax est. Anserinus sanguis vt tepebit potus. Sed cum pisces
omnes respiciant, aspernēturq; solis fluuiatilibus cācris vesci possunt.
bibūtq; eos admisto vino, adiutiq; precoquunt. Cumq; comesse pisces
cœperint, suæ salutis indicium est.

De Rubeta.

CAP. XXXI.

Vbeta aut rana palustris assumpta tumores ciet. Pallor cor-
pus vehementer decolorat, vt plane buxum spectetur. Spirā-
di difficultas torquet & grauis halitus oris, singultusq;. Inui-
ta genitura profusio consequitur. A diuuantur secūdum vomitionē
multo meri potu, et harundinis radicis binis drachmis, aut cyperi. Bre-
uiter cogendi sunt vt exercitationi & cursui se credant ob torporem
quo corripuntur. Quinetiam quotidie lauandi sunt.

De Hirudine.

CAP. XXXII.

Euorata cū aqua hirudines, si ori ventri adhærent, tractione
partium, nonnullam suctionis imaginem præbent. Eo enim
argumento hausta hirudo deprehēditur. Has muria forbitio-
ne excutit, & syrenaicus succus, aut laserpitij folia, aut betæ, cum ace-
to, aut pota niuis glebula, cum posca. Nitrun ex aqua gargazetur, aut
atramentum sutorium aceto dilutum. Si faucibus hæreant, iniecta lu-
pinorum farina, aqua frigida ore contineatur & ad eam hirudines exi-
liant. Prouidendum etiā ijs, quæ & si ferendi auxilij gratia tradan-
tur, non minora tamen cæteris venenis pericula sæpius adferunt. Quæ
lia sūt albū veratrum, tapſia, elaterium, agaricum nigrum. Si quidem
ea strangulatus concitant. Aut immodicas deiectiones mouent.

Quibus ea medentur quæ in fungorum mentione & similibus retulimus. Nipios autem deiectionum impetus, medicamentis quæ excrementa supprimunt coercemus. Neque negligenda quæ gliscente sensum nocumento, pericula ingerunt. Quo in numero sunt sylvestris ruta, gith & nouæ glacies.

De Axe.

CAP.

XXXIII.

Hos flos est spinæ eiusdem nominis. Eos qui vescantur sola vomitio recreat.

De Aqua frigida.

CAP.

XXXIIII.

Qua frigida habunde pota, aut meracum vinum liberalius epotum, aut passum, præsertim a balneo, aut cursu, aut vehementi exercitatione, strangulatus, & dolores infert. Vbi sanguinis missio protinus, & vacuatio imminetia soluunt pericula. Sed de notis veneficiorum remedijs, & cauendi modo, hætenus dicta sunt. Subiungeremus etiam antidota necessaria quæ præclare auxiliatur, quibus vrimur, quale metridatium est præsertim quod sanguine & scincho temperatur. Verum quoniam alij in locis diligentissime scripta sunt, hic ab eorum descriptione sumus perfedemus.

t.iii.

F I N I S

PEDACII DIOSCORIDIS
PEDACII DIOSCORIDIS A
NAZARBEI DE VENENA
TIS ANIMALIBVS ET
RABIOSO CANE
LIBER.

De venenis animalibus et rabioso cane
DE bestijs quæ virus ei aculantur, et exitiâlibus vene
nis, vt circuitus medicinalis ad vmbilicū perueniat,
sermonē facere proposuimus, et quidem cæteris nō
minus necessariū ijs qui medicinæ artem exercent.
Vt pote cū adminiculo eorum quæ in eo traduntur,
doloribus, periculis, et cruciatibus, homines libera
ri cōueniat. Hic tractatus in summas parteis duas,
sicuti ab initio relatū est, distribuitur. Nam qui de feris virus inspuen
tibus differit, theriacus dici solet. Qui vero de amoliēdis veneficijs, ale
xipharmacus, de quo cum commētābimur, simul quæ sequi consueue
runt, quæq; nōnihil auxiliij ferunt, explicabimus. Omnia in promptu
et ad manum artificem habere oportet, propter vrgentem sepenumero
necessitatem. Siquidem pauca e venenis et virulentis animantibus, rar
da et grassantia sensim pericula ciēt, ita vt dillationem admittāt. Ple
raq; vero præsentaneā perniciem afferunt. Hominum autē partim ma
le alteris cogitantes, ingenita prauitate maleficiū ita temperare statue
runt, vt spatium curanti liberum non relinquunt. Partim tristi aliquo
euentu oppressi, hausto spōte veneno, mortem sibi cōciscere conātur.
Qui postea depræhenfi, aut resipiētes, et vitæ cupidi, præsentaneā opē
poscunt. Non desunt qui hostiles sagittas illinentes, aut fontes aqua q;
puteanas hac labe poluētes, citam aduersarijs perniciem moliūtur. In
quibus ipsis maleficiū nō subito, sed aliquātō post respōdere natura sua
cōparatū est, tū nisi primo quoq; tempore coerceatur, et remedijs sub
inde excipiat veneficiū, frustra postea succurritur, occupatis iā cor
poribus exitiali vi veneni. Proinde non vulgari industria diligentiaq;
in ea re vtēdū est, vt quod in alijs incōmodis ars cōsuevit, in his quoq;
salutē mortalibus præbeat. Quin et apud priscos modus hic vnus exi
stimabatur eius partis. Sed recentiores ipsum discreuerunt, nominan
tes præcautionem et modum præcauētem, salubris sanantisq; medium
statuentes. Qui parua et leui supramodum persuasione freti, magno in
errore versantur. Siquidē treis in humanis corporibus constitutiones
esse contendunt. Vnam qua sani degimus. Alteram qua sinistra valetu
dine corpora laborāt. Tertia mediū inter vtramq; locum sibi vēdicat.

In qua positi, sanitatem specie mētuntur facileq; in morbos & pericula cōcidung, propter mortiferam vim quæ in eorum corpus incumbit. Quemadmodum in ijs videre licet, quos excādescens rabie canis mor-
morderit, necdum tamen aquam horrent. In ijs quoq; qui cantharidas hauserunt, sed nōdū vrinæ tormēto cruciantur. Tripartito igitur artē digeri tripliciq; constitutioni respondere tradunt. Salubrē partē esse volunt, quæ sanitatem tuetur. Præcauentem eandemq; prohibentem, quæ obstat quo minus in morbos incidāt. Et in sanātē, qua vitia discu-
tiūtur. Quibus ita respōderi potest. Quod primū per illud additamē-
tū nō treis corporis tantū, sed quattuor haberi constitutiones fatendū esset. Quippe vt aliqui sunt, qui necdum morbo laborant, morbo tamē maxime ob impendentem causam sunt obnoxij, ita sunt qui iam priore morbo defuncti, nondū tamē secūdæ valetudini restituti sunt. Id quod a morbo proximo sese recolligentibus cernere licet, qui virium recrea-
tionē et robur desiderāt. Sed quemadmodū ægrotantiū cura ad partē medicamentariā pertinet, ita quod morbos amolitur, eidem subijci par-
est. Ad arcēdas enim valetudines vehemētibus vimur auxilijs, altio-
re scarificatu, vstionibus, āputatione, derodētibus episthematis, potio-
nibus perniciosi occurrētibus, & plerisq; alijs. Verūeniūero sūt vsq; eo-
rudes nonnulli, vt ne remedia quidem appellent, quæ morbos arceant.
Cuius sententiæ inire rationem haud promptum est. Etenim cum ver-
bum ipsum præcauere tum opus præcauentis, modum omnino auxilia-
rem remediariūq; præ seferunt. Mirum vero, nisi etiam sua illa distri-
butione partium, eos complectuntur qui in pestilentis cæli statu mor-
bo nōdum correpti sunt, pesti tamē propter obuersantis aeris occasio-
nē, opportuni et in morbū prōni reddūtur. Dicere forsitan quis posset
salubris institutionis alimētaria præcepta non aliud esse, q̄ arcendorū
morborū rationē. Quippe cum firma reddere corpora, et minus vitijs
obnoxia nitamur, vt inoffensa valetudine degāt, nec morbis confidē-
tur. Neq; id silentio prætereundum, quod pēculariter ad rem pertinet,
non oportere medicinæ partium distributionem, totidem corporis cō-
stitutionibus respondere, sed naturas peculiaribus vniuscuiusq; notis
conijcere, vt suis locis ostendimus. Cum ijs igitur non pluribus agen-
dum. Illud magis adnotare conuenit, affectus qui a virulentis animali-
bus venenisq; contrahuntur, cæcos vocari. Quin & ea quæ eisdē auxi-
liantur, nulli sūt addicta causæ. Quapropter quæstionibus obseruato-
riæ artis, quæ ratione fulciatur, annumerari solent. Neq; ex se verū de-
prehenditur affectus huiusmodi cæcos esse. Nam quod semper se pro-
trahit & nullum in quibusdam necessarijs vsum exhibet non facili cō-
iectura colligi potest. Et si secundum proprietates prorsus cæcos eos

PEDACII DIOSCORIDIS

affectus concedimus, quia exitialibus venenis & animantibus quæ
 virulento morfu sæuiunt, contrahuntur, nō tamē quod ad quos nōnul-
 lum vsum præbet datq; medendi occasionem, aut imperceptibile, aut
 cæcum nullivæ causæ obnoxium reputatur. Sed magis ab ipso quis
 impulsus, fidē quā habet & opinionē de abditorum cognitione con-
 firmare poterit. Nam etsi sæpe minora sunt q̄ vt sensibus percipian-
 tur, euidenter tamē ex alijs correspōdentibus depræhendūtur. Diocles
 autem in eo commentario quem Plistarcho dicauit, satis modos per-
 strinxit, ad hanc verborum sententiam scribens. Nosse quis hoc potest
 cum in alijs non paucis, tum in viperis & scorpionibus, & reliquis id
 genus, secum animo reputans vt quamuis exiguo sint corpore vixq;
 conspectui subijciantur, magnorum tamen discriminum ac dolorum
 causas inferunt. In quibus nihil præter quandam corporis exiguita-
 tem vehementiamq; præ cæteris animantibus datam illis, facile fue-
 rit spectare. Quanta enim scorpis magnitudo aut corporis moles existi-
 mari potest: si ad eius idum cōparauerimus aut reliquorū id genus car-
 ne perimentium. Quorum aliqua vehemētes cruciatus excitant. Alia
 erodunt, & pūtre dines cient. Nec desunt quæ præsentaneā perniciem
 moliantur. Nonne quod a phalangij morfu virus ingeritur, vniuer-
 sum corpus excruciat: At neq; quis vehementiam ipsorum a mole
 depræhendere posset, cū prorsus exiguo corpore cōsistat. Ergo q̄ hæc
 ad affectus referantur, constitit inter omnes. Verum q̄ exacte depræ-
 hēsum sit, vim quandam ipsis inesse mortiferam, quæ permixta cor-
 poribus molestiarum quæ exoriuntur causā sit, in confesso est, & om-
 nium consensu defenditur. Nec quisq; offendi posset vsq; adeo con-
 tentionis studio flagrans, qui aliunde exoriri molestias asseueraret, q̄ a
 materia mortifera partem corporis attingēte. Porro id fuit quod inter
 vtilia artis opera dicere cogit, nos nihil prorsus lædi ab incōpræhēsi-
 one per proprietatem communis causæ, cum euidenter tum indicari
 possit cum depræhēsa est: Ideo Erasistratus empiricorū pertinaciam
 graui cauillatione incessens, cæcis affectibus causas assignauit. Inficia-
 tus communem causā quæ morbis accessit, esse incompræhensibilem.
 Et hanc in eo quem de causis scripsit commentario aptissime pro-
 didit. Nec ferendos eos esse censuit, qui se dicant in quibusdam, vt
 in venenis, serpentium ictibus, & cæteris id genus, trita meden-
 di ratione contentos esse. Observatio igitur compræhensionis cau-
 sarum, nobis perfecte diuidētibus satisfacet. Primum enim per genus
 compræhendi non possunt. Quod autem sit lætifera vis corporaq;
 permutans, ita vt perimar, ex ijs quæ per genus, non per speciem vagā-
 tur, medelam subscribit, quæ hæc hebetare, & prorsus expugnare liceat

Quando subiunxit, Ad aquā dulcem & potui idoneā venit quis, & āte
 obseruationem in vomitum, propter ferientis vehementiam, & demor-
 se partis fracturam, Cucurbitulas adfixit. Vrentia medicamēta, aut
 ea quæ vim eandem adipiscuntur admouit, postremo partem am-
 putauit. Secum reputauit medicamina, quæ ad summa cutis adijci-
 untur, immissa ad intima perniciē repugnare. Hæc itaq; quæ pro-
 posuit Erasistratus, veritati consentanea sunt, nec arti refragantur.
 Sed methodicos demirari licet, qui mortiferam vim corporibus
 illapsam negociorum quæ ipsa facessit, esse causam diffiteantur. Verum
 rudiuscule nomini attendūt. Nam apud ipsos palam immisa vis φθορο-
 ποιός id est mortifera nominatur, φθοροποιός δὲ αὐτὴ aliquid esse volunt,
 quod nulli rei sit causa. At ut hæc nomina μάστιγος & ἀρακάλλιπτερ
 esse reliquis omnibus similia, in quibus partes quædam dictionum nō
 pro virtute, sed nuda prolatione compræhēduntur. Enimvero quem-
 admodum in his vocibus μάστιγος & ἀρακάλλιπτερ partes, vernacu-
 los & præcedētes nō retinent significatus, sic in hoc verbo φθοροποιός
 partes productionis gratia nō pro virtute coalluerūt. Hinc ad causarū
 differentias trāseunt. Afirmātq; causarū aliquas euidentēs esse, quæ dū
 aduersam valetudinē creatūt, separantur. Cuiusmodi sunt frigus, la-
 bor, insolatio, æstus, et similia. Quas dā cōtinētes, quæ permanēt postq;
 morbū excitatūt, hoc est, cū præsentēs sūt, et effectus eorū ad sūt. cū in-
 crescūt, effectus augētur. cū decrescunt, minuuntur. et cum definūt, fini-
 untur. Quin per se prodeuntes effectus, alicuius finis gratia esse pos-
 sūt. Tales quidem probatissimæ sunt causarum differentia, quarum
 nulli phthoropœon subijci potest. Euidens enim causa non est, quo-
 niam morbus ipse permanet, nec corpore separatur. Nec continens
 causa dici potest, cum magna ex parte hæc ad sit. Quemadmodum
 accidit, ijs qui a rabioso cane sunt demorfi. Quod si neq; euidentis causa
 neq; cōtinens fuerit, neq; ad finem coadiuuatē causam referri potest.
 Si vero & nulla causarū differentia phthoropœon deducere possumus,
 causam non esse fatebimur. Quod autem asserunt, nomina quædam in
 se non habere parteis rerum significatiuas, sed nuda & simplici prolati-
 one ficta esse, fateri necesse est. Verum non omnia sed perpauca talē nā-
 cisci conditionem existimandū est. Namq; ποιεῖν in hoc nomine φθορο-
 ποιός, perinde atq; adsumpta profertur. Sed peculiarissimā vsurpat
 significationem. Quæadmodum enim φθορά id est corruptionis nomē
 mutationem in peius significat, sic hoc verbum ποιεῖν sumi debet, vt
 nihil in dictione φθορά sortiri se declaret, neq; profr^o id significat quod
 omnes audiunt, & hinc simile redditur, παῖδά ἐχέτω δάψος. Si dant a

PEDACII DIOSCORIDIS

corruptione salubre fieri morbum, concedunt utque vi huiusce verbi potest, nisi quid corruptionem efficiat. Omne autem quod aliquid efficit, ostenditur per singulas causas quae corporibus subiiciuntur, praesertim in immixtis venenis. Verum non nihil subiacere causarum differentiis praedant. Quinetiam aberrarunt non exactam diuisionem assumentes. Qui vero se dogmaticos profitetur, causam esse partim praeparantem, partim continentem asserunt, ut inguinum vlus & inguinariam febrem, quod effectui tum assistant, tum etiam separentur, ut a fractis praecipitatio. In summa quoties quidpiam suapte natura causa fuerit, nec vlla diuisione comprehenditur, vitiosum est, neque causa adscribitur, eorum quae idem genus fortifit. Sed quod phlegoropoeon id est mortiferum causa sit, nomen ipsum argumento est, & in ijs quae contingunt apertius ostenditur. Quid aliud causa arbitrantur esse possit impressum a serpentibus idum, quod ex animante vim & illapsum in corpora virus. Neque enim frigus, neque aestus, neque crudiratem, neque aliud quicquam, causari possunt. Verum quoniam causarum differentiis gaudent, & aliquas continentes, alias euidentes appellant, ipsis dicendum, altero istorum modorum euidentem dici causam, quod effectum praecedat, & corporis compagem occupat. Continentem vero quod morbis praesentibus adest, quae separata recedunt, quae cum ipsa euenerant. Sed de ijs haecenus. Fatendum itaque mortiferam vim intrinsecus manifestissimam esse causam. Ipsamque principem facere scopum oportet. Et antequam morbis considentur, varijs modis est certandum, donec vis tota corporibus excutiat. Modo in loco praesertim principatum non obtinente, ante coercetur, quam altius irrepens viscera tangat. Aut eius pernicies eluatur, aut iam membratim peruagatura suffrenetur. Itaque venena si hausta sunt, crebris vomitionibus, si morsu impressa, scarificatione, affixis cucurbitulis, exuctu, carnis circumscriptione, nonnunquam amputatione extremam partis, euocantur. Clysteribus, & impofitu medicamentorum acrium cohibetur. Haec sunt utique arcere virus & eluere possunt. Resinguntur meratiore potu, aut passo nulla aqua diluto, vel contrariorum esu, quae acrimonia sint praedita. Postremo deiectione alui, euocamus, auxiliantur. Verum enim uero non latifera modo materiam, sed & magnitudinem, & tempus efficere scopum & propositum oportet. Etenim ab ijs remedia quam plurimum discrimine capeffunt. A magnitudine quidem, cum nonnulla ex venenis, & virosis animalibus pericula minantur. Alia putredines altas aut exteriores excitant. Alia vehementissimos dolores aut cacos eient. Alia vix medicamentis cedunt, & magis minusve molestias excitant. Oportet autem ea quae pericula

ferunt euincantibus auxilijs expugnari, & minus infesta mitioribus. Quippe, absurdum fuerit in maioribus, tardiore medicamentorū vsu homines in discrimē afferre. In minoribus vero vehementiū auxiliorū iniuria laceffere. Finitio a temporibus in promptu est, aut enim subito in pericula & præsentes molestias adducit, aut sensim & dillatas in tēpus. Itaq; præsentibus multa simul auxilia repræsentrari oportet. Reliquis paulatim. Hæc quadam artis formula breuiter definita sint. Iam membratim procedamus.

Signa rabiosi canis & demorforum ab eo.

CAP. I.

E rabiosi canis morfu sermonē alijs præposuim⁹, q̄ id animal domesticū ac frequēs esse cōsuevit, et rabie sapius corripit, ac perit, ab eoq; cauere difficile. Inde periculū ineuitabile hominē manet, nisi multis vtat auxilijs. Canis plerūq; flagrantissimis aestib⁹ in rabie efferatur. Interdū quoties frigora incesserūt. Rabiosus autē potū & escā auersatur. Largā spumantēq; pituitā narib⁹ et ore proijcit. Torue & solito tristius intuet. In omnes passim sine latratu irruit. Acque feras hominesq; tā familiares q̄ ignotos mordet. Nec protinus infestū quicq̄ infligit, nisi vt vulnus dolorē. Exinde morbus ille qui ab aquæ metu hydrophobicus graia est voce appellatus, contrahitur. Euenit autē cū distentione neruorū, totiusq; corporis rubore, præserti faciei cum sudore & lāgore quodam. Aliqui auræ splendorem fugiūt. Alij sine vlla doloris intercapedine vexantur. Sunt etiā qui canū morulatratus ædant, interuenientesq; morfu adoriuntur, ac mordentes simili vitio labefaciunt. Nisi forsitan narratione vnum aut alterum euasisse audiamus. Siquidem Eudemus superasse quendam affirmat. Themisonem aliqui demorsum in idem vitium incidisse & euasisse fatentur. Alij amico aquam expauescenti morem gerētem & officiū exhibētem, quadam naturarum concordia similem subiisse affectum. Sed post multos tandem cruciatus seruatum extitisse. Molestissimum itaq; genus morbi, a quo multos anteq̄ ipsum experirentur vindicauimus. Et complures ab alijs medicis seruatos nouimus.

Remedia demorforum a cane rabioso.

CAP. II.

Atio medēdi duplex. Vna communis qua vtendū in omnes morsus, quos virulentæ animantes impresserunt. Alia peculiaris priuataq; eorum duntaxat quos rabiosi canes momorderint. Quæ nonnullis quidem summam opem ferre consuevit. Alijs vero inutilis, maxime qui ex multo iam tempore, idum accēperunt. Quæ ad hāc pertinent, primum exponemus. Deinde cursim perstringemus, quæ ad communem medendi rationem pertinent. Cancros itaq; fluuiatiles cum sarmentis albæ vitis cremare oportet, & cinerem

PEDACII DIOSCORIDIS

eorum q̄minutissime tritum habere reconditum. Itidem gentianæ radicem tufam cribratāq̄ reponere. Quoties autem canis rabioſus morſum intulerit, in quaternos cyathos vini bina cineris cancrorum cochlearia vnūq̄ gentianæ conijciātur. Hæc in polētæ madefactæ modū ſubaſta, quatrīduo bibantur. Inter principia medicamentum hoc modo detur. Atqui ſi ab illato morſu duo aut tres dies fluxerint, curatio nem auſpicabimur a triplicato pondere, ſupra id quod ab initio retuliſmus. Optimum hoc aduerſus rabioſorum morſus auxilium, quod & multis vnum ſatiſfecit, eoq̄ cum fiducia vti licet. Sed vt alijs etiam nū auxilijs cōtra ineuitabile periculum muniamur, nihil cæteris vti proſhibet. Satiſ autem multo fuerit medicamentorum ſcūitiam tolerare, q̄ propter negligentiam in diſcrimen adduci. Nec ita in demorſis a rabioſo animali maiora vulnera vereri oportet, vti minora, & vlcuſculis cutis ſimilia. Quippe maiori vulnere copioſus ſanguis emanans, poteſt nōnihil virulenti liquoris exhaurire, quod in minoribus non accidit. Quin a maioribus abſcedentes carnes hinc auferre, & labia acie ſcapelli circūſcribere, & præhenſam hamo carnem amputare oportet. In vtriſq̄ circumſtantijs loca altioribus vlcuſculis ſcarificanda, vt ſanguinis vacuatio reſiſtat, ne venenum membratim inſinuetur. Cucurbitulæ cum multa flamma agglutinatæ id iuuamenti præſtant, vt veneni viſ extrahatur.

De Viſione.

CAP.

III.

Contra virulentos iſtus, viſtio expeditiſſimum eſt auxilium, c vt pote cum ignis cætera viribus præſtet. Simul quod virus domet, & ferri penitus non patiat, ſimul q̄ pars ignem experta deinceps non vilem nec indecoram loci inſtaurationem efficiat, manente diutius exulceratione. Anima duertendum ex eo tēpore cum cruſtæ decident, ne vlcereſ oræ coaleſcāt, & cicatrice induātur, ſed ſi fieri poteſt ad præſinitū tempus vlcerationes & ſordidas adhuc et inſſā mationē minantes, prorogari conuenit. Quod inditum ijs ſaſamentū optime præſtabit, et ſylueſtre alliū detritū. Itē cape ſuccuſq̄ præſertim cyrenaicus, aut qui medicus aut parthicus appellatur. Tritici grana tam manſa q̄ non manſa imponantur, ſiquidē ſubaſta piſtave obperſionem vulnera dilatant. Sunt qui a mandentium ieiunio, ſibi aliquid aſciſcere arbitrentur, quod ſua pte natura reſiſtat. Verum tamen id non conſtat. Cæterum tempeſtiue his vtendum. Si vero quod perſæpe accidit, ante dies præſinitos cicatrices coirent committerenturq̄, manū poſtulabunt. Namq̄ eas diducere carnemq̄ ſcapello circinare, aut iterum inurere expediet. Vbi vero propoſitum tēpus præterijt, vlcus ad cicatricem ducendum, & emplastro quod e ſalibus cōſicitur locus cō-

præhendendus. Nec multo post sinapismo vendum.

De Ratione viſtus in morſu rabioſi canis. CAP. IIII.

Væ ad partem iſtâ pertinent præſidia, ita ſe habent. Cæterû

q viſtus rationē ex ijs quæ veneno aduerſantur, cōiectura quædam colligere oportet, ſimul vt veneni vires hebetet reſtinguatq, ſimul vt arceat, quominus ad itima pernicies illabatur. Etenim aſſumpta pernicioſarû viriû penetrationi reſiſtūt. Quorû vtrûq; præſtare poteſt vini merationis paſſi & lactis potus. Quippe qui hæc omnia capiūt ad curâ, nō nihil veneno obijciūt, quod omnē eius acrimoniam obtûdat. Simili modo aliorû pororû caparûq; cibis, q; ea difficulter cōficiātur & aboleātur. Nā multos dies huius cibi qualitates remanēt, quo tēpore nec euincuntur nec permutātur a mortifera vi. Cōtrarijs illa vis expugnatur. Cui rei antidotorû vſus accōmodatur, & theriaces metridatij & eius quod eupatorio tēperatur, deniq; omniû quæ magnâ aromatû partē ſibi vëdicāt. Quippe aromata omnia viribus & ſubſtantiæ ægre permutātur. Quare in corporibus euincunt. Viſtus ratio hoc modo ſe habet. Noſſe cōuenit pauorē aquæ nō ſtato definitoq; tēpore exoriri. Plurimû tamē ad quadrageſimū vſq; diē neglectis differri cōſuevit. Poſt ſemestre etiâ nōnullos inuadit. Quēdā poſt annû aquâ horruiffe nobis præſertim cōpertû eſt. Narrât & aliquos poſt ſepreniû aquæ metu fuiſſe tētatos. Inter principia demorſorû a cane rabioſo curâdi ratio talis eſt. Verûenimvero ſi ea quæ retulimus auxilia primis dieb⁹ prætermiſſa fuerint, nec ſcalpro carnē circinare, nec vſtionē experiri operæ preciû eſt. Nō enī quod iâ pertrâſijt ſatis euocare poſſent. Nulla vtiq; adiectionis vtilitas, ſed in caſſû corpora doloribus ſternētur. Alter vero curationis modus accedat. Deiectionio magnû præbet iuuamētû, vt pote cū mouēdo, corporis habitû trāſmutet. Et quæ colocyntidē recipit hiera, item lac ſciſtum quod ſimul deiectionem moueat & venenû domare poſſit. Cibi acres & meraculi potus, quibus viſ veneni vehementer retunditur, quotidie ſumi debent. Cæterum ſudores ante cibos & poſt etiam ciendi. Dropaciſmi ſinapiſmiq; particularim per corpus totum adijciendi. Sed longe omnium efficaciffimum auxilium heleboriſmus cognoscitur, quo cum fiducia non ſemel atq; iterum ſed frequentius ante quadrageſimû vel poſt hoc tēpus vti licet. Tantam enim vehemētiā hoc auxilium habere fertur, vt quidam qui iam aquæ metum ſentirent, ſumpto heleboro, ſimulac primum morbi impetum experirentur, fuerint ſeruati. Nam & iam vitio tētatos neq; parum adiuuare poteſt. Itaq; primum curam cōtra rabioſi canis morſus breui ſermone expoſuimus. Iâ ad alia quæ venenatis morſibus ſequi re conſueuerūt, tranſeundum. Notaq; vno prætextu, deinde commu-

PEDACII DIOSCORIDIS

nem medendi modum, qui omnibus conuenire possit, explicabimus. Cursim postremo subiungemus ea, quæ sua proprietate nonnullis auxilium præstare possunt. Subnectemus etiam venenata quæ nullis cedunt remedijs.

Pedacij Dioscoridis Ana-
zarbei de venenatis ani-
malibus & rabioso
cane Septimi
Libri

F I N I S

PEDACII DIOSCORIDIS ANA- ZARBEI DE NOTISEORVM QVIA VENENATIS DE- MORSI SVNT, LI- BER OCTA- VVS.

De Phalangijs. CAP. I.

D Emorsis a phalangijs locus quidē ipse, quasi ab im-
pacto aculeo rubet, non intumescens, nec per ambi-
tum calidus, sed mediocriter subrubens. Vbi vero
contrariorum occursum refrixit, consequitur corpore
toto tremor, distentiones circa poplites & inguina,
conuulsionibus non dissimiles. In lumbis collectio
exoritur. Perpetua vrinæ libido laceffit, multaq;
reddendis excrementis colluctatio. Vniuersa cute frigidus sudor ema-
nat. Collachrymant oculi, offusisq; nebulis caligant.

De Scolopendra. CAP. II.

f I scolopēdra aut dicta ophiothene, morsum intulit, locus per
ambitū liuore sugillatur et cōputrescit, iterdūq; licet raro, se-
culētus atq; ruber cernitur. A morsu ipso exulcerari locus in-
cipit. Vlcus id negotium exhibet, fere remedijs inuiſum. Præterea
toto corpore prurigo sentitur.

De Scorpione. CAP. III.

f Corpionis morsu inflammari statim incipit locus, & indu-
rescit, ac intentus rubet, vicissimq; dolore premitur. Modo si
quidem exæstuat, modo frigore occupatur, labor repente sa-
tigata, si quando meliuscule habet, aliquando recrudescit. Consequitur

fudor, horroris sensus et tremor. Extremæ corporis partes refrigerantur. Inguina extolluntur. Tubercula in sede profluant. Capilli eriguntur. Pallor membra decolorat. Dolor tanq̃ ex pūgente acu, per vniuersam cutem sentitur.

De Pastinaca marina. CAP. IIII.

I marina pastinaca percussit, protinus accidunt molesti dolores, assiduæ cōuulsiones, labor, & ibecillitas. Mēs percussis labat. Postea obmutescit. Oculi calligāt. Percussus autē locus in ambitū cū vicinis partibus denigratur, & ita obstupescit, vt tāgentem non sentiat. Hunc si quis premat, atra sanies, crassa & male olens excernitur.

De Mure araneo. CAP. V.

Mure araneo percussis, circa morsum in orbem inflammatio exoritur, nigraq̃ pustula diluta sanie turgens exurgit. Proximæ partes liuent. Rupta pustula, deuorans vlcus, nō ei dissimile quod serpit occupat. Intestinorū quoq̃ tormina, difficultas vrinae, & humoris offusio consequuntur.

De Vipera. CAP. VI.

I vipera momordit, corpus intumet, vehemēter arescit, subalbidumq̃ colorem concipit. Sanies a vulnere profunditur, suppinguis, mox cruenta. Pustulæ adustis similes erumpūt, & antea depascens vlcus, quod in proxima repens non summa modo corporis, sed intima quoq̃ corripit. Gingiua ijs cruore suffunduntur. Inflammatio circa iecur erumpit. Tormina & biliosi vomitus sequuntur. Sopor & vrinae difficultas accedit, & frigidus sudor offunditur.

De Amphibæna. CAP. VII.

Onsimilia eueniunt ijs qui ab scytala nomine, aut amphibæna demorsī sunt. Eademq̃ fere auxiliantur. Quare hoc venenū priuatam descriptionem sortitum nō est, quia non eidem generi assignandum sit.

De Druino. CAP. VIII.

Druino morsus pustulæ molestiq̃ dolores incidunt, præsertim qua dilutæ saniei emissariū subest. Quinetiam erosio torminaq̃ consequuntur.

De Hæmorrhoo. CAP. IX.

B Hæmorrhoo idē vehemētes cruciatus accidunt, qui breuē strigosamq̃ prorsus raritatem ex continuo dolore præbent. Ex plaga copiosus cruor effluit. Et si qua cicatrix corpore nonnūq̃ adfuerit, frangetur, & sanguine manabit. Excrementa per aluum cruenta eiiciuntur. Profluensq̃ sanguis in globos coijt. A pulmo

PEDACIIDIOSCORIDIS

ne sanguinem extussiunt, & nullo deniq; remedio euomunt.

De Dipfade.

CAP.

X.

Vos dipfas percussit, intolerabilis ardor premit. Sitisq; vsq;
 q eo pertinax, vt satuari nō possit, ac sine vlla intercapedine exa-
 cruciet. Et si potū affatim trahāt, illico in eamdē sitim relabū-
 tur. Is vero qui per initia potum non hauserunt simile quiddam prorsus
 accidit. Quare propter continuam sitim & prester & caufon aut
 pfas appellatur.

De Hydro.

CAP.

XI.

B hydro demorhis vlcus dilatur, & liuidū ac ingens euadit.
 a Sanies ex eo multa & atra & male olens nō secus atq; ijs
 quæ serpunt vlcibus expuitur.

De Cenchro.

CAP.

XII.

Enchrimorsum, qui viperino icui similis est, putridū vlcus
 c sequitur. Carnes antea vt in aqua inter cutem prætumide desinūt.
 Letargo corripitūtur, et veterno pressi somnōs captāt.
 Erassistratus eos iocinere, vesica, coloq; conflitari author est. Quippe
 dissectis ipsis omnes fere partes corruptæ reperiantur.

De Ceraſte.

CAP.

XIII.

Ceraſte percussis locus attollitur, cum duricia pustulosus.
 a E plagas sanies profluit, modo atra, modo pallidior, sed circa
 concrementum totum rutileſcit, genitale intenditur, mens labat,
 oculorū caligo exoritur, deniq; rigore neruorum distenti cōmoriuntur.

De Aspide.

CAP.

XIIII.

B aspidē icū, vulnus exiguum prorsus, quasi ab adaſta acuta
 a citra eleuationem conspicitur. Sanguis exiguus ille qui
 dem sed ater destillat. Caligo velox oculos obnubit. Labor
 in totum corpus multiplex, omnino leuis & non sine voluptate con-
 sequitur. Ideo Nicander perpulchre cecinit. At vir perit absq; labore,
 discolor atq; virens. Aliquātulus cordis æstus afficit. Frons perpetuo
 reucllitur. Genæ contremiscunt, quasi sine sensu in somno vacillent.
 Hos mors tollit ad diei trientem non dillata.

De Basilisco.

CAP.

XV.

Raſtratus in libro quem de medicaminibus & venenis con-
 didit, de vocato basilisco scite ita refert. Cum basiliscus mor-
 c morderit vulnus ad auri colorem exſtaeſcit. Itaq; in pluri-
 mis quæ virus ei aculantur comites notæ ita se habent. Transcentes
 vtiq; ad medendi rationē primū, vt fieri poterit, de communibus dis-
 feremus.

Cōmunis curatio in oēs iētus virulētos. CAP. XVI.

Duersus quidē omnē animalis iētū, quod venenū vibrat, oris
 a suctio conuenit. Sugentē vero oportet ieiunū nō esse, sed et
 cibū sumpsisse, et vino os abluisse. Postea exiguum olei in ore
 continēs iētū exugat. Locus ipse spōgia fouendus. Deinde scarifican-
 dus. Sed vlcuscula alius iprimere expedit, quo virosa materies profun-
 do euocetur. Circinatio autē carnis, & sectio, scarificatione longe potē-
 tius opitulātur. Nāq; ab ijs duo peculiaria præsidia fiunt. Vnū quod
 virus e loco tollitur. Alterum q; ante occurrens q; interna subeat, cum
 sanguine copioso excernitur. Q; si locus carnis circūscriptionem nō
 admittat, cucurbitulæ cū largiori flāma adhiḡendæ sūt. Sed iā de vssio-
 ne supra in rabiosorū morfu, differuimus. Si vero iēta pars vtpote ex-
 trema, sectionē cōmode nō respuat, præsertim in omnibus serpentibus
 vt aspide, cerasse & similibus, proculdubio amputanda est. Conueniē-
 tiora supradictis auxilia sūt quæ epithemata vocāt. Imponat fermēti-
 cius cinis, aut ficulus, cū lixiuio, subacta stacte, garo, & acrisallamē-
 to. Porri capæ & allia modo minutissime cōtrita illinūt, modo crema-
 ta vulneribus injiciūtur. Quinetiā dissecti gallinarū pulli cū maxime
 tepent, percussio loco cōuoluuntur. Nec desunt qui hisce tanq; discor-
 dia quadā naturali pugnātibus vtantur, verū huius rationē inire facil-
 limum fuerit. Gallinæ enim calida natura prædictæ sunt, argumento, q;
 deuoratū infigne virus eliquēt, & aridissima quæq; semina cōsumant.
 Item nōnunq; harenas lapillosq; quos faucibus infinuauerint, dissoluūt.
 Itaq; animantis calore, spiritus iētæ partis imperū capefcens, venenū
 exigit. Nec me fugit, quid i ægypto fieri soleat. Cū spicas ægyptij me-
 tūt, ollā picis paratā habēt, & appēsā fasciā. Tūc enī maxime serpentiū
 iniurias expauescūt, tū propter spicilegij tēpus, tū q; opacis simul ab-
 ditæ spelūcis, & cauernis, densoq; aruorū cespite delitescūt. Molestio-
 ra enim animalia & virus erudantia, ægyptus in cāpis ferre cōsuevit.
 Vbi ergo aut in pedē aut partē aliā morfuni intulerunt, assidentes, fas-
 ciam in ollā picis conijciunt, & semel aut iterū brachiū aut crus pau-
 lum supra vulnus obligant, et arctissime duo e præsentibus dstringūt
 locūq; secātes qua circūactus est laqueus, picē instillāt. Cūq; satis vul-
 nus excepsisse videtur, laqueū resoluūt, & cæpis alijsq; supra memora-
 tis illiniunt. Præterea pix liquida cum sale trito et feruente illita, præ-
 sentaneo est auxilio, si iugiter innouetur. Conuenit et cedrus, & simū
 caprarum ex vino decoctum. Locū aceto calido, calamintha in lotio,
 maris aqua, aut acida muria decocta, foueri salutare est. Quinetiam nō
 desunt emplastra vehemētissima, et calidissima, quæ venenum ellicere,
 expugnare & discutere possunt. Cuiusmodi sunt quæ ex sale aut ni-

PEDACII DIOSCORIDIS

tro sinapi et semine roris marini componuntur. De quibus consequenter erit tractandum. Erasistratus autem non iniusta reprehensione eos incescit, qui incognitas ad hunc usum facultates conscripserunt, ut elephantis, testudinis sanguinem, aut crocodili oua, et confimilia. Nam cum iuuantia quædam literis tradidisse videtur, plane in hæc sola incidentibus imposuerunt. Quare talia deuitanda sunt, cum difficile nisi regia facultate, peruestigari possint, neque quo nostra fides ijs obstringatur frequenti obseruatione, sufficiens experimentum præstiterint. Quæ autem ad communem omnium usum pertinet, quæque facile suppeditari, & omnibus a serpente percussis auxilium ferre queunt, subiungenda videntur. Intubus itaque & erica & asragalus cum aceto potus, contra omnes serpentium morsus auxiliatur. Item bitumen & virentes platani pillulæ in vino diluto coctæ, & paliuri decoctum, radix aristolochiæ et eringij. Decoctæ etiam lauri bacæ & deuoratæ piperis largius esitatum, rura anetum, & cyclaminus. Coma porrorum priuatim ex pane, aut alium aut cæpe, salsamentaque acerrima, origani decoctum cum vino potum, sæniculi, pulegij, calamithæ porrorumque succus cum melle desorbis. Hæc quidem a plantis conquiruntur. A bea animalibus vero quædam commode perisolent, gallinaceorum cerebella in cibo, leporinum coagulatum cum vino. Item castorij sextas. Testes marinæ testudinis sumpti multum prodesse traduntur. Mustella sale inueterata inter auxiliaria medicamentata est. Inuenitur etiam prius exenterata, saleque succescens inueteratur, ex aqua binas drachmas cum vino bibisse satis est. Sed de simplicibus quæ dari solent hætenus. Percussis a serpente prodest alui deiectionio, diffusus sudor, vrina copiose reddita. Composita etiam quædam receter remedia polliceri traduntur, ut & opij & myrrhæ singuli oboli, piperis quicumque. Ea melle excipiuntur & istar ægyptiæ fabæ dantur. Item syluestris rutæ seminis, gith, cumini æthiopici, aristolochiæ, galbani, singulorum pares portiones tritæ & cum erucæ succo subactæ, digeruntur in pastillos, qui drachmæ pondus æquent. Dantur ex ijs terni cyathi cum vino. Hæc habui de communibus auxilijs quæ dicerem. De peculiaribus remedijs contra bestias quæ venena vibrant, consequenter est dicendum.

Pedacij Dioscoridis Anazarbei de venenatis animalibus & rabioso cane Octauij

Libri

F I N I S

155

LIBER NONVS
 PEDACII DIOSCORIDIS ANA-
 ZARBEI DE REMEDIIS CON-
 TRA VENENATOS
 MORSVS LI-
 BER NO-
 NVS.

I Nterferentiū venenatorū notas nihil de vespis et apibus articulatim digestūmus, q̄ conspicuæ omnibus forent, et nihil excellens aut notatu dignum in his obseruaretur, inter remedia tamē, earum meminisse non fuit alienum.

De Remedijs cōtra vesparū apūq̄ iētus. CAP. I.
 Duerfus apū vesparūq̄ iētus, prodest illita malua & hordeacea farina cū aceto, ficulneū lac in vulnus instillatū, a muria aut maris aqua fctus.

De iētis a Phalangio. CAP. II.

p Halangiorū iētibus ficulneū cinerē adiecto sale trito & vino imponere oportet, aut radicē syluestris punici q̄ tenuissime tritam, aut aristolochiam hordei farina & aceto subactam.
 Vlcera aqua maris proluenda, aut apiastri decocto. Folia eiusdem illinenda. Lauacris perpetim vtendum, & potionibus quæ hæc medicamenta recipiant, abrotoni semen, anisum, aristolochiā, cicer syluestre, cuminiū æthiopicū, cedrides tritas, platani corticē, & trifoliā herbæ semē. Priuatim autē singulorū ex ijs binas drachmas dare cū vini hemina cōuenit. Itē myricæ fructus & chamæpityos, & viridiū cupressi pillularū decoctū, ammisso vino. Sunt qui fluuiatilē cancrū in succū redactum, cum aqua aut lacte, assumpto apij semine cōfestim molestijs liberare prodant.

De morfu Scolopendræ. CAP. III.

f I scolopendra morsum infixit, sal q̄ leuissime tritus ex aceto vulneri ispargēdus, aut ruta syluestris superponēda. Locus acida muria perluendus. Dāda in potu aristolochia cum vino, aut serpillum aut calamintha, aut ruta syluestris.

Remedia ad scorpionis iētum. CAP. IIII.

p Ercussis a scorpione, præsentī est auxilio ficulnū lac in vulnus instillatum. Scorpions ipse qui iētū vibrauit, tritus et percusso loco impositus, suæ plagæ remedium est, ob quamdā vt cōstat discordiā. Præterea tritus et impositus cū sale, lini semine, & althæa conuenit. Sulphur ignē non expertum resina terebinthina exceptum, et emplastri modo adiectū auxiliatur. Itidē galbanū ad sple-

v.iii.

IPEDADCHIOSCORIDIS

nij formā duetum & calamintha quæ trita illinatur. Et farinā hordei in vino parata, in decocto rutæ. Semen trifoliæ herbæ triq̃ & vulnery iniectū opitulatur. Hæc ad affectum locū pertinent. Posthæc q̃ efficacissimis potionibus vtēdū, cuiusmodi sunt aristolechiæ præsertim corticis binæ drachmæ cū vino. Tusa gentiana & pulegium decoctū & bacca lauri pauco numero trita, & calamintha cū posca, i qua magno pere discoqui debet. Cupressus cum vino & ruta. Nec secus ficulneum lac, laserpitū si adsit, sin desyderetur, peucedani succo vtendū. Efficax est potus trifolij lusus, & ocimi semen. Omnibus autē ijs perpetuus lauacri vsus, euocatus sudor, & diluta vini portiones regisrum.

Aduersus marinæ pastinacæ, Scorpj marini et draconis
ictus. CAP. V.

I qui marina pastinaca igitur, omnia quæ de viperarum morfu paulo post referemus, simili modo cōueniunt. Peculiariter autē ictus a marino scorpione et dracone inferuntur; qui molestos cruciatus cient. Interdū autē sed raro nomas excitāt. Quibus absinthij saluix aut sulphuris ex aceto triti potio subuenit. Pastinaca diuulsa et vulnery imposita, sui ictus medela est.

De morfu muris aranei. CAP. VI.

I mus araneus momorderit, auxiliatur ex galbano splenium per se vulnery exterius impositum, aut medicamenti modo aceto tritū, & hordeacea farina cum aceto mulso illita. Quin etiam mus ipse qui morsum intulit si dissectus apponatur, ictus sui veneficia luit. Resistunt quoq̃ acini dulcis punici decocti & illiti. Item porri & allia cōtrita, necnon aquæ calidæ fots. Sed hæc ad locū pertinent. Prodest potum abrotoni decoctum, maxime si in vino detur. Præterea serpyllū & galbanū & cruca vino madefacta, recentes cupressi pillulæ cū aceto, et cyclaminus ex aceto mulso, & pyrethrū cū vino & chamæleonis herbæ radix. Nec desunt qui litterarū monumētis tradiderūt, tritū murē aranei cōtra suos ictus cōmode bibi. Quæ historiā apud alios inuentam, dignam duntaxat censuimus, quæ annotaretur. Alij asseuerant demorsum non alias exulcerari, nisi extrinsecus mus araneus assiterit, tum quoq̃ auxiliari referunt.

Ad morsum viperæ remedia. CAP. VII.

I vipera morsum impressit, simū caprinū cū vino impositum opitulatur. Item laurus & abrotonū & galbanū splenij loco superiectū. Origanū viride inditū. Pulli gallinarū discepti et cōfesti admoti. Herui farina aceto mulso subacta. Radicis cortex vsq̃ cotusus, vt in puluerem solutus abeat, & scylla tosta detritum chamæmelum, hordeacū cataplasma in aceto mulso præparatū, sed locus ante

calida foueatur. Hæc loco imponuntur. Contra viperinos iðus rubus cū vine prodest. Aliqui anchusā tenui folio cōstātē auxiliari produnt. Leporini coaguli in viño terni oboli bibūtur, & porracei succi hemina in mero, & foliorum apiaſtri succus, & sylueſtris ruta. Hæc in vino potari debent, merū continuo bibendū, allia mandēda & cæpe & porri recētes, salsamēta acerrima et opipara. Simplicia hæc sūt. Percussis a serpente præclare auxiliatur medicamentū, quod myrrhæ, piſeris, castorij, floris portulacæ seminisq; dimidio acetabulo constat. Hæc omnia in cretico passo teruntur aut in alio probato vino. Erasistratus in eo libro qui περὶ δυνάμεων id est de viribus inscribitur pleraq; alia tradidit, quæ iðis ab vipera auxiliū ferre possūt. Inter quæ talia maxime laudantur, gallinacea cerebella cū vino pota, semen satiuæ brassicæ tritū & acetabuli mēsurā cū vino potū. Quinetiā bonum est digitū in liquidā picē intingere, deinde vinū quo digitus fuerit elusus bibere. Hæc sunt quæ contra serpentium iðus auxiliantur.

De Amphibænæ morſu. CAP. VIII.

- d Eamphibæna mētionē hoc loco fecimus, quoniā fere remedijs ad vyperas scriptis, percussī ab ea adiuuari soleant.

Contra druini iðus remedia. CAP. IX.

- a Druino iðis cōuenit aristolochia cū vino pota, trifoliū hærba, radix hastulæ regiæ similiter assūpta, & fructus ex oī quercus genere. Tusæ illicis radices & illitæ parti iðæ auxiliatur.

De Hæmorrhoi & dipsadis iðu. CAP. X.

- h Aemorrhoi dipsadisq; morſus velut immedicabiles a plerisq; maiorum deplorati relinquebantur. Quare si peculiaribus contra dipsadem remedijs egeamus, communia experiri operæ precium erit. Protinus autem scarificatione vti, vſionem facere, etsi locus patiat̃r āputationē opus erit. Consequēter q̃acerrima cataplasmata ad mouere, de quibus sepe numero diximus. Nec me fugit acres cibos maxime a salsamentis vtilēs esse. Meracæ potionēs & lauacra profunt, quæ subinde interiecto breui spacio assumenda sunt priusq; morbi genus emerſerit, quo semel erumpente opem ferre non potest vlla medici opera. In iðu hæmorrhoi eadem profunt. Insuper quæ in commune opitulantiur vt scarificationes, vſiones, acres cibi, meraci potus, & quæ nunc in dipsade definiuimus. Quinetiam decocta vitis folia & cum melle trita.

De morſu Hydri. CAP. XI.

- f I morſum hydus adegit, prodest origanū tritū, et aqua subactū, lixiuiā cū oleo indita, aut aristolochiæ cortex, aut quærna radix minutim contrita, & hordei farina cum aqua & mel-

PEDACIO DIOSCORIDI

se colliquo. Bibuntur etiam binæ aristolochiæ drachmæ in diluto vino, aut poscæ cyathis duobus, deinceps marrubij succus, vel deco- & vtriusq; cum vino. Fauus recens datur in aceto.

De morfu Cenchridij. CAP. XII.

Orbis a cenchridio auxiliatur laetucæ fructus cum lini semine illitus, et saturia trita & sylvestris ruta & serpyllum cū xij. hastulæ regiæ drachmis et tribus vini cyathis, aut aristolochiæ radix. Item cardamomū, & gentiana.

De percussis a Ceraste. CAP. XIII.

I cerastes aut aspis percusserit, cita partis amputatio suffragatur. Quare sine mora istam partē amputare, aut scalpro cōfestum circūcidere, & ijs similia prosequi oportet. Vrentia insuper admoenda. Siquidem virus hoc veneno basilici simile est.

De mortu Aspidis. CAP. XIII.

Is qui ab aspidē feruntur, quæ de cerasse scripta sunt auxilia dari debēt. Nam venenum hoc quemadmodum basilisci, aut sanguis bubulus, celerrime in arterijs sanguinem cogit.

De Basilisci morfu. CAP. XV.

D basilisci morsum, vt Erasistratus author est, auxiliatur castorij drachma in vino pota. Item papaueris succus. Idūum remedia ita se habent.

QVAE SEQVVTVR NON VIDENTVR ESSE DIOSCORIDIS.

De Rhamno.

Rhamnum si quis eruat silente luna, & secum ferat, contra venena & improbos homines proderit. Pecoribus iuuadis appenditur. Nauigijs circumponi solet. Valet contra capitis dolores & laryas.

De Artemisia.

Artemisiam herbam si quis teneat, dum iter facit, lassitudinē discutiet, & si in pedibus ferat, bestias & lemures abiget. Si sanguis circa artus coaluerit, ramulos ex rosaceo in olla feruefacito, & locum totum oblinito, cū somno indulgendum est. Strangulatu vuluæ mirū in modum auxiliatur. Vrinæ stillicidia & opisthothonū leuat.

De Pentadactylo.

Pentadactylū si quis circum corpus portet, nullo dolore afficietur. Oculos, strumas, callosos tonsillarum tumores, vuam, articulos sub lingua, neruorum dolores & dentes, plorā perniciali fame contra dā

inuat. Remoratos a partu mēses eiicit. Infusa manibus ex aqua tepida contra terribres fascinum & laruas, mirum in modum commendatur. Vellito hærbam cum luna crescit oriente sole.

De Verbenacā

☿ Verbenaca recta genitale intendit, sed supina exiccat. Recta appēsa, doloribus oculorum auxiliatur. Contra hebetudines eorundem et capitis dolorem efficac est. Trita ex aceto lassitudinē reficit. Strumas, callosos farcium tumores statim discutit. Febrium horrores sanat, si quis solum ex aduerso stans ramulos tenuerit.

De Dictamno

☿ Dictammum siccatum manibus terito, & redigens in farinam adiecta vini stilla corpus tangito. Siquidem contra omnes serpentium iniurias auxiliatur. Vlcera & putrescentes nomas præpurgans explet. Adactis corpori aculeis oblinitur, vt præsentī sit auxilio. Ad lienē & in abditis locis vitia inflammatione turgentia, redactum in farinā illinito. Hærbam vere, magnis aestibus, autūnoq; eruito.

De Saluia.

☿ Saluia singulrū tussimq; discutit. Oibus malis vlceribus cū cæra & rosacco sūpta auxiliatur. Lienis dolorē dysēteriāq; pota cū vino albo pari modo sanat. Sanguinē excreantibus, poru medetur. Ad extrahenda vuluæ onera efficac est. Pessumæ mulieres pessum ex ea subiiciunt, vt partus excutiant.

De Cupresso.

☿ Cupressus hærba contra raucedines auriculasq; prodest. Induratos conillarum tumores, aquam intercutem, & coxendicum cruciatus persanat.

De Centaurio

☿ Centaurium contra iussammata vitia & pulsantes ictus valet. Fœminis vuluæ malo laborantibus auxiliatur. Stillicidij vrinæ calculorūq; tormenta leuat. Hærbam vere oriente sole legito.

De Buphthalgo

☿ Buphthalmū crescente Luna legere oportet. Facit autē cōtra paures, laruas et mala medicamēta, fascinationes, vt pote cum eas auerrat. Radicē si quis mandat, dentē expuet, fluctionemq; confestim sistens auxiliatur. Quin & ventrem resoluit.

De Pæonia.

☿ Pæonia hærba per æstus caniculæ ante solis ortū vellitur, appēsaq; cōtravenena, fasciniū, paures & laruas prodest. Itē cōtra febrē cum horrore venientē, diurnam nocturnamve, & aduersus tertianam, Proditur lemures a monte in quo nascebatur fugasse.

De Moly hærba.

¶ Moly hærba si seâ radice feratur, veneficiorû & fascinationis amuletû est.

De Marina quærcu.

¶ Marinâ quærcû cû rosaceo et oleo misceto, et faciẽ illinito cû ad ne gociâ te conferes. Vegetiores reddit pueros imo vëtri appësa, & ad ar cados pauores nocturnos manu teneto. Contra fascinû & omnia ma leficia prodest. Corpus tuetur. Cum enim fascinantes recedunt, are scentem ramulum occludit, & cû propius accedunt aperit.

De Chrysanthemo.

¶ Chrysanthemom si terra ante solis ortû eruat, et collo appëdatur veneficas mulieres omneisq; fascinantes amolitur.

De Eryfimo

¶ Eryfimon cû vino tritum, aduersus ventris dolorẽ bibitur. Si quis grana septem domum ingesserit, rixæ & iurgia cõcitabuntur.

De Helleborine

¶ Helleborine aliquibus Epipactis alijs Borion dicif. Frutex est exi guus, minimis folijs constans. Bibitur contra omne venenum et ioci neris vitia.



Impressum est in præclarissimo Parrhiisiorum Gymnasio hoc celeberrimum Dioscoridis opus in officina Henrici Stephani ere gione scholæ decretorum. Absolutumq; octauo Calendas Maias. An no domini M.D.XVI.

ERRATA EX OFFICINA RECOGNITA

Euphorbium legendum fol. j. superf. prima. versu Siquidem.
Iuuenta legendum fol. j. superf. ij. versu. sua cognitione.
Accõpimus legen. fol. j. superf. ij. versu. los vernacularum.
Celerius leg. serius fol. j. superf. ij. versu. mentia maturus
Additerit et non astiterit legen. fol. j. superf. ij. versu bæ dumtaxat.

ERRATA.

FO.	CAP.	VERSV.
ii	i	ne nomen
ii	ii	obliquum tendentes
iii	iii	culorum doloribus
iii	iii	autem illita
iii	iii	gie, quod
iiii	viii	rem profert
iiii	x	reis
iiii	xi	stomacho
v	xv	validi odoris
vi	xix	Calamus
vii	xxviii	est Sumitur
ix	xlvi	de melano
xii	lxiii	contra vuluæ
xii	lxiii	emollit humect.
xv	lxxxiii	videaris
xvi	xc	let atq; olim
xviii	xcix	Impofitu.
xix	cix	aures
xx	cxviii	firi cætera
xxiii	cxviii	lofa pelle
xxiii	cxviii	phrenitide
xxiii	clx	Sanguinis
xxv	cl	lore viridi.
xxvii	clxxviii	auxiliantur Et
xxviii	clxxxiii	coctæ illitaq;
xxxii	xxvi	ex aqua vidtum
xxxii	xxxi	abolet. Eius
xxxii	xxxiii	exulcerat
xxxiii	lv	reiectionibus
xxxiii	lxiii	tufum, crudo
xxxiii	lxv	rimi halitum.
xxxiii	lxv	tentiffime
xxxv	lxxv	fum turbant
xxxv	lxxv	tibus calculis
xxxvii	lxxxiii	tuli, verucula
xxxviii	lxxxv	ie exemptis mēbris
xxxviii	lxxxvi	gue & excolatum
xliii	cxi	atq; obfonijs
xliv	cxvii	malis cotoneis

LEGENDVM.

accēpit
 interceptas
 eclegmate
 imo
 vim
 eadem ad quæ
 Radice fuperius ad digiti
 prodeft malabathri vis
 zingiber
 Melior
 fumito
 de melanthino
 cacoethe
 glaucedines
 aceruaffe
 Colophonix
 gagata
 offendit
 inequaliter afperfum
 molem
 fubftratu
 eruptiones
 q; fi
 delinctu
 Parotidas et furūculo es mol
 capeffit (liunt. Panos ad
 garum
 laceffenda
 rheumatifmis
 fictili
 exanimentur
 futeis
 clematidem
 in fuma
 concerptas
 aqua marina
 Imbuitor
 ammiſcetur
 integris

FO. CAP. VERSV

xl	cxvi	quiescat
xl	cxviii	nice. Ea
li	clxv	aphaca in
lii	clxxi	Siquidem
lii	lxxi	andum
lii	lxxvi	lius. Sed
liii	clxxvi	
liii	clxxvii	leniter emollit
lvi	cxvi	tit. Cribrata
lvi	cxvii	quæ
lvi	cxviii	no
lix	i	brarunt,
lxv	xxx	passo, si
lxvi	xli	losos,
lxxi	lxxi	Romani
lxxv	xcv	& acre
lxxx	ixxvi	ductus,
lxxxij	cxliii	let
lxxxii	cxliiii	cumbendi
lxxxiii	clii	uiduntur
lxxxiii	cliii	tera est folijs
lxxxiii	cliiii	tæ. vulneribus.
lxxxiii	clviii	roet nigro.
lxxxiii	clix	semen
lxxxiii	clx	men
lxxxv	clxx	sa,
lxxxviii	ix	crion, Romani
lxxxix	xv	ginis
xciii	li	de cocco
xciii	li	
xciii	lvi	Asperginosis
xcv	lxv	tes. Nascitur
xcv	lxvi	bulbaceam
xcv	lxvii	bis, qualis
xcvii	lxii	terrarumq;
xcix	lxxix	phure ignem
c	lxxxv	contra serpē.
c	xc	viperalem
ciii	cviii	purulenta
cxiii	clxxxiii	re candido.

LEGENDVM.

exulceratis pernionibus
 vomitione bilem
 lente
 calfaciendum
 pituitam
 antedictis
 acorū
 vtilis
 experto,
 phœniceo
 si bibatur
 subfixerunt
 gypsum
 pulegio
 syluestrem
 mistione
 contrita,
 fistulas
 proniores
 flauescencia
 aiugæ similis
 autem aiugæ
 stomachicis & erosionib⁹ ea
 duritia
 cochlearis
 conuexaq;
 viticulosū emittit ramulum
 folliculis (rubescētē, lentū
 seu vacat
 Vltimū ex oibus hispanicū
 Is illitus
 niualibus
 pubertatem
 accersēdus est
 partium, inflammationes
 experto rubra
 addita. Imbecillæ
 vocant
 in artubus astricti⁹ vinctis
 rotundo

Fo. CAP. VERSV

cxv	cxiii	prodest
cxv	cc	da, alioqui
cxvii	i	folia vitium
cxvii	v	carbonibus
cxviii	vii	vino vetere
cxviii	vii	male habent
cxviii	vii	leuius & aluo
cxix	vii	timemus
cxx	xvi	nomas
cxxii	xxxii	palmulas
cxxii	xxxiiii	rat, qm
cxxiii	li	dysenteriam,
cxxiii	lvi	riaci drachmæ
cxxvi	lxxvi	spodios
cxxvii	lxxvi	Alij paulatim
cxxxiii	cxi	mant
cxxxiii	cxiii	nihil
cxxxiii	cxv	fistulam hausto
cxxxv	cxvii	natura
cxxxvi	cxiii	recenti vtendum
cxxxviii	cxxxv	tq; cinnabarin
cxxxviii	cxxxvi	scistos lapis
cxli	lxxiii	lo ante
cxli		improbi
cxlii		modo vitia
cxliii		papauer,
cxliiii	iiii	et trifaginis
cxlv	ix	densam vocem
cxlvi	xxi	itidem chamelææ
cxlvi	xxii	gua, & commissuræ
cxlvii	xxvii	nem, potum
cxlvii	xxix	stus Tragi
cxlvii	xxx	bibuntq; eos
cxlviii	xxxiiii	ne & scinco
cxlviii		minus
cxlix		Et hanc in eo
cl		neq; continens
cl		cisci conditionem
clii	iiii	aromatum partem
clii	iii	quidem exstuat.

LEGENDVM.

attonitis
anguloso
illitu
Reduuias
quod gustu
obtinet
Ephygela
sepe
instillare, Hirudines
pertusum
non ita
hybernos
casie
spodos
harenas
in caminis
palloris
Erumpentem
natura in commune
examinatur
atq; cinnabarin
gignitur
gonus lege gomis
beneficia. lc. veneficia
admittunt legendum
lege phrharicum
lege & aiugæ decoctum
a temuletis
ficilicus legendum
dentiū, cādore quodam
hormini
vel Orizæ,
adiunq; percoquunt
scincho
medicinæ
apertissime
lc. neq; ad finem neq; ad
Namq; lege Neq;
et substantijs
fatigat aliquando

REGISTRVM

a	i	Pedacij:	i	i	rūculum
	ij	um pceritates		ii	mile.
	iii	Ad muliebres		iii	De altera
	iiii	odoris radice		iiii	nues emittit
b	i	hir, sextario	m	i	adrupta
	ij	De lentiscino		ii	farinam
	iii	nionibus		iii	De Echio
	iiii	assumuntur		iiii	Aphri
c	i	so manarunt	n	i	cato humore
	ij	De bitumine		ii	tex, in vino
	iii	sa mortuorū		iii	Item
	iiii	lintheisq;		iiii	grauī
d	i	Candida	o	i	quoq;
	ii	quoq; in.		ii	renitent
	iii	De pyraestro		iii	los, alijs
	iiii	abscessibus		iiii	matin
e	i	De iure pisciū	p	i	nigri, et
	ii	Subdita		ii	De Apio
	iii	ac imbecille		iii	lira ex
	iiii	ri, vt		iiii	tur.
f	i	cum melle	q	i	ligenter
	ii	teretes		ii	nes internas,
	iii	coctā		iii	maioris
	iiii	um, verrucas.		iiii	dis.
g	i	strior magis	r	i	gia ex
	ii	Gontra adu.		ii	carbonibus
	iii	De Aphaca.		iii	exposita
	iiii	Siquidem		iiii	incolæ
h	i	spectatur, et	f	i	ret,
	ii	thoth, Daci		ii	reddat
	iii	De Teliphio		iii	ignes
	iiii	nunc ex aqua		iiii	De Terra
i	i	nutim incis	t	i	hinnuli
	ii	De Pulegio		ii	acetum,
	iii	oblōgioribus		iii	thymum
	iiii	De Maro		iiii	Quibus
K	i	radix	v	i	sudor,
	ii	De ros-marino		ii	Communis
	iii	Et lac		iii	Origanum
	iiii	niz ratione		iiii	Pedacij,